

اردو

ہمدرد فارما کو پیپا

، تالیف ،

حکیم عبدالحمید (صاحب)



ہمدرد نگرنی دلی

صفحات 258

پیش لفظ

ہمدرد دواخانہ (وقف) اور ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن کے رفاہی اور سوشل کام، خدا کا شکر ہے، بڑھتے جا رہے ہیں اور ان میں وسعت اس لحاظ سے بھی ہو رہی ہے کہ وہ اپنے مرکز ہی میں محدود نہیں ہیں، بلکہ ملک کے دوسرے علاقوں تک میں بھی ان کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان رفاہی کاموں میں مفت طبی امداد اور صحتی تعلیم بھی ہیں۔ صحتی تعلیم (پمیلیٹ ایجوکیشن) یہ دونوں ادارے مختلف ذرائع سے کرتے رہتے ہیں جن میں اشتہارات، کتابچے، فولڈرز، باقاعدہ شائع ہونے والے رسالے، فلم بلکہ دواخانہ کے اشتہاری سرجیکر میں بھی صحتی تعلیم اور حفظ صحت کے پروپیگنڈہ کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ مفت طبی امداد کے لیے ان اداروں کی طرف سے دہلی میں اور ملک کے دوسرے علاقوں میں فری ڈسپنسریاں قائم ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کا انتظام یہ ادارے خود کرتے ہیں اور اکثر ایسی ہیں جن کو یہ ادارے مفت ادویہ کی شکل میں مدد دیتے ہیں اور ان فری ڈسپنسریوں میں تقسیم کی جانے والی دواؤں کا انتخاب زیادہ تر یہی ادارے وقتی طور پر کرتے رہے ہیں اور کوئی لگا بندھا اصول نہیں تھا جس کے لیے لازمی تھا کہ ایک فارما کوپیامرتب کی جائے جو موجودہ ڈسپنسریوں اور آئندہ کھلنے والی ڈسپنسریوں، ان میں متعلقین اہل با، ان کے منتظمین اور ان میں آنے والے مرعیوں کی ضروریات کو زیادہ سے زیادہ پورا کر سکے۔

ہمدرد وقت اور ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن کے رفاہی اور معاشرتی خدمتوں کے پروگرام
میں مقامی ڈسپنسریاں قائم کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ گشتی ڈسپنسریاں چلانا بھی ہے، جن کے ذریعہ
سے ایسے علاقوں میں طبی امداد و سہولت پہنچائی جاسکے، جہاں فی الحال کسی وجہ سے مستقل
ڈسپنسریاں قائم نہیں کی جاسکتیں۔

ہمدرد فارما کوپیائی کی ترتیب و تالیف سے موجودہ ڈسپنسریوں کے انتظام اور آئندہ
ڈسپنسریوں کے قیام میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی، وہ رفع ہو جائے گی اور ان
دولوں اداروں کو اپنے پروگرام کو پورا کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔

ہمدرد فارما کوپیائی کو زیادہ سے زیادہ جامع اور مفید بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔
جو نقطہ اس کی ترتیب میں ہمیشہ سامنے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈسپنسریوں میں متعین معالجین کو
ہر لحاظ سے مسلح اور تیار کر دیا جائے۔ وہ ڈسپنسریوں کو اچھے معیار پر چلا سکیں،
مریضوں کی دوائی ضرورتیں حسن و خوبی سے پورا کریں اور معاشرہ کے موجودہ معیار اور
ماحول کا ساتھ دے سکیں اور طلب اور اہلیا ہی کے وہ نمائندے بھی ہوں۔

اصل فارما کوپیائی ۸۹ — دواؤں پر مشتمل ہے۔ ان کے انتخاب میں یہ ملحوظ
رہا ہے کہ ڈسپنسری میں ہر وہ دوا موجود ہو جس کی ضرورت روزمرہ کے علاج معالجہ میں
ہوتی ہے۔ ان کی شکلیں ایسی ہوں، جن کو آسانی سے بنایا جاسکتا اور ذخیرہ کیا جاسکتا
اور منتقل کیا جاسکتا ہے اور مریضوں کو وہ بہ آسانی دی اور سمجھائی جاسکتی ہیں۔ فارما کوپیائی
کی ہر دوا کے اجزاء، ان کی ترکیب تیاری، ان کے عمومی اور خاص فائدے اور استعمالات
لکھ دیے گئے ہیں۔

علاج الامراض کے باب میں نہ صرف فارما کوپیائی دواؤں کے استعمالات
بتائے گئے ہیں، بلکہ ان خاصہ دواؤں کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو عموماً گھروں میں، قریب
کی دکانوں میں اور گاؤں میں مل جاتی ہیں اور جن کا استعمال طبیب ڈسپنسری مریضوں کو بتاتا

مناستہ ہے۔ اس باب میں ۲۵۷ امراض کا بیان معالجاتی ترتیب سے کیا گیا ہے اور عام اور گھریلو ادویہ اور اشیا کی تعداد ۲۴۷ ہے۔

ہمدرد فارماکوپیا کے دوسرے مضامین کا اندازہ اس کی فہرست مضامین سے ہو سکتا ہے۔ فارماکوپیا میں مختلف عنوانات سے فہرستیں اور انڈیکس شامل کیے گئے ہیں جن سے اسے استعمال میں رکھنے والوں کو بہت سہولت ہوگی اور وہ اپنی ہر ضرورت کو مختلف عنوانوں سے تلاش کر کے پورا کر سکتے ہیں۔

ہمدرد فارماکوپیا جامع ہونے کے ساتھ ساتھ اس لحاظ سے بھی آسان ہے کہ انداز بیان سادہ ہے بلکہ اسے آسانی سے استعمال بھی کیا جاسکتا ہے اور تھوڑی سی ذہانت سے بڑے بڑے معالجاتی کام انجام دیے جاسکتے ہیں، پھر بھی کسی طبیب کو کسی ڈسپنری میں متعین کرنے سے پہلے اس فارماکوپیا کے ماہرانہ استعمال کے لیے مختصر مدت کی ٹریننگ مناسب ہوگی، جس کا اہتمام مجھے امید ہے، یہ ادارے کریں گے۔

یہ فارماکوپیا اصلاً ہمدرد کی مقامی اور علاقائی مستقل اور گشتی ڈسپنریوں کے لیے مرتب کی گئی ہے، لیکن امید ہے کہ دوسرے ادارے بھی، جو اسی قسم کے رہنمائی کاہلوں اور خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، اس کو کامیابی سے استعمال کر سکیں گے۔

حکیم عبدالحمید
صدر ہمدرد نیشنل فاؤنڈیشن ہٹل

یکم جولائی ۱۹۶۴ء

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۷	فارماکوپیا	۳	پیش لفظ
۸۳	علاج الامراض	۸	ناپ (پیمائش) متقابل
۸۳	مستعدی امراض	۱۰	اوزان متقابل (خشک)
۹۴	دماغ اور اعصاب کے امراض	۱۱	اوزان متقابل (سیال)
۹۹	استحالی امراض	۱۲	دواؤں کی مقدار خوراک
۱۰۰	اعضائے سفہم کے امراض	۱۳	پاخانہ (براز) کا امتحان
۱۰۲	زبان کے امراض	۱۵	بلغم کا امتحان
۱۰۵	معدہ اور آنتوں کے امراض	۱۷	بول (پیشاب) کا امتحان
۱۱۳	جلر اور تلی کے امراض	۲۴	خون کا امتحان
۱۲۰	آنکھوں کی بیماریاں	۲۹	مادہ تولید کا امتحان
۱۲۴	کان کے امراض	۳۲	فشار الدم
۱۲۷	ناک کے امراض	۳۸	نبض
۱۲۸	دوران خون کے اعضا کے امراض	۴۲	بچوں کے امراض کی تشخیص

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۰۴	زہروں کا علاج (علاج السموم)	۱۳۰	پھیپھڑوں کے امراض
۲۰۹	بعض معالجاتی طریقے	۱۳۴	گردہ اور مثانے کے امراض
۲۱۹	مستفاد یا لقیض ادویہ	۱۴۱	جلد کے امراض
۲۲۳	غذائیات	۱۴۴	جراحی امراض
۲۲۷	حیاتین (وٹامنز)	۱۵۳	بعض عمومی امراض
۲۳۱	انڈیکس فارماکوپیا	۱۵۶	مردوں کے خاص امراض
۲۳۳	انڈیکس امراض (ترتیب معالجاتی)	۱۶۲	عورتوں کے خاص امراض
۲۳۹	انڈیکس امراض	۱۷۱	حاملہ کے امراض
۲۴۴	انڈیکس مفردات اور گھریلو دوائیں	۱۷۹	زچہ کے امراض
۲۴۶	انڈیکس تشخیصی معالجاتی رموز و نکات	۱۸۳	بچوں کے امراض
		۹۲	اتفاقی حادثات

ناپ (پیمائش) متقابل

۲ فٹ ۶ اینچ	۱۷۶ سینٹی میٹر	ایک سینٹی میٹر برابر ۰.۳۰۹ اینچ	۴ اینچ
۲ " "	۵۰.۸ " "	ایک اینچ برابر ۲.۵۴ سینٹی میٹر	
۲ " "	۸۱.۲ " "		۶ اینچ
۲ " "	۸۳.۸ " "		ایک فٹ
۲ " "	۸۶.۳ " "		۱ ۱/۲ فٹ
۲ " "	۸۸.۸ " "		ایک فٹ ۷ اینچ
۳ " "	۹۱.۴ " "		۱ فٹ ۸ اینچ
۳ " "	۹۳.۹ " "		۱ فٹ ۹ اینچ
۳ " "	۹۶.۳ " "		۱ فٹ ۱۰ اینچ
۳ " "	۹۹.۰ " "		۱ فٹ ۱۱ اینچ
۳ " "	۱۰۱.۶ " "		۲ فٹ
۳ " "	۱۰۴.۱ " "		۲ فٹ ۱- اینچ
۳ " "	۱۰۶.۶ " "		۲ " "
۳ " "	۱۰۹.۲ " "		۲ " "
۳ " "	۱۱۱.۷ " "		۲ " "
۳ " "	۱۱۴.۲ " "		۲ " "

۵	فٹ	۱	انچ	۱۵۴۳۹	سینٹی میٹر
۵	"	۲	"	۵۷۷۵	"
۵	"	۳	"	۱۹۰۱	"
۵	"	۳	"	۱۹۲۴	"
۵	"	۵	"	۱۹۵۱	"
۵	"	۶	"	۱۹۷۴	"
۵	"	۷	"	۱۹۹۷	"
۵	"	۸	"	۱۹۲۷	"
۵	"	۹	"	۱۹۵۲	"
۵	"	۱۰	"	۱۹۷۸	"
۵	"	۱۱	"	۱۸۰۳	"
۶	"		"	۱۸۲۹	"
۶	"	۱	"	۱۸۵۳	"
۶	"	۲	"	۱۸۷۰	"
۶	"	۳	"	۱۹۰۵	"
۳	فٹ	۱۰	انچ	۱۱۴۰۸	سینٹی میٹر
۳	"	۱۱	"	۱۱۹۳	"
۳	"		"	۱۲۱۰۹	"
۳	"	۱	"	۱۲۳۳	"
۳	"	۲	"	۱۲۷۰	"
۳	"	۳	"	۱۲۹۵	"
۳	"	۴	"	۱۳۲۰	"
۳	"	۵	"	۱۳۲۴	"
۳	"	۶	"	۱۳۷۱	"
۳	"	۷	"	۱۳۹۴	"
۳	"	۸	"	۱۴۰۲	"
۳	"	۹	"	۱۴۲۷	"
۳	"	۱۰	"	۱۴۷۳	"
۳	"	۱۱	"	۱۴۹۸	"
۵	"		"	۱۵۲۳	"

اوزان متقابل (خشک)

۱	گرین	=	۳۷.۰	میلی گرام	۱	گرین	=	۰.۰۱	میلی گرام	۱	خا
۲	"	=	۵۰.۰	"	۲	"	=	۰.۰۲	"	۲	خا
۳	گرین	=	۶۵.۰	"	۳	"	=	۰.۰۳	"	۳	خا
۴	"	=	۸۰.۰	گرام	۴	"	=	۰.۰۴	"	۴	خا
۵	"	=	۱۰۰.۰	"	۵	"	=	۰.۰۵	"	۵	خا
۶	"	=	۱۳۰.۰	"	۶	"	=	۰.۰۶	"	۶	خا
۷	"	=	۱۶۰.۰	"	۷	"	=	۰.۰۷	"	۷	خا
۸	"	=	۲۰۰.۰	"	۸	"	=	۰.۰۸	"	۸	خا
۹	"	=	۲۵۰.۰	"	۹	"	=	۰.۰۹	"	۹	خا
۱۰	"	=	۳۰۰.۰	"	۱۰	"	=	۰.۱۰	"	۱۰	خا
۱۱	"	=	۳۷۰.۰	"	۱۱	"	=	۰.۱۱	"	۱۱	خا
۱۲	"	=	۴۵۰.۰	"	۱۲	"	=	۰.۱۲	"	۱۲	خا
۱۳	"	=	۵۰۰.۰	"	۱۳	"	=	۰.۱۳	"	۱۳	خا
۱۴	"	=	۶۲۵.۰	"	۱۴	"	=	۰.۱۴	"	۱۴	خا
۱۵	"	=	۷۵۰.۰	"	۱۵	"	=	۰.۱۵	"	۱۵	خا
۱۶	"	=	۹۰۰.۰	"	۱۶	"	=	۰.۱۶	"	۱۶	خا
۱۷	"	=	۱۰۰۰.۰	"	۱۷	"	=	۰.۱۷	"	۱۷	خا
۱۸	"	=	۱۲۵۰.۰	"	۱۸	"	=	۰.۱۸	"	۱۸	خا
۱۹	"	=	۱۵۰۰.۰	"	۱۹	"	=	۰.۱۹	"	۱۹	خا
۲۰	"	=	۱۷۵۰.۰	"	۲۰	"	=	۰.۲۰	"	۲۰	خا
۲۱	"	=	۲۰۰۰.۰	"	۲۱	"	=	۰.۲۱	"	۲۱	خا
۲۲	"	=	۲۲۵۰.۰	"	۲۲	"	=	۰.۲۲	"	۲۲	خا
۲۳	"	=	۲۵۰۰.۰	"	۲۳	"	=	۰.۲۳	"	۲۳	خا
۲۴	"	=	۲۷۵۰.۰	"	۲۴	"	=	۰.۲۴	"	۲۴	خا
۲۵	"	=	۳۰۰۰.۰	"	۲۵	"	=	۰.۲۵	"	۲۵	خا
۲۶	"	=	۳۲۵۰.۰	"	۲۶	"	=	۰.۲۶	"	۲۶	خا
۲۷	"	=	۳۵۰۰.۰	"	۲۷	"	=	۰.۲۷	"	۲۷	خا
۲۸	"	=	۳۷۵۰.۰	"	۲۸	"	=	۰.۲۸	"	۲۸	خا
۲۹	"	=	۴۰۰۰.۰	"	۲۹	"	=	۰.۲۹	"	۲۹	خا
۳۰	"	=	۴۲۵۰.۰	"	۳۰	"	=	۰.۳۰	"	۳۰	خا
۳۱	"	=	۴۵۰۰.۰	"	۳۱	"	=	۰.۳۱	"	۳۱	خا
۳۲	"	=	۴۷۵۰.۰	"	۳۲	"	=	۰.۳۲	"	۳۲	خا
۳۳	"	=	۵۰۰۰.۰	"	۳۳	"	=	۰.۳۳	"	۳۳	خا
۳۴	"	=	۵۲۵۰.۰	"	۳۴	"	=	۰.۳۴	"	۳۴	خا
۳۵	"	=	۵۵۰۰.۰	"	۳۵	"	=	۰.۳۵	"	۳۵	خا
۳۶	"	=	۵۷۵۰.۰	"	۳۶	"	=	۰.۳۶	"	۳۶	خا
۳۷	"	=	۶۰۰۰.۰	"	۳۷	"	=	۰.۳۷	"	۳۷	خا
۳۸	"	=	۶۲۵۰.۰	"	۳۸	"	=	۰.۳۸	"	۳۸	خا
۳۹	"	=	۶۵۰۰.۰	"	۳۹	"	=	۰.۳۹	"	۳۹	خا
۴۰	"	=	۶۷۵۰.۰	"	۴۰	"	=	۰.۴۰	"	۴۰	خا
۴۱	"	=	۷۰۰۰.۰	"	۴۱	"	=	۰.۴۱	"	۴۱	خا
۴۲	"	=	۷۲۵۰.۰	"	۴۲	"	=	۰.۴۲	"	۴۲	خا
۴۳	"	=	۷۵۰۰.۰	"	۴۳	"	=	۰.۴۳	"	۴۳	خا
۴۴	"	=	۷۷۵۰.۰	"	۴۴	"	=	۰.۴۴	"	۴۴	خا
۴۵	"	=	۸۰۰۰.۰	"	۴۵	"	=	۰.۴۵	"	۴۵	خا
۴۶	"	=	۸۲۵۰.۰	"	۴۶	"	=	۰.۴۶	"	۴۶	خا
۴۷	"	=	۸۵۰۰.۰	"	۴۷	"	=	۰.۴۷	"	۴۷	خا
۴۸	"	=	۸۷۵۰.۰	"	۴۸	"	=	۰.۴۸	"	۴۸	خا
۴۹	"	=	۹۰۰۰.۰	"	۴۹	"	=	۰.۴۹	"	۴۹	خا
۵۰	"	=	۹۲۵۰.۰	"	۵۰	"	=	۰.۵۰	"	۵۰	خا
۵۱	"	=	۹۵۰۰.۰	"	۵۱	"	=	۰.۵۱	"	۵۱	خا
۵۲	"	=	۹۷۵۰.۰	"	۵۲	"	=	۰.۵۲	"	۵۲	خا
۵۳	"	=	۱۰۰۰۰.۰	"	۵۳	"	=	۰.۵۳	"	۵۳	خا
۵۴	"	=	۱۰۲۵۰.۰	"	۵۴	"	=	۰.۵۴	"	۵۴	خا
۵۵	"	=	۱۰۵۰۰.۰	"	۵۵	"	=	۰.۵۵	"	۵۵	خا
۵۶	"	=	۱۰۷۵۰.۰	"	۵۶	"	=	۰.۵۶	"	۵۶	خا
۵۷	"	=	۱۱۰۰۰.۰	"	۵۷	"	=	۰.۵۷	"	۵۷	خا
۵۸	"	=	۱۱۲۵۰.۰	"	۵۸	"	=	۰.۵۸	"	۵۸	خا
۵۹	"	=	۱۱۵۰۰.۰	"	۵۹	"	=	۰.۵۹	"	۵۹	خا
۶۰	"	=	۱۱۷۵۰.۰	"	۶۰	"	=	۰.۶۰	"	۶۰	خا
۶۱	"	=	۱۲۰۰۰.۰	"	۶۱	"	=	۰.۶۱	"	۶۱	خا
۶۲	"	=	۱۲۲۵۰.۰	"	۶۲	"	=	۰.۶۲	"	۶۲	خا
۶۳	"	=	۱۲۵۰۰.۰	"	۶۳	"	=	۰.۶۳	"	۶۳	خا
۶۴	"	=	۱۲۷۵۰.۰	"	۶۴	"	=	۰.۶۴	"	۶۴	خا
۶۵	"	=	۱۳۰۰۰.۰	"	۶۵	"	=	۰.۶۵	"	۶۵	خا
۶۶	"	=	۱۳۲۵۰.۰	"	۶۶	"	=	۰.۶۶	"	۶۶	خا
۶۷	"	=	۱۳۵۰۰.۰	"	۶۷	"	=	۰.۶۷	"	۶۷	خا
۶۸	"	=	۱۳۷۵۰.۰	"	۶۸	"	=	۰.۶۸	"	۶۸	خا
۶۹	"	=	۱۴۰۰۰.۰	"	۶۹	"	=	۰.۶۹	"	۶۹	خا
۷۰	"	=	۱۴۲۵۰.۰	"	۷۰	"	=	۰.۷۰	"	۷۰	خا
۷۱	"	=	۱۴۵۰۰.۰	"	۷۱	"	=	۰.۷۱	"	۷۱	خا
۷۲	"	=	۱۴۷۵۰.۰	"	۷۲	"	=	۰.۷۲	"	۷۲	خا
۷۳	"	=	۱۵۰۰۰.۰	"	۷۳	"	=	۰.۷۳	"	۷۳	خا
۷۴	"	=	۱۵۲۵۰.۰	"	۷۴	"	=	۰.۷۴	"	۷۴	خا
۷۵	"	=	۱۵۵۰۰.۰	"	۷۵	"	=	۰.۷۵	"	۷۵	خا
۷۶	"	=	۱۵۷۵۰.۰	"	۷۶	"	=	۰.۷۶	"	۷۶	خا
۷۷	"	=	۱۶۰۰۰.۰	"	۷۷	"	=	۰.۷۷	"	۷۷	خا
۷۸	"	=	۱۶۲۵۰.۰	"	۷۸	"	=	۰.۷۸	"	۷۸	خا
۷۹	"	=	۱۶۵۰۰.۰	"	۷۹	"	=	۰.۷۹	"	۷۹	خا
۸۰	"	=	۱۶۷۵۰.۰	"	۸۰	"	=	۰.۸۰	"	۸۰	خا
۸۱	"	=	۱۷۰۰۰.۰	"	۸۱	"	=	۰.۸۱	"	۸۱	خا
۸۲	"	=	۱۷۲۵۰.۰	"	۸۲	"	=	۰.۸۲	"	۸۲	خا
۸۳	"	=	۱۷۵۰۰.۰	"	۸۳	"	=	۰.۸۳	"	۸۳	خا
۸۴	"	=	۱۷۷۵۰.۰	"	۸۴	"	=	۰.۸۴	"	۸۴	خا
۸۵	"	=	۱۸۰۰۰.۰	"	۸۵	"	=	۰.۸۵	"	۸۵	خا
۸۶	"	=	۱۸۲۵۰.۰	"	۸۶	"	=	۰.۸۶	"	۸۶	خا
۸۷	"	=	۱۸۵۰۰.۰	"	۸۷	"	=	۰.۸۷	"	۸۷	خا
۸۸	"	=	۱۸۷۵۰.۰	"	۸۸	"	=	۰.۸۸	"	۸۸	خا
۸۹	"	=	۱۹۰۰۰.۰	"	۸۹	"	=	۰.۸۹	"	۸۹	خا
۹۰	"	=	۱۹۲۵۰.۰	"	۹۰	"	=	۰.۹۰	"	۹۰	خا
۹۱	"	=	۱۹۵۰۰.۰	"	۹۱	"	=	۰.۹۱	"	۹۱	خا
۹۲	"	=	۱۹۷۵۰.۰	"	۹۲	"	=	۰.۹۲	"	۹۲	خا
۹۳	"	=	۲۰۰۰۰.۰	"	۹۳	"	=	۰.۹۳	"	۹۳	خا
۹۴	"	=	۲۰۲۵۰.۰	"	۹۴	"	=	۰.۹۴	"	۹۴	خا
۹۵	"	=	۲۰۵۰۰.۰	"	۹۵	"	=	۰.۹۵	"	۹۵	خا
۹۶	"	=	۲۰۷۵۰.۰	"	۹۶	"	=	۰.۹۶	"	۹۶	خا
۹۷	"	=	۲۱۰۰۰.۰	"	۹۷	"	=	۰.۹۷	"	۹۷	خا
۹۸	"	=	۲۱۲۵۰.۰	"	۹۸	"	=	۰.۹۸	"	۹۸	خا
۹۹	"	=	۲۱۵۰۰.۰	"	۹۹	"	=	۰.۹۹	"	۹۹	خا
۱۰۰	"	=	۲۱۷۵۰.۰	"	۱۰۰	"	=	۱.۰۰	"	۱۰۰	خا

اوزان متقابل (سیال)

۸۰	منم = ۵۰۰	لی لٹر	۱	منم	۰۰۰۰۰۰۰۰	لی لٹر
(۲) ۵۰	در افسلوٹ	" "	۱/۸	"	۰۰۰۰۰۰۰۰	" "
۲ ۲/۳	" " = ۱۰۰۰	" "	۳	"	۰۰۰۰۰۰۰۰	" "
۴	" " = ۱۵۰۰	" "	۵	"	۰۰۰۰۰۰۰۰	" "
۵ ۱/۲	" " = ۲۰۰۰	" "	۸	"	۰۰۰۰۰۰۰۰	" "
۵	اوس فلوٹ	" "	۱۰	"	۰۰۰۰۰۰۰۰	" "
ایک (۱)	اوس فلوٹ = ۳۰۰۰	" "	۱۲	"	۰۰۰۰۰۰۰۰	" "
۱ ۲/۳	" " = ۵۰۰۰	" "	۱۵	"	۰۰۰۰۰۰۰۰	" "
۲	" " = ۶۰۰۰	" "	۱۶	"	۱۰۰۰۰۰۰۰	" "
۲ ۲/۳	" " = ۱۰۰۰۰	" "	۲۰	"	۱۰۲۰۰۰۰۰	" "
۳	" " = ۱۲۰۰۰	" "	۳۰	"	۱۰۸۰۰۰۰۰	" "
۴ ۲/۳	" " = ۲۰۰۰۰	" "	۳۲	"	۲۰۰۰۰۰۰۰	" "
۸	" " = ۲۴۰۰۰	" "	۴۵	"	۲۰۸۰۰۰۰۰	" "
۱۲	" " = ۳۶۰۰۰	" "	۵۰	"	۳۰۰۰۰۰۰۰	" "
۱۶	" " = ۴۸۰۰۰	" "	ایک (۱)	در افسلوٹ	۳۰۰۰۰۰۰۰	" "
			۷۵	منم	۴۰۰۰۰۰۰۰	" "

دواؤں کی مقدارِ خوراک

امراض و علاج کے تحت میں دواؤں کی جو مقدار خوراک تجویز کی گئی ہے وہ عموماً متوسطہ مقدار ہے اور درمیانی طاقت رکھنے والے مریضوں کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی مریض جسیم اور طاقت ور ہے یا مریض کی تکلیف شدید ہے۔ تو مقدارِ خوراک میں حسبِ موقع اضافہ بھی کیا جاسکتا ہے اور اگر مریض کمزور اور ضعیف ہے یا مریض شدید نہیں ہے تو دوا کی خوراک کو کم کر دیا جاتے۔

بچوں کو ان کی عمر کے مطابق دوا کی مقدار خوراک دینی چاہیے۔ بچوں کی مقدارِ خوراک کا نقشہ حسب ذیل ہے۔

$\frac{1}{4}$	ایک سال کے بچوں کے لیے جو انوں کی مقدارِ خوراک کا
$\frac{1}{3}$	دو تین سال کے بچوں کے لیے جو انوں کی مقدارِ خوراک کا
$\frac{1}{2}$	پچھ سال کے بچوں کے لیے جو انوں کی مقدارِ خوراک کا
$\frac{1}{2}$	نہ سال کے بچوں کے لیے جو انوں کی مقدارِ خوراک کا
$\frac{3}{4}$	چودہ سال کے بچوں کے لیے جو انوں کی مقدارِ خوراک کا

(نوٹ) واضح رہے کہ زہریلی دوائیں اول تو بچوں کو استعمال ہی نہیں کرانی چاہئیں، لیکن اگر کسی زہریلی دوا کا کوئی مرکب بچے کو استعمال کرنا ضروری ہو تو اس کو مذکورہ قاعدہ سے مستثنیٰ سمجھا جائے اس لیے کہ بچے زہریلی دوا خصوصاً ایٹون سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے مذکورہ قاعدے کے مطابق ان کے لیے جو مقدارِ خوراک ہو۔ اس سے بھی کم کر دی جائے۔

پاخانہ (براز) کا امتحان

امتحان کے لیے براز کو صاف ستھرے برتن میں اس طریقہ سے اکٹھا کیا جائے کہ اس میں پیشاب اور دیگر کسی چیز کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ پھر اس میں تھوڑی سی فارملین (Formalin) لادینی چاہیے، تاکہ اس کی بدبو میں کمی واقع ہو جائے۔

اگر براز میں امیبا (Amoeba) معلوم کرنا ہو تو اس کے لیے پاخانہ تازہ تریں حاصل کیا جائے اور امتحان ہونے تک برتن اور پاخانہ کو گرم رکھا جائے اور اس میں کوئی مائع عفونت چیز نہ ملائی جائے اور اس کو زیادہ دیر تک نہ رکھا جائے، بلکہ جلدی اس کا امتحان کر لیا جائے، ورنہ اس میں عفونت پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔

امتحان نظری: اس میں (۱) براز کی مقدار (۲) رنگ (۳) بو اور قوام کو معلوم کیا جائے۔
مقدار: جو بیس گھنٹے میں براز کی طبعی مقدار کا اوسط ایک سو گرام سے دو سو گرام تک ہوتا ہے۔ اگر براز مقدار میں زیادہ اور بار بار آئے تو اس حالت کو اسہال کہتے ہیں۔ اگر مقدار میں تھوڑا تھوڑا بار بار آئے تو یہ قبض کی علامت ہے۔

رنگ: براز کے رنگ کا انحصار کھائی ہوئی غذا پر ہوتا ہے۔ عام طور پر بٹی چلی غذا کھائی جاتی ہے۔ اس میں براز کا رنگ خاکی ہوتا ہے اور کبھی سیاہی مائل بھی ہوتا ہے۔
اگر گوشت زیادہ کھایا جائے تو براز کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے۔
اگر دودھ زیادہ استعمال کیا جائے تو براز کا رنگ سفیدی مائل ہوتا ہے۔
براز کی سبز رنگت صفرا کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔

نوزائیدہ بچوں کے براز کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ اگر براز کا رنگ سفید ہو تو اس بات کی

علامت ہے کہ صفرا آنتوں میں نہیں آ رہا ہے، جیسا کہ مرض یرقان میں ہوتا ہے۔

بُور: براز میں بو انڈول (Indole) اور سکاٹولی (Skatole) پر منحصر ہے۔ مگر اس کے علاوہ غذا میں کھائے ہوئے گوشت کی وجہ سے بھی براز میں بُور ہوتی ہے۔ اگر آنتوں میں صفرا کم آ رہا ہو تو اس حالت میں بھی عفونت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ مریض یرقان کے براز میں بہت بو اسی وجہ سے ہوتی ہے۔

قوام: براز کا قوام قبض کی صورت میں بہت سخت اور اسہال میں بہت پتلا ہوتا ہے۔ اگر قولون میں معمولی مُدہ ہو تو براز کی شکل چپٹی ہوگی اور اگر معاستقیم میں نواسیر ہو تو براز کے ارد گرد گڑھوں کے نشانات پائے جائیں گے۔ اگر براز لیس دار ہو تو اس میں رطوبتِ مخاطیہ زیادہ ہوگی، جو کسی خراش یا ورم کی علامت ہے۔

اجسام طفیلیہ: (Parasites) چرے (چنوفے) اور کدوانے اور دیگر قسم کے کیڑے بھی براز میں موجود ہوتے ہیں۔

براز کا کیمیاوی امتحان

ردِ عمل: خفیف کھاری یا خفیف تیزابی۔

اگر براز کا ردِ عمل زیادہ کھاری (الکلائن) ہو تو یہ عفونت کی نشانی ہے اور اگر بہت زیادہ تیزابی (ایسڈ) ہو تو یہ تخمیر کی علامت ہے۔

تخمیر (Fermentation): اگر نشاستہ دار اجزاء کی کثرت سے تخمیر ہو تو اس حالت میں تیزابی ردِ عمل اور ریاح کی پیدائش زیادہ ہوگی۔

اگر آنتوں میں اجزائے ملحمہ غیر ہضم شدہ ہوں تو براز کا ردِ عمل قوی کھاری ہوگا۔

بلغم کا امتحان

پھیپھڑوں کے اکثر امراض اور بالخصوص متعدی بیماریوں کی صحیح تشخیص کے لیے بلغم کا امتحان بہت ضروری ہے۔ اس سے تشخیص مرض میں بہت مدد ملتی ہے۔

امتحان کے لیے بلغم لینے کا طریقہ: اس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے کا بلغم جمع کیا جائے، در نہ ضرورت کے وقت صبح سو کر اٹھنے کے بعد جو بلغم خارج ہو اس کو جمع کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نمکین گرم پانی سے منہ اور حلق کو غرارے کر کے اچھی طرح صاف کر لیں۔ پھر زور سے کھانسن کر بلغم کو خارج کریں اور اس کو کسی چوڑے منہ کی صاف و خشک شیشی میں جمع کریں۔ پھر اس شیشی کا منہ ڈاٹ سے بند کر کے لیبورٹری میں امتحان کی غرض سے بھیج دیں۔

امتحان کے وقت بلغم کی طبعی خصوصیات، یعنی رنگ، بو، قوام اور مقدار وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے

رنگ: بلغم بے رنگ، نیم شفاف اور غیر شفاف ہو سکتا ہے اور سفیدی مائل و زرد و سُرخ یا سرخی مائل بھورا یا خون آمیز رنگاری، بھورا، ٹیلا اور کالا بھی ہو سکتا ہے۔

۱۔ رنگاری رنگ: ذات الریہ (نمونیا) میں بلغم کا رنگ رنگاری ہوتا ہے۔
۲۔ زرد یا سبز رنگ: دبیلہ کبدی کے پھیپھڑوں میں پھٹ جانے سے اور ذات الریہ کے بعض مریضوں میں بلغم کا رنگ زرد یا سبز ہوتا ہے۔

۳۔ سیاہ رنگ: عام طور پر کولوں کی کانوں میں کام کرنے والے لوگوں میں بلغم کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔

۴۔ سُرخ لکیریں: اگر بلغم میں سُرخ دھالیاں پائی جائیں تو یہ ذات الریہ کی علامت

ہوتی ہے۔ سرخ خون کی مانند بلغم پھیپھڑوں کے امراض متعلقہ کو ظاہر کرتا ہے۔
مقدار: تمام دن کے بلغم کی مقدار معلوم کریں تو اچھا ہے، ورنہ یہ تو ضروری ہے کہ ایک
 وقت میں جس قدر بلغم خارج ہو اس کی مقدار معلوم کریں۔
بُؤ: پھیپھڑے کو غلاف لانا (Gangrene) التهابِ شعبی متعفن اور اتساعِ شعبی
 (Bronchiectasis) میں بلغم کی بُؤ بہت تیز ہوتی ہے۔
قوام: بلغم مخاطی التهابِ شعبی کی ابتدا میں آتا ہے۔ یہ صاف، سخت اور لیس دار
 ہوتا ہے اور عام طور پر کم مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ بلغم مخاطی صدیدی پھیپھڑوں کے کئی امراض
 میں خارج ہوتا ہے۔ دق میں جب پھیپھڑوں میں جوف ہو جائیں تو بلغم چھوٹی چھوٹی ڈلیوں کی
 صورت میں خارج ہوتا ہے اور ان ڈلیوں کے ارد گرد مخاط ہوتی ہے بلغم مائی پھیپھڑوں کو اور ذیاب
 (Oedema) کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض امراض مثلاً اتساعِ شعبی
 غلاف لانا (گینگرین) اور خراج الریہ میں اگر بلغم کو رتن میں پڑا رہنے دیا جائے تو تھوڑی دیر بعد یہ
 مختلف حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔

خوردنی امتحان

اس مطلب کے لیے بلغم کو بحفاظت حاصل کیا جائے تاکہ اس میں غذا یا اور کسی چیز کے
 اجزاء شامل نہ ہوں۔ اس امتحان کے ذریعہ خون کے سرخ اور سفید کرات اور دیگر قسم کے خلیات نظر
 آجاتے ہیں۔

ہیپ پیدا کرنے والے جراثیم کے تعدیہ میں پولی مورفیکلیر (Polymorph
 onuclear) اور نائٹروفائلز (Neutrophiles) بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور
 دق کی معمولی حالت میں لم فوسائٹ (Lymphocytes) بڑھے ہوئے ہوتے ہیں غیثتِ افس
 شعبی (Bronchial Asthma) میں اسی نائٹ (Eosinophiles)

بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جگر اور طلق کی التهابی حالتوں میں قشوری خلیات (Squamous cells) پائے جاتے ہیں۔ اگر خلیات دومی زیادہ ہوں تو یہ نفث الدم پر دلالت کرتے ہیں۔

نچک دار ریشے: یہ پھیپھڑوں کی ہانتوں کی خرابی کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس کا سبب رق، غائرانا یا خراج ہوتا ہے۔

کرسش مین کے کچھے: (Crusschman's Spiral) حیق انفس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ کچھے سا گودانہ کی شکل کے ہوتے ہیں۔

جراثیم: بلغم میں کئی قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہم دق کے جراثیم ہوتے ہیں۔

بول (پیشاب) کا امتحان

اکثر امراض کی تشخیص کے لیے پیشاب کا امتحان (ٹیسٹ) کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس غرض کے لیے پیشاب لینے کے بھی خاص طریقے ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں:

۱۔ پیشاب کی کیفیت کا امتحان

اس مقصد کے لیے کسی وقت بھی صاف برتن میں پیشاب لیا جاسکتا ہے، مگر جب گردوں کی کسی بیماری کے شبہ میں، بالخصوص رطوبت برفیہ (ایل بیو سن) کے ٹیسٹ کے لیے پیشاب لینا ہو تو صبح کے وقت پیشاب لیا جائے۔ اس سے گردوں کے متعلق صبح اندازہ ہو جاتا ہے اور اگر شکر (شوگر) معلوم کرنے کے لیے پیشاب کی ضرورت ہو تو کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد پیشاب لیا جائے اور اس پر پیشاب لینے کا وقت لکھ دینا چاہیے۔

۲۔ پیشاب کی مقدار کا امتحان

اس کے لیے چوبیس گھنٹے کا پیشاب جمع کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے روز صبح کو

آٹھ بجے پیشاب لیا جائے اور اس کے بعد دوسرے روز صبح آٹھ بجے تک جس قدر پیشاب آئے اس کو جمع کرتے رہیں۔ جس برتن میں پیشاب جمع کیا جائے اس میں ایک گرام (پندرہ گرین) تھائی مول ڈال دیا جائے۔ دوسرے روز صبح آٹھ بجے اچھی طرح پیشاب کر کے مثلاً کو خالی کر دیں اور اب تمام مقدار نوٹ کر لیں۔ پھر اس میں سے برتن کو ہلا کر تقریباً دس اونس (۱۵۰ ملی لیٹر) پیشاب لیباریٹری میں امتحان کے لیے بھیج دیں۔

۳۔ پیشاب کا کاشتی امتحان (Urin Culture)

اس مقصد کے لیے عورتوں کا پیشاب عمر کے مطابق اگر کیتھیٹر (قاناٹیر) سے نکال کر لیا جائے تو اچھا ہے۔ مردوں میں پانچ سال سے زیادہ عمر کے بچوں اور جوانوں میں، اگر ان کی ختنہ نہ ہوئی ہو تو ان کے حشفہ کی کھال کو کچھ بٹا کر حشفہ کو پہلے خفیف واقع عفونت محلول سے دھوئیں اور پھر مہر نامول سیلائن سے صاف کریں۔ اس کے بعد ان کو پیشاب کرنے کے لیے کہا جائے۔ جب تقریباً دس ہی سی پیشاب خارج ہو جائے تو پھر صاف الہ سٹیری ٹیوب یا شیشی میں پیشاب لیا جائے، مگر پیشاب لیتے وقت یہ برتن حشفہ کو نہ لگنا چاہیے۔ پیشاب لینے کے بعد برتن کے منہ کو صاف رولی کی ڈاٹ سے اس طرح بند کیا جائے کہ یہ ڈاٹ اندر پیشاب کو نہ لگے اور نہ پیشاب ہل ہلا کر اس کے لگے اور نہ ہی بیرونی گرد وغبار سے آلودہ ہو۔

مردوں میں بھی پیشاب قاناٹیر (کیتھیٹر) سے لیا جاسکتا ہے اور بالخصوص پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کا پیشاب کیتھیٹر کے ذریعہ بہ آسانی لے سکتے ہیں۔
پیشاب کے امتحان کے حسب ذیل تین طریقے :

(۱) نظری امتحان (۲) کیمیادی امتحان (۳) خوردبینی امتحان۔

نظری امتحان (Physical examination)

اس امتحان میں پیشاب کی حسب ذیل خصوصیات کو دیکھا جاتا ہے :

(۱) رنگ (۲) مقدار (۳) بُو (۴) وزن مخصوص (۵) ظاہری حالت (۶) رُسوب
رنگ : پیشاب کا طبعی رنگ ہلکا زرد ہوتا ہے، جس کو امیر کلر کہتے ہیں، مگر بعض ادویہ
 مثلاً ریونڈ چین، سنا اور سنٹونین کے کھانے سے پیشاب کا رنگ سُرخ یا مائل بھورا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی
 بلیو کے کھانے سے نیلا اور کارمالک ایسڈ کی وجہ سے سیاہ رنگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زعفران اور
 اتاس وغیرہ کھانے سے پیشاب کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض غذاؤں کے کھانے سے بھی پیشاب
 کی رنگت، مقدار اور قوام میں تبدیلی ہو جاتی ہے، مثلاً چاول، دہی، دودھ، مولی اور پالک وغیرہ
 کھانے پینے سے پیشاب کی مقدار زیادہ، قوام رقیق اور رنگ سفیدی مائل ہو جاتا ہے۔ نظری امتحان
 کے وقت ان سب باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔

عام طور پر پیشاب میں پانچ قسم کے رنگ پائے جاتے ہیں :

(۱) زرد (۲) سرخ (۳) سبز (۴) سیاہ (۵) سفید
زرد رنگ : غلبہ حرارت، صفرا، یرقان، صفرا، بخار اور لیگ گروہ و شانہ وغیرہ میں ہوتا ہے۔
سُرخ رنگ : امراض جگر، فلیج، قولنج، بل الدم اور انٹی پائیرین کے کھانے سے ہو جاتا ہے۔
سیاہ رنگ : امراض طحال، یرقان، اسودارحم، کمراض، دیوی بخار، بول الدم اور بھران میں ہوتا ہے۔
سفید رنگ : غلبہ بلغم، فاسفیٹ، پیپ، کمزوری، ہضم، زخم اور دمکی دلیل ہے۔
مقدار : ایک تن درست جوان مرد کے پیشاب کی مقدار چوبیس گھنٹے میں بارہ گلوں سے
 پندرہ گلوں سے کم ہوتی ہے، مگر عورتوں کے پیشاب کی مقدار اس سے کچھ کم ہوتی ہے۔ زیادہ
 پانی پینے اور سردی لگ جانے سے پیشاب کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور ورزش کرنے یا پسینہ
 زیادہ آنے سے پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔

بعض امراض مثلاً ہزال الکلیہ، ذیابیطس، اعتناق الرحم، عظم القلب، ورم گروہ مزمن
 اور بلڈ پریشر خون کے دباؤ کی زیادتی میں پیشاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برخلاف ہر
 قسم کے بخار، دماغی سوجن، دماغ کے بل جانے، ہیپتہ، اسہال، کثرت استفرغ، بلڈ پریشر کی کمی اور

بعض امراض گروہ میں بھی پیشاب کم مقدار میں آتا ہے۔

نوٹ: تن درست کی حالت میں پیشاب کی بڑا ایک خاص قسم کی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ کچھ دیر تک رکھا ہے تو اس میں نوشادر جیسی بو آنے لگتی ہے، جس کو 'ایونیکل' کہتے ہیں پیشاب میں اس بو کا ہونا امراض اعلیل و نخاع اور درم شانہ کی علامت ہے۔ اگر پیشاب میں گلے سڑے پھل جیسی بو ہو تو یہ ایسی ٹون کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر پیشاب میں سٹرا ہوا خون یا پیپ شامل ہو تو بو مٹری ہوتی ہوگی۔ ذیابیطس شکری میں پیشاب کی بو میں مٹھاس ہوتی ہے

وزن مخصوص: صحت کی حالت میں پیشاب کا وزن متناسبہ عام طور پر ۱۰۱۵ سے ۱۰۲۵ تک ہوتا ہے۔ اگر وزن اس سے کم وریش ہو تو یہ کسی بیماری کی علامت ہے، مثلاً اگر وزن متناسبہ ۱۰۳۰ سے زیادہ ہو تو اس سے ذیابیطس شکری کا شبہ کرنا چاہیے اور اگر وزن متناسبہ ۱۰۱۵ سے کم ہو تو اس سے ایل بیومن (رطوبت بیضیہ) کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ذیابیطس شکری کے سوا وہ تمام امراض جن میں پیشاب کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ان میں وزن متناسبہ کم ہو جاتا ہے۔

ظاہری حالت: تن درست شخص کا پیشاب بالکل صاف و صفاف ہوتا ہے، لیکن مرض کی موجودگی میں پیشاب میں گدلا پن ہوتا ہے۔

رسوب: تن درست شخص کے پیشاب میں کسی قسم کا رسوب (پلمینٹ) نہیں ہوتا ہے، لیکن جگر یا گردے کا فعل بگڑ جانے کی حالت میں پیشاب میں مختلف قسم کے رسوب پائے جاتے ہیں۔

رسوب کے رنگ اور علامات

بھورے رنگ کا رسوب یورٹیس (Urates) کے اخراج میں ہوتا ہے۔

سفید رنگ کا رسوب فوسفیٹ (Phosphate) اور کسی قدر سیاہ رنگ کا رسوب

اکزلیٹ Oxalate کو ظاہر کرتے ہیں اور ان رسوب کی موجودگی میں پیشاب کسی قسم سفید اور گاڑھا ہوتا ہے۔

سرخ رنگ کا رسوب یورک ایسڈ کی علامت ہے۔

کیمیاءوی امتحان

(Chemical examination)

پیشاب کے کیمیاءوی امتحان سے حسب ذیل چیزیں معلوم کی جاتی ہیں:

- (۱) رد عمل (۲) یوریکس (۳) فاس فیٹ (۴) ایل بیومن (۵) شکر (۶) ایسی ٹون
(۷) ڈائی ایسی ٹک ایسڈ (۸) ہائل (۹) انڈکین (۱۰) خون (۱۱) پیپ۔

(۱) رد عمل (Reaction) طبعی حالت میں پیشاب کا رد عمل (چوبیس گھنٹے تک) ہلکا ترش (ویک ایسڈ) ہوتا ہے اور اگر زیادہ دیر تک کھلا پڑا رہے تو کھاری (اکلی) اور گدلا ہوتا ہے اور اس میں عمل بخیر ہو کر ایمونیا کی بو آنے لگتی ہے۔ اگر پیشاب کا رد عمل زیادہ ترش ہو تو اس سے بخار، وجع المفاصل اور ماضیہ کی خرابی ظاہر ہوتی ہے، مگر گوشت اور مرغی غذاؤں کے زیادہ کھانے سے بھی ترشی بڑھ جاتی ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر پیشاب کا رد عمل کھاری (اکلائن) ہو تو یہ دم نشانہ کی علامت ہے۔

(۲) یوریکس (Urates) یہ بھورے رنگ کا مادہ ہے جو پیشاب میں نہ نشین ہو جاتا ہے۔ صحت کی حالت میں یورک ایسڈ پیشاب میں بہت کم پایا جاتا ہے، لیکن سنگ گردہ و مثانہ، وجع المفاصل اور اکثر بخاروں میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یہی مادہ وجع المفاصل اور نقرس کے مریضوں میں جوڑوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ اگر پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو تو یہ پیشاب کے برتن میں سرخ یا زرد رنگ کی صورت میں نہ نشین ہوتا ہے۔

(۳) فاس فیٹس (Phosphates) پیشاب میں فاس فیٹ کی موجودگی حاملہ کی تے اور لہتم امعار کی علامت ہے۔

(۴) رطوبت بیضیہ (Albumin) اگر پیشاب میں ایل بیومن موجود ہو تو یہ

بول زلالی، ددم گروہ مزمن، وجع المفاصل، متعدی بخار اور بعض ہیئتات کو ظاہر کرتی ہے۔

(۵) شکر (Sugar) عام طور پر پیشاب میں شکر آنا ذیابیطس کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر ذات الرتہ، ثنائی فس فیور، وجع المفاصل، ملاخض، مدغ و خلع کے بعد اس کی خفیف مقدار ماضی طور پر پائی جاتی ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں میں یہ دیکھنے کے لیے کہ دماغ سے نائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، شکر کی مقدار پیشاب کے ٹیسٹ کے فدرلہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔

(۶) ایسی ٹون (Acetone) ذیابیطس، دار الکلب (ہائیڈرو فوسیا)، تشنج زچہ، جہازی تے (Sea Sickness) کلور دفارم کے زہر اور شدید بخاروں میں جب کہ پیشاب سخت ترش ہو، غذا، صغم نہ ہوتی ہو اندتے بار بار آنے تو ایسی ٹون موجود ہوتا ہے۔

(۷) ڈائی ایسی ٹک ایسڈ (Diacitic acid) سرطان (کارسینوما) دماغی بیماریوں اور ذیابیطس وغیرہ میں اس کو ضرور معلوم کرنا چاہیے، کیوں کہ ایسی ٹون کے اخراج کے وقت یہ بھی ضرور خارج ہوتا ہے۔

(۸) صفرا (Bile) یزقان، جگر میں اجتمع الدم، صفرا الکبد، طیرا اور دیگر خندیدہ بخاروں میں صفرا خارج ہوتا ہے اور اس کی موجودگی فاسفوس کے زہر اور جمل جانے کو بھی ظاہر کرتی ہے۔

(۹) انڈیکن (Indican) طبعی حالت میں اس کی خفیف مقدار پیشاب میں موجود ہو سکتی ہے، مگر آنتوں کی رکاوٹ، سل ووق، سرطان معدہ، جگر، ددم کلاہ گروہ (ایڈی سنز ڈیمیریز) ہیضہ کی ابتدائی حالت اور سلفر باقتد (گندھک کا فضل) کھانے سے یہ زیادہ ہو جاتی ہے۔

(۱۰) خون (Blood) پیشاب میں خون کی آمیزش، امراض گروہ، درد گروہ، سنگ پشانہ، شدید ددم گروہ، خدیہ متعدی بخار، چیچک اور سوزاک میں پائی جاتی ہے۔ ٹسپکھر کین تھری ڈین اور ابل وغیرہ کے کھانے اند تو تیا اور فاسفوس کے زہر سے بھی خون آنے لگتا ہے۔

(۱) پیپ Pus التهاب حوض الکلیہ (پالائی ٹس) درم نانزو (یوری تھرائی ٹس) اورم مشاد (سس ٹائی ٹس) درم غدہ قدامیہ (پراسٹائی ٹس) اور سوناک وغیرہ میں پیشاب میں پیپ خارج ہو ا کرتی ہے۔ اگر پیپ گردوں سے آرہی ہے تو پیشاب میں اچھی طرح ملی ہوئی ہوتی ہے اور پیشاب کا رد عمل تیزابی ہوتا ہے، لیکن جب پیپ مشانہ سے آرہی ہو تو وہ تھوڑی دیر کے بعد پیشاب کے برتن کے پینڈے میں جم جاتی ہے اور اس کا رد عمل شحم ہوتا ہے مخاط بلغمی (Mucus) اگر پیشاب تھوڑی دیر تک رکھا ہے تو بلغم اس میں تیرنے لگتا ہے۔ اگر پیشاب کا وزن مناسب زیادہ ہو تو بلغم درمیان میں بلکہ سرے پر تیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر پیشاب میں خون موجود ہو تو بلغم بادامی رنگ کا ہوگا۔

اگزلیٹ (Oxalate) یہ چلے نوشی، ٹماٹر، گوبھی، پالک، بیکن، مٹھی، انجیر، ناشپاتی، کیلا اور سٹرابیری وغیرہ کھانے سے برآمد ہوتے ہیں۔ اس سے گردہ و مشانہ کی پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔

سلفیٹ (Sulphate) قبض، پھوڑے پھنسی اور بخاروں میں یہ برآمد ہوتا ہے، مگر تشخیص امراض کے سلسلہ میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔

یوروبائلین (Urobilin) یہ مادہ آشک، عظیم کبد، سل ودق اور طیریا بخار کے مریضوں کے پیشاب میں پایا جاتا ہے۔

خوردبینی امتحان

(Microscopic examination)

خوردبینی امتحان سے پیشاب میں یورک ایسڈ اور دیگر نمکیات بول کی قلیں، مختلف اقسام کے قشر اور سانچے، گردے اور مشانہ کے خلیات بشرہ (اپنی تعمیل سیلن) کیسے ہائے خون، روغنی ذرات، جراثیم قولون، جراثیم حئی محرقہ، جراثیم سل اور جراثیم سوناک وغیرہ کا پتہ چلتا ہے اور

سپر ٹونڈا (مٹی کے کیڑے) بھی خوردبینی امتحان سے پیشاب میں اچھی طرح شناخت ہو جاتے ہیں۔ گردوں کی نالیوں کے سانچے، گردوں کی پُرانی سوزش کو ظاہر کرتے ہیں۔ مگر ان سانچوں کے ساتھ خون کے سرخ یا سفید دانے موجود ہوں تو یہ شدید ورمِ گردہ کی علامت ہے۔ اگر سانچے بے رنگ اور شفاف ہوں تو یہ ہائیلین کاسٹ (Hyaline Casts) کہلاتے ہیں اور یہ ورمِ گردہ مزمن کے مریضوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگر خون کے سرخ یا سفید دانے بہت زیادہ مقدار میں پائے جائیں تو یہ پیپ کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں۔

پندرہ سو سی سی پیشاب میں اخراج فضلات کا اوسط

(۱) ایمونیا	(Ammonia)	۰.۴۶ سی سی	فی ایک سو سی سی
(۲) کلورائیڈ	(Choloride)	۰.۵ سی سی	فی ایک سو سی سی
(۳) یوریا	(Uria)	۱۶ سے ۲۳ سی سی	فی ایک سو سی سی
(۴) یورک ایسڈ	(Uric Acid)	۰.۰۵	
(۵) انڈیکین	(Indican)	۰.۲ سے ۱.۴ ملی گرام	
(۶) کریٹین	(Creatine)	۰.۵ سے ۳.۵ ملی گرام	فی ایک سو سی سی
(۷) کریٹینین	(Creatinine)	۰.۶ سے ۰.۸ ملی گرام	فی ایک سو سی سی
(۸) ٹوٹل نائٹروجن	(Total Nitrogen)	۰.۸ سے ۱.۲ گرام	
(۹) فاسفیٹ	(Phasphate)	۱۶ گرام	فی ایک سو سی سی

خون کا امتحان

خون کے امتحان کرنے سے ایسے امراض کی تشخیص کی جاسکتی ہے، جن میں خون کی ترکیب کے اندر کسی قسم کی تبدیلی یا نقص پیدا ہو جاتا ہے۔

عام طور پر خون کے امتحان میں حسب ذیل امور کو دیکھا جاتا ہے :

- (۱) خون کے مختلف قسم کے خلیات (Cells) کی تعداد
- (۲) خون کے حمرة الدم (Haemoglobin) کی حالت اور مقدار
- (۳) خون کے اندر غیر طبعی اشیاء یعنی حویات غریبہ اور جراثیم وغیرہ کی موجودگی۔
- (۴) خون کے طبعی اور کیمیائی تغیرات۔

۱۔ خون کے مختلف قسم کے خلیات کی تعداد

(۱) سرخ دانہ ہائے خون (Red Blood Cells) صحت کی حالت میں ان کی تعداد مردوں میں تقریباً پچپن لاکھ دس ہزار اور عورتوں میں پچاس لاکھ سولہ ہزار فی مکعب ملی میٹر ہوتی ہے۔ نوزائیدہ بچوں اور رموی مزاج لوگوں میں اور بلند پہاڑوں کی آب و ہوا سے ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اکثر قسم کے امراض خون اور جریان خون کے فوراً بعد، وضع حمل اور کثرت شراب نوشی کے اثر سے ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔

(۲) سفید دانہ ہائے خون (White Blood Cells) جوان مردوں میں صحت کی حالت میں ان کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو اور عورتوں میں سات ہزار سات سو فی مکعب ملی میٹر ہوتی ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں سترہ ہزار فی مکعب ملی میٹر اور سات برس کی عمر تک کے بچوں میں دس ہزار سے چودہ ہزار فی مکعب ملی میٹر تک ہوتی ہے، لیکن زمانہ حل میں غذا کے تھوڑی دیر بعد سرد پانی سے غسل کرنے اور ورزش کرنے کے کچھ دیر بعد تک ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ بعض قسم کے بخاروں میں ان کی تعداد زیادہ اور بعض میں کم ہو جاتی ہے۔ اگر جسم کے اندر کسی جگہ پیپ پیدا ہو کر جمع ہو گئی ہو تو بھی خون کے سفید دانوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تشنجی ذروں کی حالت میں، خواہ وہ کسی وجہ سے ہوں، جسم کے اندر کسی جگہ سرطان کی موجودگی میں، گرمی کی شدت اور لو لگ جانے کی حالت میں، نیز بعض دواؤں

کے استعمال سے بھی ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ قیح الدم، فات الریه، سُرخ بادہ، ہڈیوں کے گودے کی سوجن (Osteomyelitis) دل کے اندما ستر کرنے والی جھلی کا دمِ دماغی پردوں کے ورم سلی، سرطان اور کھانسی میں خون کے سفید دانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور یہ ان امراض کی تشخیصی علامات ہیں۔

(۳) اقراص الدم (Blood Platelets) خون میں ان کی طبعی تعداد ڈھائی لاکھ سے پانچ لاکھ فی کعب ملی میٹر ہوتی ہے، لیکن مرض فرنورا (Purpura) میں ان کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے۔

حمرۃ الدم (Haemoglobin) کی مقدار

جوان مردوں میں ہیموگلوبن کی طبعی مقدار ۱۵.۸ گرام فی ایک سوسی سی اور عورتوں میں ۱۴.۵۲۶ گرام فی ایک سوسی سی ہوتی ہے۔

خون کے مرض اخضر (Chlorosis) میں ان کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے اور خون کے سُرخ دانے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف فقر الدم مہلک (Pernicio) us Anemia میں خون کے سُرخ دانے کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ ان دونوں بیماریوں کی تشخیص میں یہی امتیازی فرق ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں میں کبھی کبھی خون کے سُرخ دانوں کے اندر شحم (چربی) جمع ہو جانے سے ان کی سُرخ بلکی ہو جاتی ہے۔

خون کے اندر غیر طبعی اجزاء

خون کے اندر عام طور پر ذیل کے حویات غریبہ اور جراثیم پائے جاتے ہیں:

(۱) لیریا (موسمی بخار) کے مختلف قسم کے حویات۔

(۲) کالا زار کے حویات

- (۳) فیل پا اور بول کیلوسی کے پیدا کرنے والے حوئیات
 (۴) بول الدم اور ایک خاص قسم کی پشیش پیدا کرنے والے حوئیات (بہار دیا ہیے ٹویا)
 (۵) حمی نکسیہ (Relapsing fever) کے جراثیم۔
 (۶) مرض النوم کے حوئیات (Trypanosomiasis)
 (۷) پیپ پیدا کرنے والے گول اور لمبے جراثیم
 (۸) ماٹا بخار کے گول جراثیم
 (۹) عصی تیغوریہ (حمی محرقہ بطنی کے لمبے جراثیم)

خون کے طبعی اور کیمیائی تغیرات

خون کے طبعی یا کیمیائی تغیرات کے لیے خون کا رد عمل، وزن مخصوص اور قوت انجماد کو دیکھا جاتا ہے۔

رد عمل: خون کا طبعی رد عمل ہمیشہ پی۔ ایچ، عک ... ہوتا ہے، لیکن بعض حالات میں اس کے کھاری پن میں کمی و بیشی ہوتی رہتی ہے اور جنس کے لحاظ سے بھی اس میں فرق ہوتا ہے، یعنی مردوں کا خون عورتوں اور بچوں کے خون کی بہ نسبت زیادہ کھاری ہوتا ہے۔ سخت جسمانی محنت اور ترش چیزوں کے عرصے تک کھانے سے دم ایض (Leukaemia) فقر الدم خبیث (Pernicious Anemia) قلت الدم (Anemia) ذرا بیٹن سرطان، شدید لاغری اور مرض اخضر (Chlorosis) میں خون کا کھاری پن کم ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کھانا کھانے کے بعد اور عرصے تک کھاری اشیاء کھانے سے خون کا کھاری پن بڑھ جاتا ہے۔

وزن مخصوص: خون کا طبعی وزن مخصوص ۱۰۵۵ سے ۱۰۶۲ ہوتا ہے۔ خون کے وزن مخصوص کی کمی و بیشی، ہیوگلو بین کی کمی و بیشی پر اثر انداز ہوتی ہے۔

قوتِ انجماد: خون میں متعدی زہروں کے شریک ہو جانے، کسی مرض کی وجہ سے عروقی دموئیہ کی دیواروں کے کھردرا ہو جانے، عام کمزوری و لاغری، خون میں نمک کی مقدار زیادہ ہو جانے اور قسم بولی وغیرہ کی صورتوں میں خون کی قوتِ انجماد بڑھ جاتی ہے، یعنی خون جلدی جمنے لگتا ہے۔ ان کے برعکس مرضِ ہیوفیلیا (Hemophilia) پتی اچھلنا (Urticaria) کھجلی اور دیگر جلدی بیماریوں میں خون کی قوتِ انجماد کم ہو جاتی ہے یعنی خون کے جمنے میں دیر لگتی ہے۔

خون کی طبعی کمی و بیشی

جسمِ انسانی کے وزن کے لحاظ سے خون کی طبعی مقدار حسب ذیل ہوتی ہے:

- (۱) بدن کے کل وزن کا $\frac{1}{11}$ حصہ
 (۲) یا جسمانی وزن کے حساب سے ۸۵ مکعب سینٹی میٹر فی کلو گرام
 (۳) یا جسمانی وزن کے حساب سے ۸۵ فی صد

جسامت، وزن اور قدر کی لمبائی کے مطابق خون کی طبعی مقدار میں اختلاف ہوتا ہے، مگر ایک جوان آدمی میں اس کی اصلی حد چار ہزار سے آٹھ ہزار مکعب سینٹی میٹر ہے، جس کا اوسط ۸۷۵۷ مکعب سینٹی میٹر فی مربع میٹر ہوتا ہے۔

ڈفرینشل کاؤنٹ (Differential Count in percentage)

اس طریقہ امتحان سے خون کے اجزاء اور ان کا اوسط حسب ذیل ہے:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| ۱۔ نیوٹروفیلز (Neutrophiles) | ۶۰ سے ۶۸ |
| ۲۔ مائی لوسائٹس (Mylocytes) | صفر |
| ۳۔ ایسی نو فیلز (Eosinophiles) | ایک سے ۳ فی صد |
| ۴۔ بے سوفیلز (Basophiles) | ایک فی صد |

(۵) لم فوسائٹس (Lymphocytes) ۲۲ سے ۳۸ فی صد

(۶) لارج ہیالائنز (Large hyalines) ۳ سے ۱۰ فی صد

خون کی کیمیائی ترکیب (Chemical Composition of Blood)

خون کی طبی پلازما (Normal Plasma) کا تناسب

۱۔ جسمانی وزن کے حساب سے ۵۰ مکعب سینٹی میٹر فی کلو گرام

۲۔ یا جسمانی وزن کے حساب سے ۵ پانچ صد

پلازما پروٹینز (Plasma Proteins) کے اجزاء کا تناسب

۱۔ البیومن (Albumin) ۴۵ سے ۵۳ گرام فی ایک سو سی سی پلازما

۲۔ شکر (خالی پیٹ) (Sugar Fasting) ۸۰ سے ۱۲۰ ملی گرام فی ایک سو سی سی خون

۳۔ شکر (بعد غذا) (Sugar after meals) ۱۲۰ سے ۱۵۰ ملی گرام فی ایک سو سی سی خون

۴۔ یورک ایسڈ (Uric Acid) ۲ سے ۴ ملی گرام فی ایک سو سی سی خون

مادہ تولید کا امتحان

باجھوپن کے سبب کو معلوم کرنے کے لیے مرد کے مادہ تولید کا امتحان کرنا بہت ضروری ہے، کیوں کہ اولاد کے پیدا ہونے کا انحصار مادہ تولید کے توام، مقدار اور اس کے کیڑوں (Spermatozoa) کی کل میٹ تعداد انسان میں زندہ اور متحرک کیڑوں کی طبی تعداد وغیرہ پر ہے۔
مادہ تولید کی مقدار: ایک بالغ تن درست مرد کی منی کی مقدار ایک بار کے انزال میں اوسطاً چار سی سی ہوتی ہے، اگر اس کی کمی یا زیادتی تین سی سی سے سات سی سی تک تسلیم کی گئی ہے۔ اگر مادہ تولید ایک بار کے انزال میں تین سی سی سے کم ہو تو یہ مقدار طبی سے کم ہے۔

رنگ و قوام : مادہ تولید کا رنگ طبعی طور پر سفید چکنا (Cream colour) اور قوام گاڑھا ہوتا ہے۔

رد عمل : اس کا طبعی رد عمل کھاری ہوتا ہے۔

بُوء : ایک خاص طرح کی بُوء ہوتی ہے۔

امتحان کے لیے مادہ تولید حاصل کرنے کا طریقہ

ٹیسٹ کے لیے مادہ تولید کا نمونہ اس وقت حاصل کیا جائے، جب کہ لیسوریٹری میں کام ہو رہا ہو، تاکہ حاصل کیا ہوا مادہ تولید زیادہ دیر تک نہ پڑا رہے۔ اس کو حاصل کرنے کا اصلی طریقہ جماع ہے، یعنی عورت کے ساتھ جماع کر کے مادہ تولید لیا جائے، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے جماع نہ ہو سکے تو پھر ہاتھ کے ذریعہ نکال کر لینا چاہیے۔ یہ نمونہ صاف اور خشک ٹیوب میں جمع کیا جائے اور ٹیوب کے منہ کو صاف کر کے صاف ردئی سے اس کا منہ بند کر لیا جائے۔ اگر سردی کا موسم ہو تو اس ٹیوب کو کوٹ کی اندر کی جیب میں رکھ کر لیسوریٹری مک لانا چاہیے اور یہ نمونہ حاصل ہونے کے زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے تک لیسوریٹری میں آجانا چاہیے۔ اب اس ٹیوب کو اتنی دیر تک حفاظت سے رکھا رہنے دیں کہ تمام مادہ تولید کا تمام اچھی طرح گھل مل کر یکساں ہو جائے۔ پھر اس کا معائنہ شروع کیا جائے۔

حیواناتِ منویہ کی تعداد

مادہ تولید کے کیڑوں کی طبعی کل تعداد ایک سی سی میں چھ کروڑ سے بیس کروڑ تک ہوتی ہے اور ایک بار کے انزال میں پچیس کروڑ سے چھتیس کروڑ تک اوسطاً ہوتی ہے۔ ان میں ۵۰ فی صد ذمہ و متحرک اور بناوٹ کے مکمل ہونے ضروری ہیں۔ اگر کیڑوں کا شمار ایک سی سی میں چھ کروڑ سے کم اور ایک انزال میں مادہ تولید کی

مقدار تین سی سی سے کم ہے اور زندہ و متحرک کیڑوں کی تعداد ۲۵ فی صد سے کم ہے تو اس حالت میں حمل قرار نہیں پاسکتا۔

مادہ تولید کا نمونہ لینے سے پہلے یہ بھی ضرور معلوم کر لینا چاہیے کہ جماع کیے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے، کیوں کہ جماع کرنے کے ایک ہفتہ بعد تک یہ کیڑے بڑھتے رہتے ہیں، اس لیے کم از کم جماع کرنے کے ایک ہفتہ بعد مادہ تولید کا نمونہ ٹیسٹ کے لیے لینا چاہیے۔ یہ زیادہ قابل اعتبار ہوتا ہے۔

(نوٹ) اگر جماع کرنے کے دو گھنٹے بعد عورت کی اندام نہانی کی رطوبت لے کر اس کا معائنہ کیا جائے اور اس میں زندہ و متحرک کیڑے مل جائیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرد کے مادہ تولید میں کوئی خرابی نہیں ہے اور اس رطوبت کے ٹیسٹ کے بعد مرد کے مادہ تولید کے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔

بعض اشخاص مادہ تولید کا نمونہ فریج یا کنڈوم وغیرہ میں لیتے ہیں۔ یہ قابل اعتبار نہیں ہے، کیوں کہ ان آلات میں جو کیمیائی مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے اس سے منی کے کیڑے مر جاتے ہیں اور ٹیسٹ کا نتیجہ غلط ہوتا ہے۔

خراب مادہ تولید کی اصطلاحات

- (۱) اسپرمیا Aspermia مباشرت کرنے پر مادہ تولید کی تھیلی سے منی کا باہر نہ نکلنا۔ مرد کے بدن میں جب کوئی زہریلی چیز نقص پیدا کرتی ہے تو منی میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔
- (۲) آزوسپرمیا Azoospermia مادہ تولید میں پیداؤش کی طاقت رکھنے والے کیڑے نہ ہونا۔

(۳) اولیگوسپرمیا (Oligospermia) مادہ تولید میں کیڑے تو ہوتے ہیں مگر بہت ہی کم یعنی ایک سی سی میں بیس ہزار سے بھی کم۔

(۴) اِستھی نوزوسپرمیا (Asthenospermia) وہ کیڑے جو کمزور اور سست رفتار ہوں ان سے بھی حمل نہیں قرار پاتا (کیوں کہ عورت کے بیضہ تک طاقتور اور تیز رفتار کیڑا ہی پہنچ سکتا ہے۔

(۵) پایوسپرمیا (Pyospermia) جس مادہ تولید میں پیپ ہو۔
(۶) کریسٹولوسپرمیا (Crystolo Spermia) جس مادہ تولید میں کرٹل (دانتے زیادہ ہونا) ہو۔

(۷) یوزوسپرمیا Euzoospermia نرے فی صد کیڑوں کے سر ٹھیک نہیں ہوتے ان کے سر ملے ہوئے ہوتے ہیں۔

(۸) ہیمو سپرمیا (Haemospermia) سوزاک کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں درم ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے مادہ تولید سے بھی حمل قرار نہیں پاتا ہے۔
(۹) نیروزوسپرمیا (Neerozoo Spermia) مادہ تولید کے کیڑوں کی حرکت یا رفتار میں کمی ہونا۔

(نوٹ) مادہ تولید کے مندرجہ بالا ناقص ایسے ہیں کہ ان کی موجودگی میں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔

فشار الدم

(Blood Pressure)

آج کل ہر تعلیم یافتہ شخص بلڈ پریشر کے نام سے واقف ہے۔ عام طور پر ایک اکیس سالہ تندرست آدمی کے خون کا طبعی دباؤ ۱۱۵/۵۵ ملی میٹر سیالی (قلب سکڑنے کی حالت میں اور ۱۲۰/۷۰ ملی میٹر سیالی (قلب پھیلنے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اگر اس عمر میں خون کا دباؤ اس سے زیادہ یا کم


ہو جائے تو یہ کسی مرض کی علامت ہے۔ اگر خون کا دباؤ زیادہ ہو جائے اور یہ زیادتی مستقل طور پر قائم رہے تو یہ خون کے دباؤ کی زیادتی (ہائی بلڈ پریشر) کہلائے گا۔ اگر یہ طبی دباؤ سے کم ہو جائے اور مستقل طور پر رہنے لگے تو اس کو خون کے دباؤ کی کمی (لو بلڈ پریشر) کہتے ہیں۔ مگر یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ تن درستی کی حالت میں بھی خون کا دباؤ ہمیشہ یکساں ہی نہیں رہتا بلکہ بعض وجوہ سے یہ بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔ یعنی جسمانی حرکات، انفعالات نفسانی اور غذا و محنت کے سبب سے اس میں اتار ادر چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، مثلاً جب کوئی شخص غصے سے جوش میں آجاتا ہے تو اسی وقت خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیا جائے یا جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے یا ننگے بدن ایک دم ٹھنڈی ہوا میں آجائیں تو اس وقت بھی خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ ورزش کرنے اور بھاگنے دوڑنے سے بھی خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام تن درست آدمیوں کا دباؤ بھی برابر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر شخص کے خون کے دباؤ میں فرق ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود خون کے دباؤ کا ایک خاص اوسط مقرر کیا گیا ہے۔ اگر اس مقررہ اوسط سے خون کا دباؤ بڑھ جائے یا گھٹ جائے تو بدن میں مخصوص علامات و عوارض پیدا ہو جاتے ہیں

بلڈ پریشر معلوم کرنے کا طریقہ

خون کا دباؤ معلوم کرنے کے لیے ایک خاص آلہ ہے، جس کا نام سفیگمو مینومیٹر (Sphygmomanometer) ہے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ربر کی تھیلی کو مریض کے بازو کے گرد لپیٹ کر ربر ٹیپ یا پمپ کے تھیلے کے اندر ہوا داخل کی جائے، جس سے تھیلیا پھولنا شروع ہو جائے اور بازو کی شریان پر دباؤ پڑے۔ ہوا بھرنے سے پہلے اس جانب کی نبض پر انگلیاں رکھیں اور صرف اتنی ہوا بھری جائے کہ نبض کا محسوس ہونا رک جائے۔ جب نبض محسوس نہ ہو تو فوراً پائپ کی ٹلی کے نشانات کو دیکھا جائے کہ پائپ کس درجے تک

پہنچا ہے۔ یہ درجہ سسٹولک پریشر (Systolic Pressure) (انقباضی دباؤ) ہے۔ جب ربر کے تھیلے میں ہوا داخل کی جا رہی ہو اور ہوا کا نبض پراتنا دباؤ نہ پڑا ہو کہ نبض بالکل بند ہو چکی ہو، اس وقت پارہ کبھی اوپر چڑھتا ہے اور کبھی نیچے اُترتا ہے۔ اس حالت میں پارے کے متحرک ہونے کے وقت سب سے بلند مقام پر جہاں پارہ پہنچے وہ ڈایاسٹولک پریشر (انبساطی دباؤ) (Diastolic Pressure) کہلاتا ہے۔

اس آلہ کے ذریعہ عمر کے مختلف حصوں میں ایک تن درست آدمی کے خون اور نبض کا طبعی دباؤ عام طور پر حسب ذیل ہوتا ہے:



۱۔ خون کا انقباضی اور انبساطی اور نبض کا طبعی دباؤ عمر کے مختلف حصوں میں

عمر	انقباضی دباؤ (سٹولک پریشر)	انبساطی دباؤ (ڈایاسٹولک پریشر)	نبض کا دباؤ
۵ سال ۱۹ سال کی عمر تک	۱۰۹.۵۲ فی میٹر سیابی	۷۰ فی میٹر سیابی	۳۹.۵۲ فی میٹر سیابی
۲۰ سال ۲۴ سال کی عمر تک	۱۱۱.۵۵	۷۲.۵۴	۳۹.۵۱
۲۵ سال ۲۹ سال کی عمر تک	۱۱۲	۷۱.۵۲	۴۰.۵۸
۳۰ سال ۳۴ سال کی عمر تک	۱۱۳.۵۶	۷۲	۴۱.۵۶
۳۵ سال ۳۹ سال کی عمر تک	۱۱۸.۵۶	۷۳.۵۶	۴۴
۴۰ سال ۴۴ سال کی عمر تک	۱۲۰.۵۴	۷۳.۵۲	۴۷.۵۲
۴۵ سال ۴۹ سال کی عمر تک	۱۲۲.۵۸	۷۵	۴۷.۵۸
۵۰ سال ۵۴ سال کی عمر تک	۱۲۶.۵۲	۷۷.۵۱	۴۹.۵۱
۵۵ سال ۵۹ سال کی عمر تک	۱۲۶.۵۴	۸۰.۵۴	۴۶
۶۰ سال ۶۴ سال کی عمر تک	۱۲۸	۸۲.۵۵	۴۵.۵۵
۶۵ سال ۶۹ سال کی عمر تک	۱۲۸.۵۶	۸۲.۵۸	۴۵.۵۸
۷۰ سال اور اس سے زائد عمر تک	۱۳۰.۵۲	۸۳	۴۷.۵۲

۲۔ خون کے انقباضی و انبساطی اور نبض کے دباؤ کا اوسط ہندستان کے مختلف حصوں میں

مقامات	انقباضی دباؤ	انبساطی دباؤ	نبض کا دباؤ
ہندوستانیوں کا اوسط	۱۱۵.۵۲ فی میٹر سیابی	۷۶ فی میٹر سیابی	۳۹.۵۲ فی میٹر سیابی
پنجاب، یوپی اور صوبہ ہٹی	۱۱۶.۵۲	۷۶.۵۴	۳۹.۵۸
بنگال، بہار اور صوبہ اڑیسہ	۱۱۳.۵۷	۷۶.۵۲	۳۸.۵۵
جنوبی ہندوستان	۱۱۵	۷۵.۵۶	۳۹.۵۸

۳۔ ہندوستانیوں کے خون کے دباؤ کا اوسط غذا کے اثرات کے لحاظ سے

غذا	رستولک پریشیر	ڈٹا یا سٹولک پریشیر	اوسط انقباضی دباؤ
مٹی جلی غذا کھانے والوں کا	۱۱۸۵۷	۷۳۵۳	۴۶۵۴
خالص سبزی کھانے والوں کا	۱۱۶۵۲	۷۲۵۵	۴۳۵۷

اگر خون کا دباؤ عمر کے لحاظ سے طبعی اوسط سے زیادہ یا کم ہو جائے اور یہ مستقل طور پر قائم رہے تو یقیناً یہ مرض ہے۔ اس کی طرف فوری توجہ کرنی چاہیے اور اس کے اسباب کی تلاش کر کے علاج و تدبیر اختیار کی جائیں۔

فشار الدم قوی (ہائی بلڈ پریشر) سے بچنے کی تدابیر

ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو ہمیشہ احتیاط و اعتدال کی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ زیادہ جسمانی مشقت، دماغی محنت اور فکر و بردیشانی سے بچنا چاہیے۔ لحمی غذائیں، مثلاً گوشت، انڈا، مچھل اور پنیر وغیرہ نہ کھائیں۔ شراب، تمباکو، چائے اور کافی وغیرہ ترک کر دیں۔ سر دپانی سے غسل کریں کیوں کہ اس سے جسم کے مسامات بند ہو کر خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ ہمیشہ نیم گرم یا گرم پانی سے غسل کیا جائے۔ سوتے وقت سر کے نیچے اونچا تکیہ رکھیں؛ یعنی لیٹتے وقت سر نیچا نہ رہے۔

ہائی بلڈ پریشر اور غذا

غذا: شروع میں جب بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو اس وقت بارہ یا چوبیس گھنٹے تک فاقہ کرایا جائے اور انتہائی بھوک کی حالت میں صرف پھلوں کا رس پلائیں۔ اس طریقہ سے مریض کو بہت سکون و آرام ملتا ہے اس کے بعد سادہ اور دودھنم غذا کم مقدار میں دی جائے۔ دودھ روزانہ دیا جائے۔ میزوں میں سلجم، گاجر، ٹنڈا، تندی، لوکی (کدو درانی)، کرم کدہ اور پالک وغیرہ

کھلائیں۔ آتش جوا در ساگودانہ بہ طور غذا دیا جائے پھلوں میں ناشپاتی، سنترہ، موسمی کارس اور تازہ لیموں کی سکنجبین وغیرہ پلائیں۔ ترکاری میں نمک بہت کم ڈالا جائے۔ اگر کچھ روز تک نمک بالکل بند کر دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ پانی بھی کم پیا جائے۔
 پیسہ ہیز، گوشت کسی قسم کا نہ کھائیں۔ کبیدہ، انگور، مٹھائی، کیک، پیسٹری، کھجور، چھدر، اروی، پیاز، دہی، پنیر اور کسی بھی قسم کی دال نہ کھلائیں۔

فشار الدم ضعیف

(Low Blood Pressure)

خون کے دباؤ کی زیادتی کی طرح خون کے دباؤ کی کمی بھی ایک مرض ہے، مگر یہ کوئی مستقل بیماری نہیں ہے۔ اس کے مریضوں میں خون کا دباؤ معمول سے کم ہو جاتا ہے۔ وہ تمام امراض، جن میں مریض کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور بدن میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، ان میں خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس کی عام علامات یہ ہیں کہ مریض کو ہر قسم کے دماغی و جسمانی کام سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس کے بدن اور چہرے کا رنگ نمدی مائل ہو جاتا ہے۔ جسم کے عضلات ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ مریض کے خیالات میں ہستی اور اس میں احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔ بالخصوص دماغی افعال سست ہو جاتے ہیں۔ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ طبیعت افسردہ رہتی ہے۔ نیند کم آتی ہے۔ درد سر اور درازنی سر ہوتا ہے۔ بعض رقت غشی طاری ہو جاتی ہے۔ معدہ اور آنتوں کے افعال میں فتور لاحق ہو جاتا ہے۔

تدابیر و غذا: اگر خون کے دباؤ کی یہ کمی عارضی ہو تو مریض کو چیت، لٹا کر اس کے پیروں کو اونچا کر دیں اور اگر خون کے دباؤ کی کمی مستقل طور پر ہو تو مریض کو آرام کرنے کی ہدایت کریں اور قوت بخش حیوانی غذاؤں کے ساتھ تازہ پھل اور خشک میوے کھلائیں۔

نبض

(Pulse)

دل کے پھیلنے اور سکڑنے سے شریان میں جو حرکت ہوتی ہے، اس کا نام نبض ہے۔ صحت کی حالت میں عام طور پر نبض ایک منٹ میں بہتر سے پچھتر مرتبہ تک حرکت کرتی ہے، مگر بچوں، بوڑھوں اور عورتوں میں نبض ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ عمر کے لحاظ سے نبض کی تعداد فی منٹ حسب ذیل نقشہ کے مطابق ہوتی ہے۔

نبض کی حرکات عمر کے لحاظ سے

۱۴۰ سے ۱۵۰ مرتبہ تک فی منٹ	(۱) جنین کی نبض کی حرکت مدہم مادر میں
۱۲۰ سے ۱۳۰ مرتبہ تک فی منٹ	(۲) نومولود کی نبض کی حرکت
۱۱۵ سے ۱۳۰ مرتبہ تک فی منٹ	(۳) پہلے سال میں نبض کی حرکت
۱۰۰ سے ۱۱۵ مرتبہ تک فی منٹ	(۴) دوسرے سال میں نبض کی حرکت
۹۵ سے ۱۰۵ مرتبہ تک فی منٹ	(۵) تیسرے سال میں نبض کی حرکت
۸۰ سے ۹۰ مرتبہ تک فی منٹ	(۶) سات سال سے چودہ سال کی عمر تک نبض کی حرکت
۷۵ سے ۸۰ مرتبہ تک فی منٹ	(۷) پندرہ سال سے اکیس سال کی عمر تک نبض کی حرکت
۶۵ سے ۷۵ مرتبہ تک فی منٹ	(۸) اکیس سال سے زائد عمر تک نبض کی حرکت
۵۰ سے ۸۵ مرتبہ تک فی منٹ	(۹) بڑھاپے میں نبض کی حرکت

سات سال کی عمر تک لڑکی اور لڑکے کی نبض میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مگر اس عمر کے بعد عورتوں کی نبض مردوں کی نبض کی نسبت چھٹے سے چودہ مرتبہ تک زیادہ حرکت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کی نبض جوانی میں ۸۵ مرتبہ اور بڑھاپے میں ۸۰ مرتبہ تک حرکت کرتی ہے۔

ہر قسم کی ریاضت اور محنت و مشقت کرنے اور دوڑنے، بھاگنے کے بعد نبض کی حرکت
بڑھ جاتی ہے۔

جسمانی حرارت

تشخیص مرض کے لیے جسمانی حرارت کے متعلق بھی واقفیت ضروری ہے۔ آج کل
جسمانی حرارت معلوم کرنے کے لیے تھرمائیٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب اس کے ذریعہ حرارت معلوم
کرنی ہو تو اس کو منہ، بغل، کنبج ران یا مقعد میں زیادہ سے زیادہ تین منٹ تک رکھا جائے۔
عام طور پر تین درستی کی حالت میں ہر شخص کا درجہ حرارت 37.5 سینٹی گریڈ (98.4 فارن ہائٹ) سے
کچھ زیادہ) ہوتا ہے۔ اگر درجہ حرارت اس سے زیادہ یا 37.5 سینٹی گریڈ (98.4 فارن ہائٹ)
سے کم ہو تو یہ کسی بیماری کی علامت ظاہر کرتا ہے۔ درجہ حرارت 37.5 سینٹی گریڈ (98.4 فارن
ہائٹ) سے کم ہونا قوت و حرارت کی کمی کی دلیل ہے اور 37.5 سینٹی گریڈ (99 فارن ہائٹ) سے
زیادہ درجہ حرارت ہونا بخار کو ظاہر کرتا ہے، یا بخار کے متعلق کسی اور بیماری کی علامت ہے۔
تھرمائیٹر استعمال کرنے کا طریقہ: درجہ حرارت معلوم کرنے سے پہلے تھرمائیٹر
کے پارے کو 37.5 سینٹی گریڈ (98.4 فارن ہائٹ) سے کم کر لینا چاہیے اور منہ میں رکھنے سے پہلے
اس کو کسی دافع عفونت محلول میں دھو لینا چاہیے۔ اگر وقت پمیا محلول نہ ہو تو صاف سرد یا گرم
پانی سے دھو کر منہ میں زبان کے نیچے رکھیں۔ اگر مریض بچہ ہو یا بے ہوشی کی حالت میں ہو تو تھرمائیٹر
منہ میں رکھنے کی بجائے بغل، کنبج ران یا مقعد میں رکھا جائے اور تھرمائیٹر رکھنے سے پہلے ان جگہوں
کو صاف کر لیا جائے۔ بغل میں جب تھرمائیٹر لگا یا جائے تو ہاتھ کو موڑ کر چھاتی پر رکھ دیں بغل
اور کنبج ران کا جو درجہ حرارت ہوا اس سے ایک درجہ زیادہ منہ کا ہوتا ہے، مگر مقعد کے ٹھیر پچر
سے منہ کا ٹھیر پچر ایک درجہ کم ہوتا ہے۔ منہ اور مقعد کا ٹھیر پچر زیادہ قابل یقین ہے۔ استعمال
کے بعد تھرمائیٹر کو کسی دافع عفونت محلول سے دھو کر رکھیں۔

جسمانی درجہ حرارت تھرمائیٹر کے ذریعہ

انتہائی کمزوری و نقاہت کی دلیل ہے	(۹۵ درجہ فارن ہائٹ)	۳۵.۵ سینٹی گریڈ
قوت کی کمی کی دلیل ہے	(۹۷ درجہ فارن ہائٹ)	۳۶.۵ سینٹی گریڈ
طبعی جسمانی حرارت ہے	(۹۸ درجہ فارن ہائٹ سے کچھ زیادہ)	۳۷ سینٹی گریڈ
زیادہ حرارت کی علامت ہے	(۱۰۱ درجہ فارن ہائٹ)	۳۸.۵ سینٹی گریڈ
بخار کی علامت ہے	(۱۰۳ درجہ فارن ہائٹ)	۳۹ سینٹی گریڈ
شدید بخار کی علامت ہے	(۱۰۳ درجہ فارن ہائٹ)	۳۹.۵ سینٹی گریڈ
بہت شدید بخار کی علامت ہے	(۱۰۵ درجہ فارن ہائٹ)	۴۱ سینٹی گریڈ
خطرناک علامت ہے	(۱۰۷ درجہ فارن ہائٹ)	۴۲ سینٹی گریڈ

سانس

عام طور پر سانس اور نبض کا تناسب ایک اور چار کا ہوتا ہے، یعنی ایک تن دس مرتبہ آدمی ایک منٹ میں اٹھارہ یا بیس مرتبہ سانس لیتا ہے اور سانس کی اس رفتار کے ساتھ نبض ۷۲ یا اسی مرتبہ حرکت کرتی ہے۔ بیماری کی حالت میں اس تناسب میں فرق پڑ جاتا ہے۔ عمر کے لحاظ سے بھی سانس کی رفتار میں اختلاف ہوتا ہے۔

سانس کی رفتار عمر کے مطابق

۲۵ سے ۳۵ مرتبہ فی منٹ	(۱) دو مہینے سے دو سال کی عمر تک سانس کی رفتار
۲۰ سے ۲۵ مرتبہ فی منٹ	(۲) دو سال سے چھ سال کی عمر تک سانس کی رفتار
۱۸ سے ۲۰ مرتبہ فی منٹ	(۳) چھ سال سے پندرہ سال کی عمر تک سانس کی رفتار

(۴) پندرہ سال سے زائد عمر تک سانس کی رفتار ۱۶ سے ۱۸ مرتبہ فی منٹ

نبض و جسمانی حرارت اور سانس کا تعلق و تناسب

جسمانی حرارت بڑھ جانے کی حالت میں نبض اور سانس کی رفتاریں بھی فرق پڑ جاتا ہے عام طور پر ان کا تناسب یہ ہوتا ہے کہ اگر طبعی حرارت سے ٹیمپریچر ایک درجہ بڑھ جائے تو نبض کی حرکات فی منٹ دس مرتبہ زیادہ ہو جاتی ہے اور سانس کی رفتار دو تین مرتبہ زیادہ ہو جاتی ہے، مثلاً اگر طبعی طور پر نبض کی حرکات ۷۵ مرتبہ اور جسمانی حرارت ۳۷ سینٹی گریڈ (۹۸ درجہ فارن ہائٹ) ہو تو سانس کی رفتار اٹھارہ اور بیس کے درمیان ہوگی۔ اگر ٹیمپریچر ۳۸ سینٹی گریڈ (ایک سو درجہ فارن ہائٹ) ہو تو نبض نوے یا پچانوے اور سانس تقریباً ۲۳ مرتبہ محسوس ہوگا۔

مرد کے جسم کا اصلی وزن چھاتی اور پیٹ کی پیمائش عمر کے مطابق

اگر اوسطاً ایک مرد کی لمبائی ۱۶۵ سینٹی میٹر (پانچ فٹ پانچ انچ) ہو تو عمر کے مطابق اس کا وزن اور اس کی چھاتی اور پیٹ کا ناپ حسب ذیل ہوگا:

عمر	وزن	چھاتی	پیٹ
بیش سال	۵۴ کلو (۱۲۰ پونڈ)	۷۸ سینٹی ایم (۳۱ انچ)	۷۸ سینٹی ایم (۲۷ انچ)
پچیس سال	۵۶ کلو (۱۲۵ پونڈ)	۸۱ سینٹی ایم (۳۲ انچ)	۷۹ سینٹی ایم (۲۸ انچ)
تیس سال	۵۷ کلو (۱۲۸ پونڈ)	۸۳ سینٹی ایم (۳۳ انچ)	۸۰ سینٹی ایم (۲۹ انچ)
پینتیس سال	۶۱ کلو (۱۳۵ پونڈ)	۸۶ سینٹی ایم (۳۴ انچ)	۸۳ سینٹی ایم (۳۱ انچ)
پالیس سال	۶۱ کلو (۱۳۶ پونڈ)	۸۶ سینٹی ایم (۳۴ انچ)	۸۳ سینٹی ایم (۳۱ انچ)
پینتالیس سال	۶۳ کلو (۱۴۰ پونڈ)	۸۶ سینٹی ایم (۳۴ انچ)	۸۳ سینٹی ایم (۳۱ انچ)
پچاس سال	۶۳ کلو (۱۴۰ پونڈ)	۸۶ سینٹی ایم (۳۴ انچ)	۸۳ سینٹی ایم (۳۱ انچ)

بچوں کے امراض کی تشخیص

ایک تن درست دتوانا بچہ ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی بیماری ہو جائے تو بے چین اور مضطرب رہتا ہے یا روتا رہتا ہے اور اکثر سوتے ہوئے چونک پڑتا ہے۔ چنانچہ اگر بچے کی پیشانی پر بل پڑتے ہوں اور وہ سوتے ہوئے چونک پڑے، یا رونے لگے تو اس سے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ بچے کو سینے کا کوئی مرض ہے، اگر بچہ کھانے دقت روتا ہے تو اس کی پسلی میں درد ہے۔ بچہ کا جلدی جلدی سانس لینا، اس کے ناک کے نتھنوں کا پھولنا اور منہ کھول کر سانس لینا مرض نمونیا کی علامات ہیں، اگر بچہ ضد کرے اور آنکھوں کے نیچے بل پڑیں تو یہ سر کی بیماری کی علامت ہے، اگر بچہ اپنی انگلی کان کی طرف لے جائے اور کان کو دبانے سے رونے لگے تو یہ کان کے درد کی علامت ہے۔ اگر بچے کی زبان سیلی اور اس کی اجابت سیاہی مائل اور بدبودار ہو تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیٹ اور ہاضمے کی کوئی تکلیف ہے۔ جب بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو اس دقت بچہ روتا ہے اور اپنے گھٹنوں کو سیکڑے رکھتا ہے اور ہاتھ پاؤں سرد ہوتے ہیں۔ اگر بچے کے پیشاب کی رنگت سرخ ہو تو یہ بخار آنے کی خبر دیتی ہے۔ اگر بچہ نیند میں دانت کڑکڑاتا ہو اور ناک کو کھجاتا ہو، منہ تو تھوک اور رال زیادہ آتی ہو تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں چر نے (چونے) ہیں بچے کے پیشاب میں تلچھٹ کا بیٹھنا یا جس جگہ پیشاب کرے اس جگہ سفیدی جمنے کی کم زوری کی علامت ہے۔

چول کہ شیر خوار بچوں میں ماں کے دودھ کے ذریعے دوا کی تاثیر ضرور ہوتی ہے، اس لیے یہ بہتر ہے کہ بچے کو دوا پلانے کے ساتھ ہی بچے کی ماں یا دودھ پلانے والی کو بھی دوا دی جائے اور اس کو پرہیز بھی بتایا جائے۔

بچوں کی پرورش

اس کا اندازہ کہ بچے کی پرورش درست طریقے پر ہونے ہی ہے، بچے کی نیند بھوک اس کی نقل و حرکت اور اس کی اجابت کی باقاعدگی سے بہ خوبی ہو سکتا ہے۔ اگر بچے کو مقررہ وقت پر نیند اچھی طرح آتی ہے، بھوک لگتی ہے، اس کی حرکات سے خوشی و مسرت جھلکتی ہے تو سمجھ لیجیے کہ بچے کا نشوونما درست طریقے پر ہو رہا ہے۔

بچے کے نشوونما کے لیے خصوصی طور پر ایک سال کی عمر تک ہوا غسل اور نیند ضروری چیز ہے۔ اس کی طرف والدین کو خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ بچوں کی غذا صاف ستھری خوش ذائقہ اور خوش رنگ ہونی چاہیے۔

بچوں کی پرورش کے لیے سب سے اچھی غذا ماں کا دودھ ہے۔ دودھ پلانے کے لیے اوقات مقرر کرنے چاہئیں۔ اگر بچے کا وزن ۳۰۰۰ گرام (۶ پونڈ) سے کم ہو تو ہر تین گھنٹے بعد دودھ پلایا جائے اور اگر بچے کا وزن اس سے زیادہ ہو تو ہر چار گھنٹے بعد اس کو دودھ پلائیں۔ تن درست بچے کا دودھ پانچویں چھٹے مہینے کے بعد رفتہ رفتہ کم کرنا شروع کر دیں اور نو مہینے تک اس کا دودھ بالکل چھڑا دیں۔ اگر بچہ بیمار ہو یا شدید گرمی کا موسم ہو تو اس حالت میں دودھ نہ چھڑائیں۔ دودھ ہمیشہ وقت مقررہ پر پلایا کریں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بچے کو ماں کا دودھ نہ پلایا جاسکے تو پھر گائے یا بھینس کا دودھ پلانا شروع کر دیں اور اس دودھ میں پانی اور چینی ضرور ملا لیا کریں اور گرم کر کے دودھ پلایا جائے۔ شروع میں اوپر دودھ بوتل سے پلائیں۔ اس پر بڑکی نپل اچھی طرح لگائیں۔ بوتل میں دودھ بھرنے سے پہلے اس کو گرم پانی سے اچھی طرح دھو لیا جائے اور پھر سرد پانی سے کھنگال لیا کریں۔ اسی طرح دودھ پلانے کے بعد بھی بوتل اور اس کی نپل کو گرم پانی سے دھو کر صاف کر کے بہ حفاظت کسی محفوظ جگہ رکھ دیں۔ چھ مہینے کے بعد بچے کو دودھ چھچھے سے پلانا شروع کریں اور جب بچے کے دانت نکلنے شروع

ہو جائیں تو اس وقت اس کو درودھ کے علاوہ ساگودانہ، ارادٹ، چاولوں کی فرنی اور مونگ کی دال کی نرم کھجڑی وغیرہ تھوڑی تھوڑی کھلانا شروع کریں۔ کچھ مہینے بعد تھوڑا سا مکھن اور دُبے ہوئے انڈے کی زردی کم مقدار میں دینا شروع کریں۔ نویں مہینے کے بعد گوشت کی بخنی بھی دینا شروع کریں۔

بچوں کا وزن اور قد عمر کے مطابق

پیدائش کے وقت ایک تن دھست بچہ عام طور پر قریباً ۸.۵ سینٹی میٹر (بیش لچ) لمبا اور ۳.۵ کلو گرام (پانچ، چھ پونڈ) وزنی ہوتا ہے۔ لڑکی کی بہ نسبت لڑکا قد اور وزن میں کسی قدر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وزن اور لمبائی صحت ور بچے کی شناخت ہے، لیکن اگر پیدائش کے وقت بچے کا وزن مذکورہ وزن سے کم ہو تب بھی کھئی فکر کی بات نہیں ہے، کیوں کہ یہ کمی بچے کی پرورش و نگہداشت میں احتیاط کرنے سے پوری ہو جاتی ہے۔ پیدائش کے چند دن بعد بچے کے وزن میں کمی ہونا ضروری ہے، مگر جب بچہ ایک ہفتے کا ہو جائے تو اس کا وزن کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے جتنا پیدائش کے وقت تھا۔

بچے کا قد اور وزن عمر کے مطابق

عمر	وزن	قد
ایک ماہ	تین کلو ۵۵۰ گرام (۱۲ پونڈ ۱۲ اونس)	۵۰.۵ سینٹی میٹر (۲۰.۱ لچ)
دو ماہ	چار کلو ۳۳۳ گرام (۹ پونڈ ۸ اونس)	۵۳.۳ سینٹی میٹر (۲۱ لچ)
تین ماہ	پانچ کلو (۱۱ پونڈ)	۵۵.۹ سینٹی میٹر (۲۲ لچ)
چار ماہ	پانچ کلو ۷۰۰ گرام (۱۲ پونڈ ۸ اونس)	۵۸.۴ سینٹی میٹر (۲۳ لچ)
پانچ ماہ	چھ کلو ۱۵۶ گرام (۱۴ پونڈ)	۵۹.۳ سینٹی میٹر (۲۳.۱ لچ)

چھٹے مہینے سے عام طور پر ایک تن درست بچے کا وزن ۵۹ ۳۵ ۳۵ گرام (ایک پونڈ) اور قد ۲۵ سینٹی میٹر (۱۰ انچ) ہر مہینے بڑھتا رہتا ہے، یعنی بارہ مہینے کے بچے کا وزن ۹ کلو ۵۳۴ گرام (۲۱ پونڈ) اور قد ۶۸.۶ سینٹی میٹر (۲۷ انچ) ہوتا ہے۔

تن درست بچے کا طبعی معیار

Fontanelle Closes ۱۸ سے ۲۴ مہینے تک

سر کا ہلنا بند ہو جاتا ہے	تین سے چار مہینے تک
دانت نکلنے لگتے ہیں	چھ سے سات مہینے تک
بیٹھے لگتا ہے	نوسے بارہ مہینے تک
چلنے لگتا ہے	بارہ سے اٹھارہ مہینے تک
صاف بولنے لگتا ہے	دو سال تک

سفید خدات خمد (W.B.C) پہلے سال میں	دس ہزار سے اٹھارہ ہزار تک فی سی ایم
سفید خدات خمد (W.B.C) پہلے سال کے بعد	سات ہزار سے بارہ ہزار تک فی سی ایم
سرخ خدات خمد (R.B.C)	ساتھ لاکھ ————— فی سی ایم ایم
ایموگلوبین	ستر سے اسی فی صد

پولی مورفونوکلیر سیلز - (Polymorphonuclear Cells) تیس سے چالیس فی صد (پہلے سال میں)

لمفوسائٹس (Lymphocytes) ساٹھ سے ستر فی صد (پہلے سال میں)

خمد کا وزن مخصوصہ (Specific gravity of Blood) ۱.۰۶۶ (سیدائش کے وقت)

بچوں کے اینما (حقنہ) لگانا

اگر بچوں کے اینما (حقنہ) لگانے کی ضرورت پڑے تو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ

اس کے لیے بچے کو زبردستی آمادہ نہیں کرنا چاہیے اور جب اینالگا نا ہو تو پہلے اس کی نلکی کو کسی تیل سے چکنا کر لیا جائے۔ دودھ پیتے بچے کے لیے ایک سے ڈیڑھ اونس تک محلول پہنچانا کافی ہے اور ایک سے پانچ سال تک کی عمر کے بچے کے لیے تین سے پانچ اونس اور پانچ سے دس سال تک کی عمر کے بچے کو چھ سے آٹھ اونس تک محلول کی مقدار اندر پہنچانی کافی ہے۔

اگر گلیسرین کا اینا بچے کو دیا جائے تو چھوٹے بچے کو آدھے ڈرام سے ایک ڈرام تک خالص گلیسرین اندر پہنچانی کافی ہے۔

فارماکوپیا

تنفشی گلیسرین

اجزاء: آیلو دین ۳ گرام
گلیسرین ۹ گرام

حب قاعدہ سیال تیار کریں۔
فوائد: قاتل جراثیم اور دافع تعفن ہر جلن کو دور کرتی ہے۔ درد کو تسکین دیتی اور زخموں میں مواد پڑنے سے روکتی ہے۔ درد گلو، ورم گلو وغیرہ میں مفید ہے۔

ٹومی گلیسرین

اجزاء: آپلہن تازہ ۱ ملی لیٹر
گلیسرین ۳ گرام

حب قاعدہ سیال تیار کریں۔
فوائد: کان کے درد، کان کی پھنسی، کان بہنا وغیرہ کے لیے مفید ہے۔

ترکیب استعمال: دو تین قطرے کان میں ڈالیں۔
استعمالات: کان کا درد، کان میں خشکی، کم سنائی دینا۔

اکسیر شفا (قرص)

اجزاء: اسرول سائیدہ ۱ گرام
پوٹاشیم برومائڈ ۱ گرام
میگ کارب ۱ گرام

سب کو بائیک کر کے قرص ۳۰ گرام (۶ رتی) کے تیار کریں۔

فوائد: ہر قسم کے جنون اور اختناق (رحم) (مٹریا) کے لیے مفید ہے۔ بے خوابی کو دور کرتی ہے۔

ہائی بلڈ پریشر (فشار الدم قوی) اور اس کے عوارض کو دور کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔

بہت جلد بغیر کسی نقصان کے بلڈ پریشر کو نامیل کر دیتی ہے۔ حساسیت (الرجی) کو دور کرتی ہے۔

خوراک: ایک یا دو قرص صبح یا رات کو کھلائیں۔ شدید حالات میں دونوں وقت بھی کھلا سکتے ہیں۔

استعمالات: درد سر، نیند نہ آنا، مرگی، پاگل پن، فالج و نقوہ، بچگی، بڑھاپی، پتی اچھلنا، احتلام یا ڈگولہ۔

جوشینا

مندرجہ ذیل دواؤں کے مرکب خلاصے (۹ ملی لیٹر)

گُل بنفشہ ۱ گرام

برگ گاؤزباں ۱۵۳۳ گرام

تخم خطمی ۱ گرام

تخم خبازی ۱۵۳۵ گرام

ملیٹھی ۱۵۵ گرام

غاب ۱ گرام

سپستان ۲۵۶۷ گرام

شربت سادہ (۷۰ فی صدی) بقدر ضرورت

فوائد: نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خراش اور

نزلی بخاریں مفید ہے۔

ترکیب استعمال: ایک خوراک تھوڑے سے

گرم پانی یا چائے میں ملا کر پیئیں۔ اگر گرم پانی اور

چائے نہ ملے تو یوں ہی چاٹ لیں۔

استعمالات: خسہ، کالی کھانسی، کن پھیڑ،

نزلہ و زکام، انفلوزنزا، دلدیر، سر، بہرائین ذات الہیہ

بخار و امراض عامہ (کان کا درد، نزلہ و زکام)

ذبح اطفال (امراض اطفال)۔

چوبی گلیسرین

(۱) اجزا: چوب زرد ۱ گرام

میتھیلنڈ سپرٹ ۷ ملی لیٹر

(۲) مذکورہ بالا سیال ۱ ملی لیٹر

گلیسرین ۲۵۵ گرام

پوٹاسیم آیوڈائیڈ ۱۶۶ ملی گرام

حسب قاعدہ سیال تیار کریں

فوائد: حنجرہ اور لوزتین کے درم کے لیے مفید ہے۔

ترکیب استعمال: پھریری سے لگائیں۔

استعمالات: حلق کا درد، دلدیر، گھائی پکنا

حب حالبہ

اجزا: کافور دیسی ۱ گرام

ہینگ ۱ گرام

افیون ۱ گرام

سب دوائیں بے کر کھل کر کریں اور پانی کی مدد سے

۱۶۲ ملی گرام (۱/۲ رقی) کی گولیاں بنائیں۔

فوائد: ہر قسم کی تھوڑی سی کوفور اور کوفی ہر۔

درد شکم اور اسہال میں بھی مفید ہے۔

خوراک: ایک گولی پانی سے کھلائیں۔ اگر

ضرورت ہوتے چار گھنٹے بعد دوسری خوراک
کھلا سکتے ہیں۔

استعمالات: میسنہ، جہازی تے، میضہ،
منگ گردہ و مشانہ، حلقہ کف و مٹی، تے
(امراض اطفال)۔

یرقان، درم و عظیم طحال، دیلان امعا، فشاخون
ضعیف، اختلاج قلب، رلو اسیر، ضعف باؤ
سبلان الرحم، بندش حیض

حب داد خاص

اجزاء: گندک آملہ سار ۱ گرام
اجوائن ربی ۱ گرام
رس کچر ۱ گرام
لال سفید ۱ گرام
سہاگہ چوکیہ ۵۰۰ ٹی گرام
سب کو باریک کر کے پانی کی مدد سے ۶۲۵ ٹی گرام
(۵ رتی) کی گولیاں بنائیں۔
فوائد: ہر قسم کے داد، چنیل وغیرہ کیلے
منفید ہے۔

ترکیب استعمال: ایک گولی لیموں کے
پانی یا سادہ پانی میں گھس کر دیر لگائیں۔
استعمالات: جہا سے، مٹے۔

حب طربہ اطفال

اجزاء: سیاب مصفی ۱ گرام
گندک آملہ سار ۱ گرام

حب حلیہ

اجزاء: کیسین خشک کیا ہوا ۳۳ گرام
تبی مصفی ۱۲ گرام
کتیرا سائیدہ ۲ گرام
گوار کیکر سائیدہ ۱۲ گرام
لکڑ گلوکوز ۳۲ گرام
ڈسٹاڈاٹر ۳۲ بوند
سب کو باہیک کر کے ملا کر ایک ایک گرام کی
ایک سو گولیاں تیار کریں۔

فوائد: مقوی خون ہے، اس لیے فقر الدم
اخضریہ، بچوں کا غذائی فقر الدم، حاملہ کا
فقر الدم اتنی کا فقر الدم اور مہلک فقر الدم
میں مفید ہے

خوراک: ایک ایک گولی صبح و شام کھائیں۔
استعمالات: ضعف جگر، کمی خون، استسقاء

کو درد کرتی ہے۔ خون اور پیپ آنے کی طاقت
ہے۔ اگر کھانسی میں خون آتا ہو تو اس حالت
میں بھی فائدہ مند ہے۔
خوراک : دو دو گویاں کھانا کھانے کے بعد
یا صبح دس پہر کے وقت کھلائیں۔
استعمالات : دق الریہ، دق الاسعاجیش
وبائی، اسہال (امراضی حالمہ)۔

حب ساق

اجزاء : مازد سبز
ساق
پوست انار
مویزج کوہی
افیون
۱ گرام
۱ گرام
۱ گرام
۱ گرام
۱۰۰ ملی گرام

سب کو باریک کر کے ۱۰ گرام (۱ رقی) وزن کی
گولیاں تیار کریں۔
فوائد : معدے کی کم زوری سے دست آنے
کی حالت میں بہت مفید ہے۔ بحیش اور مرور
کو بھی درد کرتی ہے۔
خوراک : ایک گولی پانی کے ساتھ کھلائیں
بچوں کو ۱/۲ یا ۱/۴ گولی کھلائیں۔

قریب سفید
حب السلاطین مدبر
مغز بید انجیر
۱ گرام
۱ گرام
۱ گرام
پہلی دونوں چیزوں کو کھول کر کے کھل بنائیں،
پھر باقی دواؤں کو باریک کر کے حسب معمول
باریک سفوف بنا کر ۱/۲ ۱۲ ملی گرام (۱ رقی)
کی گولیاں تیار کریں۔
فوائد : بچوں کے مرض ڈیہ ویسلی چلنا، اور
قبض کے لیے مفید ہے۔
خوراک : ایک ایک گولی صبح و شام ماں کے
دودھ یا پانی میں گھس کر پلائیں۔

حب رال

اجزاء : گوند کی کر
مال منید
۱ گرام
۳ گرام
دونوں کو باریک کر کے ۱۰ گرام (۱ رقی) وزن
کی گولیاں تیار کریں۔
فوائد : معدے اور آنتوں کی کم زوری کو
آنے والے دستوں کو بند کرتی ہے۔ سنگرہنی
کے لیے مفید ہے۔ آنتوں کے زخم اور خراش

استعمالات: تپ محرقہ، اسہال، بدھنی
اسہالی المفال۔

حب شہیقہ

اجزاء: جواکھار ۱ گرام
نفل سیاہ ۵۰ دا گرام
پیل کلاں ۳۱۵ گرام
انار دانہ ۷ گرام
قندیہ ۱۲ گرام
سب کو سفوف کر کے قندیہ ملا کر ایک گولی
۱۰ گرام (۹ رتی) کی بنائیں۔

فوائد: بچوں کی کالی کھانسی کے لیے مفید ہے
بڑوں کی تشنجی کھانسی میں دی جاسکتی ہے۔
خوراک: ایک ایک گولی صبح و شام پس کر
شہد خالص میں ملا کر چٹائیں، یا گرم پانی
میں گھول کر پلائیں۔
استعمالات: بلغمی کھانسی۔

حب عروس

اجزاء: مازوسبز ۱ گرام
گل بیت ۱ گرام

بھٹکری سفید ۱ گرام
کتھہ سفید ۱ گرام

سب کا باریک سفوف کر کے ایک گرام (ایک
لش) کی گولیاں پانی کی مدد سے بنائیں۔
فوائد: عورتوں کے رحم کی رطوبت کو خشک
کرتی ہے اور تنگی پیدا کرتی ہے۔ عضلاتِ رحم
کے ڈھیلے پن کو دور کرتی ہے۔
ترکیب استعمال: ایک گولی رات کو
اندامِ بہانی میں رکھ دی جائے اور صبح کو نکال
دی جائے۔

استعمالات: سیلانِ رحم، سیلانِ خون

حب نمبکچور

اجزاء: زنجبور ۱ گرام
زیرہ سفید ۱ گرام
بلدی بریاں ۱ گرام
رسوت مصفی ۱ گرام
چاکسو مقشر ۱ گرام
برگ نیب ۱ گرام
برگ بکائن ۱ گرام
برگ ببول ۱ گرام

سب کو باریک کر کے پانی کی مدد سے ۱/۲ گرام
(۲ رتی) کی گولیاں بنائیں۔

فوائد: ہر قسم کے نزلے کے لیے مفید ہے جب
نزلہ بہتا ہو، چھینکیں آتی ہوں تو اس حالت
میں فوری اثر کرتی ہیں۔ ضعف دماغ اور
نزلے کے درد سر کو دور کرتی ہے۔

خوراک: دو دو گولیاں پانی کے ساتھ
صبح و شام کھلائیں۔

استعمالات: نزلہ دزکام، آشوب چشم،
نسیان، درد گوش، ضعف باہ، جربان۔

دوائے اسہال اطفال

اجزاء: کافور ۴ گرام

سوڈا خردنی ۱۰ گرام

شوگر آف ملک ۵ گرام

پلو پیکاک ۱۵۲۵ گرام

بسمتہ کاربونیٹ ۲ گرام

سب دواؤں کو احتیاط سے کھول کر لیا جائے۔

خوراک: ۱/۲ گرام سے ۱/۲ گرام تک۔

فوائد: وستوں کو روکتی ہے، پیش کو روکتی
اور بد معنی کو دور کرتی ہے۔

فنجینہ انار ۵۰۰ ملی گرام

جائفل ۲ گرام

افیون ۸۲۷ ملی گرام

سب کو باریک کر کے پانی کی مدد سے گولیاں
۱/۲ گرام (ایک رتی) کی بنائیں

فوائد: بچوں کے ہرے پیلے دستوں کے لیے
مفید ہے۔ معدے اور ہاضمے کو درست کرتی

ہے۔ نساہ خون کی بیماریوں کے لیے بھی مفید ہے۔

خوراک: ایک ایک گولی چار چار گھنٹے بعد
ماں کے دودھ یا پانی میں گھس کر دیں۔

استعمالات: متھو آنا، قے، اسہال۔

حب نزلہ

اجزاء: جندہ سیدستر ۱ گرام

زعفران ۵۰۰ ملی گرام

رب السوس ۳ گرام

دارچینی ۳ گرام

افیون ۳۳۳ ملی گرام

گرد کیکر ۵ گرام

کتیر اسفید ۵ گرام

نشاستہ گندم ۵ گرام

دولے ادجاع

اجزاء: کشتہ گوشتی ۱ گرام

اسپرین ۲ گرام

سوڈیم برومائیڈ ۲ گرام

سب کو کھل کر کے سفوف بنائیں۔

فوائد: ہر قسم کے عصبی درد کو تسکین دیتی ہے۔

وجع المفاصل، نفرس، درد کمر، درد سر اور

اعضا شگی کے لیے خصوصاً بہت مفید ہے۔

انفرا سٹرا اور نرزی بخار میں جو تمام بدن اور

جوڑوں میں درد ہوتا ہے اسی حالت میں یہ

فوری اثر دکھاتی ہے۔

خوراک: ۱/۲ گرام (۲ دتی اسے ۱/۲ گرام

۱/۲ ماشہ) تک حسب ضرورت پانی یا چائے

کے ساتھ کھلائیں۔

استعمالات: دق عظام، کن پکڑ، آدھائی

گٹھیا، درد دندان، آشوب چشم، درد گوش

درد گوش، ذات الریہ، بد، کبھرائی انگلی پیر

درد کمر، درد رحم، باؤ گولہ۔

دولے خارس جدید

اجزاء: بورک ایٹڈ ۱ گرام

سفیدہ جت ۱ گرام

گشک ۵۰۰ ملی گرام

سب کا سفوف بنائیں۔

فوائد: ہر قسم کی کھلی، دار چنیل، اکڑ ہوا،

سورانی سس وغیرہ جلدی بیماریوں کے لیے

نہایت مفید چیز ہے۔ کسی قسم کی جلی نہیں ہوتی۔

ترکیب استعمال: ۱/۲ گرام (ایک تولہ) دوا

روغن سرسوں ۶ ملی لٹر (دھتورے) میں ملا کر

لگائیں۔ اگر روغن کیلہ میں ملا کر لگائی جائے تو

زیادہ مفید ہے۔ خشک پوڈر بھی چڑھا سکتا

ہے۔ چوگنے کھن میں یہ دوا ملا کر جلد کی معیوبی

بیماریوں میں استعمال کی جاسکتی ہے۔

دولے داڑھ

اجزاء: صیغ بچھناک ۱ ملی لٹر

صیغ کتھ ۵۰ ملی لٹر

صیغ مرکی ۱ ملی لٹر

کلوروفارم ۱ ملی لٹر

روغن لونگ ۵۰ ملی لٹر

گیلبرین ۱ گرام

کر یا زوٹ ۵۰ قطرے

ٹشکر آلو دین ۸ ملیٹر
 حسب قاعدہ سب کو ملا کر سیال بنائیں
 فوائد: مسوڑھوں اور دانتوں کی اکثر بیماریوں
 میں فوری فائدہ کرتی ہے۔ مسوڑھوں میں دم
 اور درد ہو، خون یا پیپ آتی ہو تو ان تمام
 حالتوں میں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔
 درد کو فوراً دور کرتی ہے۔
 ترکیب استعمال: پورے مسوڑھوں پر لگائیں۔
 استعمالات: درد دنداں، مسوڑھوں سے
 پیپ آنا، درد دنداں (امراض حائل)

دوائے غرغره

منفرائق مٹھی ۶۰ گرام
 الکحل ۶۰ فی صدی ۸ اونس
 حسب قاعدہ سیال تیار کریں۔

فوائد: درد گلو، گلے پڑنا، آواز بیٹھ جانا وغیرہ
 میں مفید ہے۔
 ترکیب استعمال: پانی میں ملا کر غرغرے کریں۔

دوائے غریزی

اجزاء: قرنفل ۱ گرام

دانه الیچی خورد ۱ گرام
 کشتہ فقرہ جدید ۱۰۰ ملی گرام
 سب کو کھل کر کے سفوف تیار کریں اور ۱۰۰ ملی گرام
 دہاتی (کیپ سول) میں رکھیں۔
 فوائد: جب ہاتھ پیر ٹھنڈے رہتے ہوں
 کم ہمتی اور انسر دگی چھائی رہتی ہو۔ بلڈ پریشر کم
 ہو تو ان حالات میں یہ بہت مفید ہے۔ اعصاب
 زہیہ کو قوی کرتی ہے۔ حرارت غریزی کی حالت
 کو قوی ہے نعل مضکم کو اور باہ کو قوت دیتی ہے۔
 خوراک: ایک کیپ سول صبح کو کھلائیں۔
 شدید کمزوری میں ہر چار گھنٹے بعد دن بھر میں
 تین خوراک بھی کھلا سکتے ہیں۔

استعمالات: ہیفس، فالج و فقرہ نثار الدم
 ضعیف، ضعف، یاہ، الکلی خون (امراض حائل)
 زہریلے کا علاج۔

دوائے غذائی

اجزاء: کھلی بادام ۱۰ گرام
 چمنجھٹے ہوئے ۴۵ گرام
 کیلیم فاسفیٹ ۲۰۰ ملی گرام
 وٹامن بی ۱۰ ۱۰ ملی گرام

سب کو سفوف بنا کر رکھیں۔

فوائد: جسم میں خون کی کمی ہو، بدن دہلا سلا ہو، کم بہتی دہتی رہتی ہو، محنت کا کام کرنے کے بعد تھکن ہو جاتی ہو، دماغ و ذہن کم قدر ہو، کوئی بات یاد نہ رہتی ہو، عورت میں دودھ کی پیدائش کم ہو، کچی خون کی وجہ سے سیلانِ رحم کی تکلیف ہو، کمر میں درد رہتا ہو تو ان تمام شکایات کو دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ قلتِ غذا کے مریضوں کے لیے بہترین چیز خوراک: ۱۳ گرام سے ۲۴ گرام تک (ایک سو ۲۴ تولے، دودھ کے ساتھ کھائیں۔

استعمالات: دماغ کی کمزوری، کند ذہنی نیند نہ آنا، لکنت، ضعفِ بصر، شب کوئی ڈھلکا، بہاؤ، فشارِ الدمِ ضعیف، دردِ دل، ضعفِ باہِ اجزائے استعاطِ عمل، کمیِ خون، (امراضِ حاملہ، دودھ کی کمی) (امراضِ زچہ) کساح (امراضِ اطفال)۔

آیوڈین ۱۱۱ گرام

اسپرٹ کلوروفارم ۱۵۵۰ ملی لیٹر

پوٹاشیم آیوڈائیڈ ۵۰۰ ملی گرام

اکوانٹھا پیپ ۱۵۲۵۰ ملی لیٹر

سب قواعد سب کو ملا کر سیال تیار کریں۔

فوائد: درم لوزتین (ٹائسلایٹس) استرمارہاۃ

(کناٹکنا) ذخیرہ کے لیے نہایت مفید ہے۔

ترکیب استعمال: پھریری سے گلے میں لگائیں۔

استعمالات: انفلوآنزا، حلق کا درم درد

گلے پڑنا (امراضِ اطفال)

روغن خارش

اجزاء: روغن چیڑ ۱۰۰ ملی لیٹر

روغن کینڈ ۱۰۰ ملی لیٹر

دونوں کو ملا کر رکھیں۔

فوائد: ہر قسم کی خارش کے لیے مفید ہے۔

ترکیب استعمال: خارش کی جگہ پر لگائیں۔

سرمہ جست

اجزاء: سفیدہ جست ۱ گرام

سرمہ سیاء سائیدہ ۱ گرام

روغن گلہ

اجزاء: کتھ سفید ۱ گرام

گلیرین ۳۲ گرام

ہے۔ اسہال و قبض و نفلیں میں حسب موقع استعمال کیا جاتا ہے۔
 خوراک: ۵۰ ملی گرام (۶ رتی) پانی سے کھلائیں۔

سفوف سُرخ

اجزاء: شہ یانی بریاں ۵ گرام
 گِرد سُرخ ۵ گرام
 سب کو باریک کر کے سفوف بنائیں۔
 فوائد: پیشاب کی سوزش کو دور کرتا ہے۔
 سوزاک کی ابتدا میں جب پیشاب میں جلن ہو
 پیشاب نکل کر نہ رہا ہو، مواد آ رہا ہو، اس حالت
 میں یہ بہت مفید ہے۔ پیشاب کی نالی کے زخم
 کو بھرتا ہے
 خوراک: ۳ گرام (۳ ماشے) پانی یا دودھ کی
 سی کے ساتھ کھلائیں، یا پانی میں قرمت برہائی
 ملا کر پلائیں۔

سفوف شورہ قلمی

اجزاء: گِرد ۱ گرام
 شورہ قلمی ۱ گرام

سب کو کھرن کر کے سرسہ قیاد کریں۔
 فوائد: آنکھوں کی اکثر بیماریوں میں مفید
 آنکھوں کو صاف کرتا ہے۔ آنکھ دھونے کے بعد
 جو سُرخ رہ جاتی ہے اس کو دور کرتا ہے آنکھوں
 سے پانی جانے کے لیے مفید ہے۔

ترکیب استعمال: رات کو سلائی سے
 آنکھوں میں لگائیں۔

استعمالات: آشوب چشم، ضعف بصر
 جالا، پھولا، آشوب چشم (امراض اطفال)

سفوف یوندرکٹ

اس کی ایک خوراک میں حسب ذیل تناسب ہے۔
 سفوف یوندرجینی ۱۲۵ ملی گرام
 سوڈا بائی کارب ۴۰ ملی گرام
 چاک پتھر ۲۰ ملی گرام
 داسجینی ۱۲۵ ملی گرام
 سوڈیم ۱۲۵ ملی گرام
 دائرہ الایچی خورد ۶۲ ۱/۲ ملی گرام
 چائٹل ۶۲ ۱/۲ ملی گرام
 سب کو کھرن کر کے سفوف بنائیں۔
 فوائد: بچوں کے امراض شکم کے لیے مفید

جوا کھار اصلی ع	اگرام	روغن دار چینی	۳۰۰۰۰ گرام
کباب چینی	اگرام	سست پودینہ	۳۵۳۳ گرام
زیرہ سفید	اگرام	آتشہ ابرک	۱۲۵۹۴ گرام
سب کا سفوف بنائیں۔		شکر سفید اور مرگند	حسب ضرورت

فوائد: پیشاب کی سوزش کو دور کرتا ہے۔
پیشاب کی نالی کا اندرونی ورم، درد وغیرہ
اس کے کھانے سے دور ہو جاتا ہے۔ پیشاب
کھل کر آنے لگتا ہے۔ سوزاک کی ابتداء میں اس
کا استعمال کرنا بہت مناسب ہے۔
خوراک: ۳ گرام (۳ ماشے) سے ۴ گرام
(۶ ماشے) دو دفعہ کی لٹی سے کھلائیں۔
استعمالات: درد گردہ، بندش بول،
سوزش بول، تقطیر البول، بول کیلوسی ورم خبیثہ

سعالین

ایک قرص میں:

سست ملیٹھی	۹۷۰۲۴ گرام
سست تلسی	۳۲۵۴ گرام
سست اوردہ	۳۲۵۴ گرام
روغن بادیان	۰.۱۵ گرام
روغن کباب چینی	۰.۰۰۰۳ گرام
روغن بوکلش	۰.۰۰۰۳ گرام

سب کو ملا کر حسب قاعدہ قرص تیار کریں۔
فوائد: کھانسی، زکام، الفلوائنزا اور گلے کی
خلش میں فوری تسکین دیتی ہے خشک کھانسی
کو سکون دیتی ہے
ترکیب استعمال: دن میں دو تین بار درد
ٹکیاں چوستے رہیں۔ کھانسی، نزلہ اور زکام کی
شدت میں چار ٹکیاں گرم پانی میں گھول کر جرعات
کے طور پر پیئیں۔

استعمالات: چیچک، موتی جھرا، خرو، کال
کھانسی، نزلہ زکام، الفلوائنزا، ورم و درد حلق،
ذات الریہ، کھانسی، خون تھوکانا، آواز بیٹھ جانا،
کھانسی (امراض حاملہ) بخار (امراض حاملہ)
نزلہ زکام (امراض اطفال)، موتی جھرا اور
چیچک (امراض اطفال)۔

سیال اکری فلیوین

اجزاء: اکری فلیوین گرام

میتھمٹکس اسپرٹ
دو نوں کو ملا کر رکھیں۔
۲۰۰ ٹی ٹر

قولائد: دافع عفوت ہے مقامی زخموں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مرطب اگرہما اور فارقارسی کے لیے مفید ہے۔

ترکیب استعمال : صاف روئی اس میں
ترکہ کے زخم کو صاف کریں اور پھر اس میں
روئی بھونک کر زخم پر رکھ کر باندھ دیں۔

استعمالات : دل و شور و دم غداسی کج را
پکھڑائی از خم۔

سیال بندش خون

۱۱۱۱ پھنگری سائید
عرق نیلوفر
دونوں کو ملا کر رکھیں۔
۱ گرام
۵ ملی لیٹر

فوائد: اگر ناک سے خون آ رہا ہو تو اس کے
 ساتھ ساتھ قطرے ناک میں ٹپکائیں۔ اگر
 کثرت حیض کی سبب ہو اند خون کسی طرح بند
 نہ ہوتا ہو تو اس سیال میں روئی کا پھایہ بچھو کر
 اندام خانی میں رکھیں۔

استعمالات: خون بہنا

بیابان شیریں

۱ علی لڑ
۶ علی لڑ

فوائد: اختلاج قلب، ضعف قلب،
بے ہوشی، نفخ شکم۔

ترکیب استعمال: بوتل فروت پلنچ
قطرے پانی میں ملا کر لائیں۔

استعمالات : اسہال، ضعف، بامہ، دل
کی دھڑکن (امراضِ حاملہ)۔

سپاں مسکن

اجزاء: اسرول نیم کوئٹہ
اسپرٹ کلورڈ فارم
سوریم برومائڈ
۱۶ ملی لیٹر
۱ گرام

حسب قاعدہ سیال تیار کریں۔

فائدہ: مسکن منزع ہے؛ نیند لانا بہتر دماغی
بیجان راضی تپ کو دور کرتا ہے۔ اپنی بلڈ پریشر
اور اس کے تمام مراض کو دور کرنے کے لیے
بہت فائدہ مند ہے۔

خوراک : یاخچ تھڑے پانی میں حاکر ملائیں۔

استعمالات : خارش ، اختلام

سیال نیم

اجزاء : برگ نیم تازہ تراشے ہوئے ۱۰ گرام

میٹھی لیٹڈ اسپرٹ ۸۰ ملی لیٹر

حسب دستور سیال تیار کریں

فوائد : خارش گلے کا دھوم ، بواسیر ، لالہ ،
نزہ داکئی کے لیے مفید ہے۔

ترکیب استعمال : خارش کے لیے پھری

سے لگائیں۔ باقی امراض میں ٹھنڈے ، یا گرم

پانی میں ۱/۲ تناسب سے ملا کر غوارے کرائیں

اور ناک اندر سے اچھی طرح صاف کرائیں۔

استعمالات : صفائی زخم ، دھوم

شافہ گلیسرین

اجزاء : گلیسرین ۷۵ گرام

ایسٹک ایسڈ ۷۰۰ ملی گرام

موڈاکارب ۲۵ ملی گرام

ہیزلین ہائر ۱۳ قطرے

حسب معمول شیاف بنائیں۔

فوائد : قبض ، نفخ شکم

شربت تمر ہندی

اجزاء : تمر ہندی ۱۸۸ گرام

قند سفید ۷۵۰ گرام

حسب قاعدہ شربت تیار کریں

فوائد : صفر کی کثرت سے قے و متلی حاملہ
کی قے و متلی ، قبض ، ترش معدہ اور یرقان کے
لیے مفید ہے۔

خوراک : ۹ ٹی سپر سے ۱۸ ملی لیٹر (ایک سے

دو قلوے) پانی ملا کر پلائیں۔ یا ویلے ہی چٹائیں

استعمالات : موسمی بخار ، ہیپنڈر ، بھڑک کے

کمی ، پیاس کی زیادتی ، اسہال ، قبض ، بد ہضمی

جگر کی گرمی ، دردِ گردہ

شربت جوہر شیر

محض شیر ۱۲ ملی لیٹر

شربت سادہ ۲۰ فی صدی ۷۵ ملی لیٹر

دونوں کو ملا کر حسب ترکیب شربت تیار کریں۔

فوائد : بچوں کے اکثر امراض میں مفید ہے۔

خوراک : دس قطروں سے ساٹھ قطروں

تک عمر کے مطابق۔

۳ قطرے اسپرٹ آف ایتر

۳ قطرے اسپرٹ ایونیا امروہلیک

۲ قطرے ٹنکچر جنجر

شربت سادہ (۶۰ فی صدی) ۵ ملی لٹر

سب کو حسب قاعدہ ملا کر شربت تیار کریں۔

فوائد: محرک و مقوی قلب، محرک

حرارت، غریزی اور کاسہری ریح ہے غشی ہائے

پیر کا ٹھنڈا ہونا اور کمزوری قلب کی حالت

میں مفید ہے۔

خوراک: ۵ ملی لٹر (۶ ماشے) پانی ملا کر پلائیں۔

استعمالات: بدھنی، فشار الدم ضعیف

اختلاج قلب، ضعف باہ، باؤ گولہ، دل کی

دھڑکن (امراض حالہ)، اندرونی جریان خون

بے ہوشی۔

شیاف اکسیر چشم

اجزاء: طوطیا دیسی ۱۵۰۵ گرام

پیشگری خام ۱۵۸۰ گرام

کشتہ سونا مکھی ۱۵۸۰ گرام

زیجگار ۰۱۶ گرام

کسیس ہنز ۰۰۹ گرام

اصل الموم مقشر ۵۱۳۲ گرام

مغز ملتاس ۵۲۰ گرام

بادیان نیم کوفتہ ۵۱۳۴ گرام

پوست ہلیلہ زرد ۵۲۰ گرام

بامبرنگ ۵۰۶۶ گرام

شکر خرخ ۳۵۳۰ گرام

حسب دستور شربت تیار کریں۔

خوراک: ۵ ملی لٹر (۶ ماشے) سے ۱۰ ملی لٹر

(ایک تولہ) تک پلائیں۔

فوائد: بچوں کے معدے و شکم کے تمام امراض

کے لیے بہت مفید ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔

ترکیب استعمال: اگر قبض ہو تو نیم گرم پانی

میں ملا کر پلائیں۔

استعمالات: اُم السببیان، نیند میں ڈرنا

اکشوب چشم، ٹھنڈا آنا، نزلہ و زکام، اچھارہ،

پیٹ کے کیڑے، موی بھرہ، گلے پڑنا (امراض

اطفال)۔

شربت منقش

ایک خوراک ۵ ملی لٹر میں حسب ذیل تناسب

ہے:

اصل السوس مقشر ۱۳۲ گرام
مغز ملتاس ۵۲۰ گرام
بادیان نیم کوفہ ۵۱۳۲ گرام
پوست بلیل زرد ۵۲۰ گرام
بار بزرنگ ۵۰۶۶ گرام
شکر خرخ ۳۵۳۰ گرام

حسب دستور شربت تیار کریں۔

خوراک: ۵ لیٹر (۶ ماشے) سے ۱۰ لیٹر
(ایک تولہ) تک پلائیں۔

فوائد: بچوں کے معدے و شکم کے تمام امراض
کے لیے بہت مفید ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔
ترکیب استعمال: اگر تبھ ہو تو نیم گرم پانی
میں ملا کر پلائیں۔

استعمالات: اُم السببیات، نیند میں ڈرنا
آکھوپ چشم، ٹنڈا آنا، نزلہ در کام، اجماع،
پیٹھ کے کپڑے، ہوتی تھوڑے، گلے پڑنا (امراض
اطفال)۔

شربت منقش

ایک خوراک ۵ لیٹر میں حسب ذیل تناسب
ہے:

اسپرٹ آف ایٹر ۳ قطرے
اسپرٹ ایمونیا امروٹیک ۳۰ قطرے
ٹنکچر جنجر ۳ قطرے
شربت سادہ (۶۰ فی صدی) ۵ لیٹر
سب کو حسب قاعدہ ملا کر شربت تیار کریں۔
فوائد: محرک و مقوی قلب، محرک
حرارت غریزی اور کاسہریہ ہے غشی ہاتھ
پیر کا ٹھنڈا ہونا اور کمزوری قلب کی حالت
میں مفید ہے۔

خوراک: ۵ لیٹر (۶ ماشے) پانی ملا کر پلائیں۔
استعمالات: جوہنی، افشار الدم ضعیف،
اختلاج قلب، ضعف باہ، باؤ گولہ، دل کی
دھڑکن (امراض حاملہ)، اندرونی جریان خون،
بے ہوشی۔

شیاف اکیر چشم

اجزاء: طوطیا دیسی ۱۵۰۵ گرام
پوشگری خام ۱۵۸۰ گرام
کشتہ سونا کھی ۱۵۸۰ گرام
زنجار ۰۱۶ گرام
کیس سبز ۰۵۹ گرام

۲۶۷ ملی گرام	برادرہ شیشم	سفیدہ جت چھنا ہوا ۳۵۶ گرام
۲۶۷ ملی گرام	برادرہ مندل سرخ	سہاگہ خام ۱۵۸ گرام
۲۶۷ ملی گرام	بگلو	آب برگ گلاب تازہ ۳۰ ملیٹر
۲۶۷ ملی گرام	ہٹر	حب قاعدہ شیان ۱۶ گرام (۲ رقی) کے تیار کریں۔
۲۶۷ ملی گرام	نیر کچور	فوائد: روہوں (لگرے) کے لیے نہایت مفید ہے۔
۲۶۷ ملی گرام	چماتہ	ترکیب استعمال: ایک شیان تین چار قطرے پانی میں حل کر کے سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔
۲۶۷ ملی گرام	کمال میگھ	استعمالات: جالا، پھولا، ناخونہ، روہے (امراض اطفال)۔
۲۶۷ ملی گرام	کوندی	
۳۵۵ ملی گرام	منڈی	
۳۵۵ ملی گرام	نیل کنٹھ	
۳۵۵ ملی گرام	شامہرہ	
۲۶۷ ملی گرام	کچنال کی چھال	
۲۶۷ ملی گرام	نیم کی چھال	
۵۴۴ ملی گرام	تلسی	
۳۵۵ ملی گرام	مازیوں	
۳۵۵ ملی گرام	طرزوں	
۳۵۵ ملی گرام	افستین	
۲۶۷ ملی گرام	ملین سالت	
حب ضریت	شکر مصفی	
نفاذ کو خوش دے کر چھان کر شکر مصفی ملا کر شربت کا قوام تیار کریں۔		
		ایک خوراک ۹ ملیٹر میں مندرجہ ذیل اجزاء ہوتے ہیں:
		جوہر: سار کی ۳۶۵۳ ملی گرام
		لیونڈینی ۲۹۶۲ ملی گرام
		تربو سفید ۴۵۵ ملی گرام
		نیلوفر ۲۶۷ ملی گرام
		گلاب ۳۵۵ ملی گرام

فوائد: خون کو صاف کرنے کی مشہور و معروف
دوا ہے۔ پھوٹے، پھنسیاں، آتشک سوزاک،
گٹھیا وغیرہ خرابی خون سے ہونے والی تمام
بیماریوں کے لیے اکیسر ہے۔

خوراک: ۹ ملی لٹر (ایک تولیہ) ایک پیالی
پانی یا دو دھیں ملا کر پائیں۔

استعمالات: آتشک پائیریا، زبان کا پھٹنا،
سُخ آنا، ہونٹوں کا پھٹنا، پیٹ کے کپڑے ناخن،
آشوب چشم، باہمی، گوبہ، بھنی اور ہے۔ کان کی
پھنسیاں، ناک کی بدبو، بندش بول، خارش، داد،
گنچ، برص، جھپ اور جھائیاں گری دانہ،
فہاسے، چھانچا، راکھ، پتی نکلنا، بال خروہ،
پھوٹے پھنسیاں، سر، کچھرا، بگنہ، زخم،
ہیم خصیہ، خارش خصیہ، شرم گاہ کی پھنسیاں،
شرم گاہ کی خارش، شرم گاہ کا زخم، حل گر جانا۔

کیلیم ہائیڈروکسائیڈ ۱۴۹ ملی گرام
کوڈین فاسفیٹ ۲۶۲۳ ملی گرام
عصبہ عصل ۰.۰۳ ملی لٹر
تند سفید

سب قاصد سب کو آمیز کر کے شربت تیار کریں۔
فوائد: پُرانی اور شدید کھانسی اور پھیپھڑوں کی
کڑوری کے لیے مفید ہے۔ کھانسی میں خون آہو
بلغم میں عفرت موتب بھی یہ مفید ہے۔ کالی
کھانسی اور دمہ کے لیے بھی بعض حالت میں فائدہ
کرتی ہے۔

خوراک: دو دو چائے کے چمچے صبح اور
رات کو چائیں۔

استعمالات: دق الریہ، دق خناریری،
کالی کھانسی، ذات الریہ، کھانسی دمہ، نشت الدم،
کھانسی (امراض حاملہ)، کالی کھانسی (امراض اطفال)،
موتی جھرو (امراض اطفال)۔

صدوری

ایک خوراک (۹ ملی لٹر) میں حسب ذیل تناسب کے

خلاصہ اندر سیال ۰.۰۵۹۲ ملی لٹر
خلاصہ تلسی سیال ۰.۰۵۹۲ ملی لٹر
خلاصہ زونا ۰.۰۵۹۲ ملی لٹر

ضماد راحت

اجزاء: خلاصہ برگ لٹاخ ۱ گرام
بودک ایسٹ ۱ گرام
سفیدہ کاشغری ۱ گرام

دسینین فرد ۱۰ گرام
سب کو حسب قاعدہ ملا کر ضا د تیار کریں۔

فوائد: درم، درد، گھسٹے، درم پستان،
درد مفاصل، درد کمر وغیرہ کے لیے مفید ہے۔
مسکن و محلل ہے۔

ترکیب استعمال: مقام موقوف پر مالش
کریں، یا کپڑے پر لگا کر باندھ دیں۔

استعمالات: دق خنازیری، دق غظام
کن پھیڑ، درم حلق، تلی کا درد و درم، درد گوش،
درم گوش، درد دل، درد گردہ، دانتانہ، بد،
بکھرائی، انگلیٹ، درم خصبہ، درد کمر، گھیکا، درم
رجم، تھنلا، بھٹنی کا پھٹنا، درد پستان
(امراض حاملہ، موج آنا۔)

عرق استسقا خام

اجزاء: یسخ کرش ۴۲۲ گرام
یسخ بادیان ۴۲۲ گرام
گل غاف ۱۲۰ گرام
افسنین رومی ۱۲۰ گرام
ٹرکی ۱۲۰ گرام
لک مغسول ۱۲۰ گرام

پڑا ۱۲۰ گرام

قسط شیریں ۱۲۰ گرام

یوندر چینی ۱۲۰ گرام

شکوفہ ادر ۱۲۰ گرام

بادیان ۸۴ گرام

تخم کرش ۸۴ گرام

ایسون ۸۴ گرام

مصطکی رومی ۸۴ گرام

شہد خالص ۲ کلو۔ ۳۰ گرام

گڑ ۴ کلو۔ ۶۰ گرام

پانی ۲۵ کلو

لک مغسول، مرکی اور مصطکی کے علاوہ

سب دواؤں کو نیم کوفتہ کر کے رکھیں اور مٹی

کا ایک بڑا اور نیا ٹسکا جو چکنا ہو، اس میں پانی

شہد اور گڑ گھول کر ڈالیں، پھر دوائیں ڈال دیں۔

تین روز تک لکڑی سے ان کو ملا دیا کریں۔

جب پندرہ بیس روز میں اس میں جوش آجائے

تو لک مغسول، مرکی اور مصطکی ملا دیں۔ جب دو

چار روز میں جوش دب جائے تو اس کو کپڑے

میں چھان کر بوتلوں میں بھر لیں۔

خوراک: ۲۵ ملی لیٹر سے ۶۰ ملی لیٹر (دو قوتے)

سے دترے) تک کھانا کھانے کے بعد پلائیں۔
فوائد: ہر قسم کے استسقا کے لیے فائدہ مند ہے۔

عرق فولاد خام

اجزاء:	برادہ فولاد	۱۰۰ گرام
	پیل کلاں	۱۰۰ گرام
	مرچ سیاہ	۱۰۰ گرام
	زنجبیل	۱۰۰ گرام
	پوست بلیہ کلاں	۱۰۰ گرام
	پوست بلیہ	۱۰۰ گرام
	آملہ خشک	۱۰۰ گرام
	اجوائن دیسی	۱۰۰ گرام
	بار بڑنگ	۱۰۰ گرام
	ناگ موتھا	۱۰۰ گرام
	نیچ پھیتہ	۱۰۰ گرام
	گل دھادا	۵۰۰ گرام
	شہد خالص	۱۶۰۰ گرام
	قند سیاہ	۲۵۰۰ گرام
	پانی	۱۳ لٹر

حسب قاعدہ عرق خام تیار کریں۔

فوائد: جگر کی کم زوری اور کئی خون کے لیے مفید ہے۔ اگر تلی اور جگر بڑھ گئے ہوں، رنگت زرد ہو گئی ہو تو ان حالتوں میں استعمال کرائیں۔ بھوک لگاتا ہے، یرقان، بواسیر، درم بدن اور باد گولہ وغیرہ میں مفید ہے۔

خوراک: ۹ ملی لٹر سے ۸ اٹی لٹر (ایک سے دو تولہ) پانی میں ملا کر دونوں وقت غذا کے بعد پلائیں۔
استعمالات: درم جگر، ضعف جگر، خون کی کمی، استسقا، تلی کا درم، بول نرالی، بواسیر، ضعف باہ، بندش حیض۔

عرق کافور

اجزاء: کافور ۱ گرام
 اسپرٹ ریکیٹ فائڈ ۲ ملی لٹر
 آب مقطر ۱ لٹر
 سب کو حسب معمول حل کر کے رکھ لیں۔
فوائد: محرک اور دافع تشنج ہے۔ ہیضہ، نفخ شکم، اسہال اور نفث الدم میں مفید ہے۔ نساہ ہوا کے اثر سے جسم کو محفوظ رکھتا ہے۔
خوراک: دس سے بیس قطرے پانی میں

ماکر غذا کے بعد کھلائیں۔

استعمالات : دق الریه، دق الامعاء، بیضہ
قے الدم، نکیر، نفث الدم، خونی پیشاب،
کثرت حیض۔

عرق گھیکوار خام

اجزاء : آب مغز گھیکوار تازہ ۱۰۰ گرام

قند سیاہ کہنہ ۳۳ گرام

شہد خالص ۱۷ گرام

برادہ آہن ۱۷ گرام

گل دھوا ۳ گرام

زنجبیل ۱۷۰ ملی گرام

فلفل سیاہ ۱۷۰ ملی گرام

پیل کلاں ۱۷۰ ملی گرام

دار چینی ۱۷۰ ملی گرام

الانچی خورد ۱۷۰ ملی گرام

ناگ کیسر ۱۷۰ ملی گرام

پوست جیتہ ۱۷۰ ملی گرام

پیلا مول ۱۷۰ ملی گرام

بابر بڑنگ ۱۷۰ ملی گرام

گنج پیل ۱۷۰ ملی گرام

آمل خشک

۱۷۰ ملی گرام

پوست بیلہ زرد

۱۷۰ ملی گرام

پوست بیلہ

۱۷۰ ملی گرام

ابھل

۱۷۰ ملی گرام

کشیز خشک

۱۷۰ ملی گرام

سپاری

۱۷۰ ملی گرام

کنکی

۱۷۰ ملی گرام

سیخ جمال گوڈ

۱۷۰ ملی گرام

چوب زرد

۱۷۰ ملی گرام

دار ہلد

۱۷۰ ملی گرام

چب کدوی

۱۷۰ ملی گرام

مروڑ پھلی

۱۷۰ ملی گرام

اصل السوس

۱۷۰ ملی گرام

قسطلخ

۱۷۰ ملی گرام

تخم کھرش

۱۷۰ ملی گرام

تخم کونج

۱۷۰ ملی گرام

راسنا

۱۷۰ ملی گرام

لنگھی بوٹی

۱۷۰ ملی گرام

برادہ دیورلد

۱۷۰ ملی گرام

گوکرو خورد

۱۷۰ ملی گرام

بادیان

۱۷۰ ملی گرام

سب کو کوٹ چھان کر ایک قرص ۱۶ گرام
(۴ رتی) کی تیار کریں۔

فوائد: درجہ المفاصل، درد کمر، نقرس اور
درد اعصاب وغیرہ کے لیے مفید ہے۔ اگر
نزہہ زکام کے ساتھ بخار اور تمام جسم میں درد ہو
تو بھی یہ دی جاسکتی ہے۔

خوراک: ایک ایک قرص صبح و شام پانی
سے کھلائیں۔

قرص الکلی

اجزاء: سوڈائی کارب ۱۰۰ گرام
روغن پودینہ دلائی ۳ قطرے

ایک قرص ۱۶ گرام (۴ رتی) کی تیار کریں۔
فوائد: باضمم ہیں، ترشی معدہ کے لیے نہایت
مفید ہیں۔ سوزش بول میں فائدہ کرتی ہیں۔
کامبریلج میں فیم معدہ کے درد کو دور کرتی ہیں۔
خوراک: ایک ایک قرص کھانا کھانے کے
بعد کھلائیں، یا دامت کو یا سبہر کو دو قرص
کھلائیں۔

استعمالات: سر چکرانا، نیند نہ آنا، ذیابیطس
منہ آنا، ہونٹوں کا پھٹنا، درد معدہ، بھوک کی

تخم قنب ۱۵۰ ملی گرام

۱۵۰ ملی گرام

۱۵۰ ملی گرام

۱۵۰ ملی گرام

۱۵۰ ملی گرام

۱۵۰ ملی گرام

تخم قنب

عقر قرقا

بسکیرا

تخم ادٹنگن

لودھ پٹھانی

کشتہ سونا کھی

کے طریقہ پر تیار کریں اور چھان کر رکھیں۔

فوائد: جگر، تلی اور آنتوں کی بیماریوں کے لیے

خصوصیت سے مفید ہے۔ پیٹ کے درد کو

جو کھانا کھانے کے بعد ہوتا ہے، دور کرتا ہے۔

علاوہ ازیں مرگی، جریان، یرقان اور خون کی

کمی کو بھی فائدہ دیتا ہے۔

خوراک: ۹ سے ۲۵ ڈیڑھ لٹریک دنا پانی میں ملا کر

کھانا کھانے کے بعد پلائیں۔

استعمالات: استسقاء، تلی کا وزم بول کھلونا

بول زلالی، بندش حیف۔

قرص اصفر جدید

اجزاء: سوڈائی کارب ۱ گرام

۱ گرام

۱ گرام

سوڈا سیلیکٹ

چوب زرد سائیدہ

عام کمزوری، درد سینہ۔

قرص بادام

۵۵ گرام	اجزاء: سیال رب السوس
۵۰ گرام	نوشادر
۶۰ قطرے	روغن بادیان
۲۸۵ گرام	بادام کی کھلی
۳۲ گرام	اجوائن دیسی
۱۶ گرام	اجوائن خراسانی

سب کو باریک کر کے ایک قرص ۱۵۱۲۵ گرام
(دہ رتی) کی تیار کریں۔

فوائد: یہ دوا گلے کی خراش (دکھن) اور
کھانسی کے لیے مفید ہے۔ بلغم کو آسانی سے
کھالتی ہے۔ نزلہ و زکام اور بڑھاپے کی کھانسی
کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ بچوں کی کالی
کھانسی میں بھی فائدہ کرتی ہے۔

خوراک: ایک ایک قرص دن بھر میں چار
مرتبہ منہ میں ڈال کر چوستے رہیں، یا صبح اور رات
کو چار قرص گرم پانی میں گھول کر پیں۔

استعمالات: دردِ طلق، ہیچکی، خات الریہ، آواز
بیٹھ جانا، کھانسی (امراضِ خالہ)۔

کمی، اچھالہ، ہیچکی، قبض، بد معنی، جگر کی گرمی،
یرقان، گوبانجی، کان کی پھنسیاں، اختلاجِ قلب،
دردِ گردہ، گردہ و مثانہ کی پتھری، بندشِ بول،
سوزشِ بول، بول کیلوسی، سلسِ البول، خارش،
چھپ اور جھانیاں، ٹہاسے، پتی اچھلتا،
پھوڑے پھنسیاں، ورمِ خصیہ، خارشِ خصیہ،
تپ کہنہ، شرم گاہ کی خارش، شرم گاہ کی پھنسیاں
پیشاب بار بار آنا (امراضِ حاملہ)، شرم گاہ کی
خارش (امراضِ حاملہ)، پیٹ کا درد (امراضِ حاملہ)۔

قرص الفلوانسز

۱ گرام	اجزاء: زنجبیل
۲ گرام	دارچینی
۶۶۰ ملی گرام	قرنفل
سب کو باریک کر کے ۱/۲ گرام (۴ رتی) کا ایک قرص تیار کریں۔	

فوائد: الفلوانسز کے لیے نہایت مفید ہے۔
خوراک: ایک ایک قرص صبح، دوپہر، شام
کو گرم پانی میں حل کر کے پلائیں خوش گوار بنائے
کے لیے دوا میں شکر یا گلو کو زہی ملا سکتے ہیں۔

استعمالات: نزلہ، سرری، بلغمی کھانسی،

قرص بخار

اجزاء: پوست برک سائیدہ ۱ گرام
کونین سلفیٹ ۲۰۰ ملی گرام
سب کو باریک کر کے حب قاعدہ ۱/۴ گرام
(۴ رتی) کی ایک قرص تیار کریں۔
فوائد: موسمی بخار (میریما) کے لیے نہایت
منید ہے۔

خوراک: ایک قرص صبح کے وقت پانی سے
کھلائیں۔ شدید حالتوں میں دونوں وقت، یعنی
صبح و شام بھی کھلا سکتے ہیں۔

استعمالات: دق الریہ، دق الامعا
دق خنایری، دق عظام، موسمی بخار، انفلوائنزا
شقیقہ، کلی کا درم، زچہ کا بخار (امراض زچہ)۔

قرص بلادر

اجزاء: سفوف معجون جگر جگول ۱ گرام
روغن بلادر ۱۲۵ ملی گرام

سب کو ملا کر ۱۲ گرام (۴ رتی) کی ایک قرص بنائیں۔

فوائد: کمزوری، اعصاب میں مفید ہے۔ دردِ کمر
نقرس، وجع المفاصل، رعشہ، فالج، لقوہ دانہ

نزلہ وزکام اور ضعفِ شانہ کی وجہ سے کثرتِ بلال
میں استعمال کی جاتی ہے۔

خوراک: ایک ایک گولی کھانا کھانے کے بعد
پانی سے کھلائیں۔

استعمالات: نزلہ وزکام، فالج و لقوہ،
ذیابیطس، لکنت، تقطیر البول، سلس البول
درہم کر، ضعفِ باہ۔

قرص بواسیر جدید

اجزاء: مقل الرق ۱ گرام

رسوت ۱ گرام

مغزیب ۲۵۰ ملی گرام

پوست ریٹھ ۲۵۰ ملی گرام

سب کو باریک کر کے ۶۲۵ ملی گرام (۵ رتی)
کی ایک قرص بنائیں۔

فوائد: خونی اور باری بواسیر کے لیے مفید
ہے۔ بواسیری خون کو بند کرتی ہے۔ مستوں کی
سوزش اور درم کو دور کرتی ہے۔

خوراک: ایک یا دو قرص حب ضرورت
پانی سے کھلائیں۔

استعمالات: بواسیر، قبض بواسیری۔

قرص پیش

اجزاء: کافور ۱ گرام

پوست بلیلہ زرد ۵۰۰ ملی گرام

بازو سبتر ۵۰۰ ملی گرام

۳ ملہ خشک ۵۰۰ ملی گرام

سب کو باریک کر کے ایک قرص ۲۵۰ ملی گرام

(۲ رقی) کی بنائیں۔

فوائد: پیش کے لیے مفید ہے۔ درد اور

مرور کو بہت جلد دور کرتی ہے۔ اگر آنتوں

میں سڈہ ہو تو پہلے صبح کو زندی کا تیل

(کیسٹر آئل) دو قوے دو دھیں ملا کر پلائیں۔

جب سڈہ خارج ہو جائے تو رات کو ایک

قرص پانی سے کھلائیں پیش برانی ہو، یا

آنتوں میں زخم اور خراش ہو تو اس حالت

میں بھی مفید ہے۔

استعمالات: اسہال، ضعف جگر، اسہال

(امراض حادہ) پیش (امراض حادہ) کا سنج نکلا

(امراض اطفال)۔

قرص تخمیر

جزء: ڈرائڈ ٹیسٹ پوڈر

حسب قاعدہ ۳۰ گرام (۶ رقی) کی ایک قرص

بنائیں۔

فوائد: اگر فغا، سضم نہ ہوتی ہو، ریاح بکثرت

پیدا ہوتے ہوں، قبض ہو اور معدہ میں جلن

ہو تو یہ دوا ان تمام شکایات کو دور کرتی ہے۔

آنتوں کے لیے دافع عفونت ہے۔ اگر اس کو

ساتھ مرکبات فولاد بھی کھلائیں تو کمی خون کے

لیے فائدہ مند ہے۔

خوراک: ایک ایک قرص یا دو دو قرص

کھانا کھانے کے بعد۔

استعمالات: اچھارہ، بد ہضمی، ورم جگر،

ضعف جگر، کمی خون، استسقا، یرقان، تلی

کا ورم، خون کے دباؤ کی کمی، بلواسیر۔

قرص حالب

۱ گرام

۱ گرام

۴ گرام

اجزاء: گیرد

سنگجراحت

کیلیم بیکٹ

سب کو باریک کر کے ۱۶ گرام (۴ رقی) کا ایک قرص بنائیں۔

فوائد: یہ دوا ہر قسم کے جریان خون کو بند کرتی ہے۔ پیشاب یا پاخانے میں خون آتا ہو یا کثرت حیض کی تکلیف ہو یا نکسیر جاری ہو غرض کہ ہر جگہ کے خون کو بند کرتی ہے۔

خوراک: ایک ایک قرص صبح و شام پانی سے کھلائیں۔ شدید حالت میں دو قرص ایک وقت میں بھی دے سکتے ہیں۔

استعمالات: دق الریہ، خونی قے، خون تھوکتا، خونی پیشاب، بواسیر، حمل گرنا، بواسیر (امراض حاملہ)، خون کا زیادہ آنا (امراض زچہ)۔

مفید ہے۔ چوٹے (چرنے)، کدو دانے وغیرہ وغیرہ اس کے کھلانے سے مر جاتے ہیں اور متواتر کچھ عرصے تک کھلانے سے ختم ہو جاتے ہیں۔

ترکیب استعمال: صبح نہار منہ یا رات کو ایک قرص پانی سے کھلائیں۔ کم از کم ایک ہفتہ اور زیادہ سے زیادہ بارہ روز اسی طرح کھلا کر پھر قرص ملین کھلائیں تاکہ اسہال ہو کر کڑے خارج ہو جائیں۔

نوٹ: نہار منہ دوا کے بعد صبح دو گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں۔ رات کو اگر یہ دوا استعمال کی جائے تو کھانا ساڑھے تین گھنٹے پہلے کھایا جائے۔

قرص دیدان جدید

اجزاء: کیدہ مصفی ۱ گرام
ہلدی باریک سائیدہ ۳۳۳ ملی گرام
ست حنظل ۴۰ ملی گرام
زنجبیل سائیدہ ۲۵۰ ملی گرام
سب کو باریک کر کے ۱۶ گرام (۴ رقی) کا ایک قرص تیار کریں۔

فوائد: آنتوں کے کیڑوں کو مارنے کے لیے بہت

قرص ذیابیطس خاص

اجزاء: مغز خستہ جامن ۱ گرام
تخم حماض ۵۰۰ ملی گرام
گڑ مار بوٹی ۵۰۰ ملی گرام
زیرہ سفید ۱ گرام
کشتہ خبث الحدید ۲۵۰ ملی گرام
کشتہ بیضہ مرغ ۲۵۰ ملی گرام

خوراک: ایک ایک قرص صبح و شام دودھ یا پانی کے ساتھ کھلائیں۔

اگر مریض کو قبض رہتا ہو تو ہر تیسرے روز دو قرص ملین رات کو گرم پانی سے کھلائیں۔

قرص سیلان خاص

اجزاء: مازدبزر ۱ گرام

مرکی ۶۶۶ ملی گرام

گوگل ۱۵۳۳۳ گرام

سلاجیت ۱۵۳۳۳ گرام

کچلہ مدبر خاص ۲۰۰ ملی گرام

شوگر آف ملک ۱ گرام

فرانی فاسفیٹ ۱۳۳۳ ملی گرام

سب کو باریک کر کے ۱/۲ گرام (۴ رقی) کا ایک قرص تیار کریں۔

فوائد: یہ دوا سیلان الرحم کو دور کرتی ہے۔ رحم کو طاقت دیتی ہے۔ مقوی اعصاب اور مولد خون ہے۔ رحم میں حمل قرار پانے کی جھلک پیدا کرتی ہے۔

خوراک: ایک ایک قرص صبح و شام دودھ سے کھلائیں۔

سلاجیت ۶۶۶ ملی گرام

افیون ۴۰ ملی گرام

سب کو باریک کر کے ۳/۴ گرام (۶ رقی) کی ایک قرص تیار کریں۔

فوائد: ذیابیطس شکر کے لیے نہایت مفید ہے۔ اکثر حالات میں اس کے متواتر کھلانے سے شکر ختم ہو جاتی ہے۔ کثرت بول کے لیے بھی مفید ہے۔

خوراک: دو قرص صبح یا دو قرص شام کو پانی یا چھچھ کے ساتھ کھلائیں۔

استعمالات: ذیابیطس، پیشاب کی زیادتی۔

قرص سیاہ جریان

اجزاء: افاقا ۱ گرام

کشتہ سرب ۶۶۶ ملی گرام

سب کو باریک کر کے ۱/۲ گرام (۴ رقی) کا ایک قرص تیار کریں۔

فوائد: اعضائے تناسل کی بڑھی ہوئی حس کو کم کر کے یہ دوا جریان و احتلام کو دور کرتی ہے۔ مذی، ودی اور مادہ تولید کے بے قاعدہ بہنے کو روکتی ہے۔ رقت و سرعت کے لیے بھی مفید ہے۔

استعمالات: زخم رحم، سیلاب رحم، بانجھ پن
حمل گر جانا۔

قرص کلونجی

اجزا: زرد اندر مدحرج ۱ گرام
زنجبیل ۲ گرام
سورنجان تلخ ۲ گرام
کلونجی ۲ گرام
دارچینی ۲ گرام

سب کو باریک پس کر ۱/۲ گرام (۴ رتی) کا ایک
قرص تیار کریں۔

فوائد: دردِ کمر، گٹھیا، نقرس اور داءِ عصاب
وغیرہ میں مفید ہے۔ بالخصوص اگر بلغم اور
ریاح کا غلبہ ہو تو اس حالت میں بہت مفید
ہے۔

خوراک: ایک ایک قرص صبح و شام پانی
سے کھلائیں۔

قرص گز

جزد: نمک جھاؤ

بادیک کر کے ۱/۲ گرام (۴ رتی) کا ایک قرص

تیار کریں۔

فوائد: جگر اور تلی کے امراض میں اور یرقان کے
لیے یہ دوا نہایت مفید ہے۔ کاسہر ریاح اور صفی خون
ہے عمدہ خون کی پیدائش ہوتی ہے۔

خوراک: ایک ایک قرص صبح و شام پانی یا
عرقِ سونف اور عرقِ کمو کے ساتھ کھلائیں۔
استعمالات: ضعیف جگر تلی کا بڑھنا، اگر بڑا
چھاجن، پیرانا بخار۔

قرص گل آکھ

اجزا: گل آکھ ۱ گرام

فلنس سیاہ ۱ گرام

نمک سانہر ۱ گرام

سب کا سفوف بنا کر ۱/۲ گرام (۴ رتی) کا ایک
قرص بنائیں۔

فوائد: تمام امراضِ معدہ کے لیے مفید ہے۔
بد ہضمی، ترش دکھائیں، نفخ شکم، دردِ شکم، تولیدِ ریاح
ریاحِ باسوری، ہیضہ متے و متلی وغیرہ کے لیے
بے ضرر اور زود اثر ہے۔

خوراک: کھانا کھانے کے بعد دو دو قرص پانی
سے کھائیں

خوراک : ایک ایک قرص صبح و شام پانی سے کھلائیں۔

قرص مدر

۱ گرام	اجزاء: ہیراکیس
۱ گرام	سہاگہ
۱ گرام	ہینگ
۲ گرام	ایلو

سب کو باریک کر کے ۱/۲ گرام (۲ رتی) کا ایک قرص تیار کریں۔

فوائد: بندش حیض، کئی حیض، دردِ عانہ و پشت بہ وقتِ حیض وغیرہ نسوانی شکایات کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔

خوراک: ایامِ مقررہ سے تین دن پہلے ایک ایک قرص صبح و شام پانی سے کھلائیں۔ ایام کی حالت میں نہ کھلائیں۔

قرص مسکن

جزو: پوٹاسیم برومائیڈ
باریک کر کے ۱/۲ گرام (۴ رتی) کا ایک قرص تیار کریں۔

استعمالات: دق خنازیری، دق عظام، دردِ سر، نیند نہ آنا، برگ، جنون، دردِ معدہ، بھوک کی کمی، ہچکی، اسہال، بدھمی، ورم کبڈ، کئی خون، استسقا، پیٹ کے کیڑے، تھوک کی زیادتی (امراضِ حاملہ)، کوئلہ مٹی کھانے کی عادت (امراضِ حاملہ)۔

قرص ماسک البول جدید

۱ گرام	اجزاء: دم الاغین
۶ گرام	مغز خستہ جامن
۴ گرام	کنند
۴ گرام	داسینی
۵۰۰ ٹی گرام	اذا راقی برتر
۱ گرام	کشتہ بیضہ مرغ خاص

سب کو باریک کر کے پانی کی مدد سے ۱/۲ گرام (۴ رتی) کا قرص تیار کریں۔

فوائد: کثرتِ بول، ضعفِ گردہ و مثانہ، تقطیر البول، ذیابیطسِ سادہ کے لیے یہ دوا بہت مفید ہے۔ بول فی الفراش کو بھی فائدہ کرتی ہے۔ ذیابیطسِ شکر کی کے لیے بعض حالات میں بہت فائدہ کرتی ہے۔

قرص ملیٹن

۱ گرام	اجزاء: پوست ہلیلہ نرد
۱ گرام	پوست ہلیلہ
۱ گرام	آملہ خشک
۱ گرام	ہلیلہ سیاہ
۴ گرام	تربہ سفید
۲ گرام	بادیان
۲ گرام	اسطوخودوس
۲ گرام	مصطکی رومی
۱۲ گرام	سارنگی
۱۲ گرام	ریوند چینی
۱۵ گرام	سقمونیا
سب کو باریک کر کے ۳ گرام (۶ رقی) کا ایک	قرص تیار کریں۔

فوائد: معدہ اور آنتوں کی صفائی کے لیے بہت مفید ہے۔ آنتوں کی حرکت دودھ کو تیز کر کے قبض کو دور کرتی ہے۔ اس کے کھانے سے مرد یا اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ بالکل بے ضرر قبض کشا ہے۔

خوراک: وقت ضرورت ایک سے ۳ قرص

فوائد: عصبی سکون دیتی ہے۔ نیند لاتی ہے بچوں اور بڑوں کے مرگی کے دوروں کو روکتی ہے۔ احشاق الرحم، تشنج نفاسیہ اور عسر الطمث میں نہایت مفید ہے۔ نیند لاتی ہے۔ مردانہ امراض میں زکارت جس، جربان، نا احتلام وغیرہ کے لیے مفید ہے۔

خوراک: ایک قرص رات کو سوتے وقت یا بہ وقت ضرورت کھلائیں۔

قرص مصفی جدید

جزو: پوست ریٹھ
خوب بادیک کو کے ۱/۲ گرام (۴ رقی) کا ایک قرص تیار کریں۔
فوائد: یہ دوا خون کو صاف کرتی ہے پھوٹے پٹھنسی، خارش کو دور کرتی ہے اور آتشک کے زخموں کو اچھا کرتی ہے۔
خوراک: ایک ایک قرص صبح و شام پانی سے کھلائیں۔

استعمالات: منہ آنا، ناک کی بدبو، بندش بول، داد، گنج، پٹھنسی، بد، کچھالی، بھگند، شرم گاہ کی پٹھنسیاں، شرم گاہ کا زخم۔

نیم گرم پانی یا دودھ سے کھلائیں۔

استعمالات: موسمی بخار، نزلہ و زکام، دردِ سر،
آدھاسیسی، درمیدہ، اچھارہ، قبض، بدہضمی،
جگر کی گرمی، درم جگر، پیٹ کے کیڑے آشوبِ چشم
دردِ گردہ، گردہ و مثانہ کی پتھری، دردِ مثانہ،
پتی اچھلنا، پھوڑے پھنسیاں نکلنا، دردِ کمر۔

قرصِ یمانی

جزو: پھٹکری بریاں

خوب باریک کر کے ۳ گرام (۶ رتی) کا ایک
قرص تیار کریں۔

فوائد: یہ دوا ہر قسم کے جریانِ خون کو بند
کرتی ہے۔ بالکل بے ضرر ہے۔

خوراک: ایک قرص پانی سے کھلائیں۔
شدید حالت میں دونوں وقت ایک ایک
قرص کھلا سکتے ہیں۔

استعمالات: خونی تے، نکسیر، خون تھوکانا،
خونی پیشاب، بواسیر، کثرتِ حیض۔

قطرہِ چشم

جزو: عرقِ گلاب

الی لٹر

۲۸۵ ملی لٹر میں حب ذیل تناسب ہے:

قلزم

بورک ایسڈ ۲۲۵۸

زنک سلفیٹ ۳۵۵

سب کو حسبِ قاعدہ ملا کر سیال تیار کریں۔

فوائد: آنکھ دیکھنے، درمِ رخِ دیگرہ کے لیے
فائدہ مند ہے۔

ترکیبِ استعمال: صبح و شام یا رات کو
دودھ و قطرے آنکھ میں ڈرا پر سے ڈالیں۔

استعمالات: آشوبِ چشم، جالِ پھولا، آنکھیں
دکھنا (امراضِ اطفال)۔

قلاعی

جزو: بورک ایسڈ ۱ گرام

گلیسرین ۸ گرام

دونوں کو ملا کر حسبِ قاعدہ تیار کر لیں۔

فوائد: مٹھ کے چھالوں اور زخموں کے لیے
فائدہ مند ہے۔

ترکیبِ استعمال: پھریری سے چھالوں پر
لگائیں۔

کتھن گلیسرین

اجزاء: کتھن سائیدہ ۱ گرام
سہاگم خام سائیدہ ۲ گرام
گلیسرین ۲۱ گرام
سب کو ملا کر حسب قاعدہ سیال تیار کریں۔
فوائد: قلع (منہ آتا)، بشو طلق (گلے میں)
پھنسیاں، درم لوزین (ٹانسلائٹس) وغیرہ کے
لیے مفید ہے۔
ترکیب استعمال: پھیری سے لگائیں۔

مرکی

اجزاء: گوگل ۱ گرام
رسوت ۱ گرام
سب کو باریک کر کے ۳ گرام (۶ رتی) کی
ایک قرص تیار کریں۔
فوائد: بادی بواسیر کے لیے مفید ہے۔
کی سوزش اور درم کو دور کرتی ہے۔ کاسیریراج ہو
خولاک: ایک ایک قرص صبح و شام پانی سے
کھلائیں یا دو قرص رات کو سوتے وقت۔

ست پودینہ ۲۵۵ گرام
ست اجوائن ۴۵۹ گرام
کافور ۹۵۵ گرام
روغن یوکلپٹس ۲۵۸۴ ملی لیٹر
روغن تارپین ۱۵۴۲ ملی لیٹر
روغن بادیان ۱۵۶۵ ملی لیٹر
روغن زیرہ ۱۵۴۲ ملی لیٹر
روغن ادرک ۱۵۶۵ ملی لیٹر
پیٹ کلوروفارم ۴۵۲۶۲ ملی لیٹر
فودکلر بقدر ضرورت

فوائد: ہر قسم کے درد، چوٹ، زخم، سوجن،
پلیگ، ہیمنہ اور زہریلے جانوروں کے کاٹے
کے لیے مفید ہے۔ پیٹ کی تمام شکایات کو
دور کرتی ہے۔

خوراک: دو سے پانچ قطرے پانی میں ملا کر یا
چینی میں ملا کر یا تاشہ میں رکھ کر کھلائیں۔

استعمالات: درد سر، آدھائیس، درد معدہ
اچھارہ، قے و متلی، دست آنا، بدھنسی، کان کا
درد، کان کا درم، درد گردہ، درد شانہ، درد کمر،
مسوڑھوں کا درد۔

مرہم ابیض

اجزاء: ست لوبان ایک حصہ ۱ گرام
سیلی سلک ایٹھ حصہ ۵۰۰ ٹی گرام
کولین پونڈ ۱ حصہ ۱۶۶ گرام
گندک ساییدہ ۳ حصہ ۸۸ ٹی گرام
ست پودینہ ۱ حصہ ۱۶۶ ٹی گرام
لیکوڈ پیرافین ۲ حصہ ۶۶۶ ٹی گرام
ولیلین سفید ۱۰ حصہ ۱۰ گرام
موم ولایتی ۲ حصہ ۶۶۶ ٹی گرام

حسب قاعدہ مرہم تیار کریں۔

فوائد: خارش، مادہ اکزیما ترو خشک اور دیگر
جلدی امراض کے لیے مفید ہے۔

ترکیب استعمال: مقام مایون پر لگائیں۔

استعمالات: چھپ، جھائیاں، ہاسے

بال خورہ، خارش خصیہ۔

مرہم برص جدید

اجزاء: تخم نیل ۱ گرام
بابچی ۲۵ گرام
پوست ریٹھ ۱ گرام

منغز بکائن ۱۵۲۵۰ گرام

ولیلین سفید ۲ گرام

ولیلین کے علاوہ سب کو بہت باریک کھل
کریں پھر ولیلین میں ملا کر مرہم تیار کریں۔

فوائد: برص (پھلجھری) کے داغوں کو دور
کرتا ہے۔ چھپ، جھائیوں اور جسم کے دوسری
قسم کے نشانوں کو دور کرتا ہے۔

ترکیب استعمال: داغوں پر لگائیں۔

مرہم بوا سیر جدید

اجزاء: بورک ایٹھ ۱ گرام
گیلک ایٹھ ۳۲۰۳ ٹی گرام
موم ۲ گرام
روغن نعیم ۵ گرام

حسب قاعدہ مرہم تیار کریں۔

فوائد: بوا سیری مسوں کی خارش، جلن اور

درد کو دور کرتا ہے۔ درد کو سکون دیتا ہے۔ کچھ

عصے متواتر استعمال کرنے سے بوا سیری سے

مرجھا جاتے ہیں۔ خون آنے کی حالت میں بھی یہ

فائدہ کرتا ہے۔

ترکیب استعمال: رت ضرورت مسوں پر لگائیں۔

مرہم خارش جدید

اجزاء: گندک آملہ سار ۱ گرام

کیمیل ۵۰۰ ملی گرام

سنگ جراحی ۵۰۰ ملی گرام

مردار سنگ ۵۰۰ ملی گرام

سفید کاشغری ۵۰۰ ملی گرام

کتھ سفید ۵۰۰ ملی گرام

کافور ۵۰۰ ملی گرام

برگ مناسائیدہ ۵۰۰ ملی گرام

ویلین سفید ۵۰۰ ملی گرام

قوائد: خارش خشک دتر، اگزیم، داد اور ہر قسم کی پھنسیوں کے لیے نہایت مفید ہے۔

ترکیب استعمال: مقام آؤٹ پر لگائیں۔

استعمالات: کان کی پھنسیاں، خارش خضیہ

شرم گاہ کی خارش، شرم گاہ کی پھنسیاں، شرم گاہ

کی خارش (امراض حاملہ)

مرہم رال

اجزاء: کافور قیصوری

۱ گرام

۱ گرام

۱ گرام

کتھ سفید ۱ گرام

روغن گاؤ تاندہ ۳ گرام

موم زرد ۱ گرام

حسب قاعدہ تیار کریں۔

قوائد: خراب گوشت کو زخم سے دھو کر تادہ

اس کو بھرتا ہے۔ تاہم کے لیے مفید ہے۔ آتشک

کے زخموں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔

ترکیب استعمال: نیم کے پتوں کو پانی میں

جوش دے کر زخم کو اس سے دھوئیں اور پھر یہ

مرہم کپڑے پر لگا کر زخم پر چپکا دیں۔

استعمالات: دق خاندیری، کن پھیر پھوڑ

پھنسیاں، بدہ کچھالی، انگلی بیڑا، زخم، تھنلا،

چوٹ لگنا۔

مرہم کافور

اجزاء: کافور ۳ گرام

سفید کاشغری ۱۲ گرام

سفیدی بیض مرغ ۱ عدد

موم زرد ۳ گرام

روغن کنجد ۸۰ گرام

حسب قاعدہ مرہم تیار کریں۔

فوائد: ورم کو تحلیل کرتا ہے۔ زخم کی سوزش کو دور کر کے ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ چھوٹی پھنسیوں کے لیے بھی مفید ہے۔

ترکیب استعمال: نیم کے پتے پانی میں جوش دے کر اس سے زخم کو دھوئیں پھر یہ مرہم لگائیں۔
استعمالات: آتشک، ہونٹوں کا پھٹنا، بھئی، گوبانجی، کان کی پھنسیاں، داد، اکڑیا، بال خورہ، پھوڑے پھنسیاں، بوائی پھٹنا، بواسیر، زخمِ رحم، شرم گاہ کی خارش، شرم گاہ کی پھنسیاں، شرم گاہ کا زخم، بھٹنی کا پھٹنا، شرم گاہ کی خارش (امراضِ عالمہ)، بھٹنی کا زخم (امراضِ زچہ)۔

مرہم محلّ

اجزاء: تمباکو ۱ گرام
جدوار ۱ گرام
ایرسا ۱ گرام
سکینچ ۱۵ گرام
وسلین سفید ۲۰ گرام
سب کو باریک کر کے وسیلین میں ملا کر مرہم تیار کریں۔

فوائد: ذہل کو ابتدا میں تحلیل کرتا ہے اور

بعد میں پکاتا ہے۔ گلیٹیوں کے اورام کو تحلیل کرتا ہے۔ درد کم اور درجہ المفاصل میں جب شدید ورم اور درد ہو تو اس کے لگانے سے آرام ہو جاتا ہے۔

ترکیب استعمال: کپڑے پر یہ مرہم لگا کر مقامِ مآذ پر چپکائیں۔

استعمالات: دق خنازیری، دق عظام، کن پھیر، گٹھیا، بال خورہ، پھوڑے پھنسیاں، بد کچھالی، بھٹنی کا پھٹنا، چوٹ لگنا، دردِ کمر۔

منجن سفید

اجزاء: استخوانِ بز سوختہ سائیدہ ۱ گرام
چاک پوڈر ۶۰۰ ملی گرام
پیشکری سفید سائیدہ ۶۰۰ ملی گرام
سب کو باریک کر کے منجن تیار کریں۔

فوائد: دانتوں کو صاف کرتا ہے۔ ان کی جگہ بڑھاتا ہے۔ مسوڑھوں کے ورم اور درد کو دور کرتا ہے۔ خون اور پیپ کو بند کرتا ہے۔
ترکیب استعمال: صبح و شام انگلی سے دانتوں اور مسوڑھوں پر لگائیں۔

اجزاء ہیں:

۳ قطرے	عرق پودینہ مقطر
۳ قطرے	عرق زیرہ مقطر
۱ قطرہ	عرق انیسون مرکب
۱/۲ قطرہ	عرق سورہ مرکب
۱ قطرہ	عرق پودینہ ولایتی
۱۲۵ ملی گرام	سوڈا بائی کارب
۱ قطرہ	سپرٹ ایونیٹلک
۱ قطرہ	سپرٹ کلوروفارم
حسب ضرورت	سکرور

حسب قاعدہ تمام اجزاء کو ملا کر شربت تیار کریں۔
 فوائد: قبض، بد مصفی، ایچما، درد ہڈی،
 دست، ہیچس، دانت نکانا، جگر اور کلی کا
 بڑھنا، نیند میں چوکنما، ٹنڈا آنا، بال بہنا،
 چوڑے (چرنے ہونا)، پیاس کی شدت وغیرہ
 بچوں کے تمام امراض میں مفید ہے۔

ہمدردیام

۴ فی صد	اجزاء: میتھائل سیلی سی لیٹ
۲ فی صد	یوکلٹس آئل
۱ فی صد	پودھی ایونیٹل آئل

منڈوڑا

۵۰۰ ملی گرام	اجزاء: کیلیم فاسفیٹ
۱۲۵ ملی گرام	کیلیم لیکٹیٹ
۵۰۰ آئی۔ یو	وٹامن ڈی

سب کو ملا کر قرص تیار کریں
 فوائد: دائمی نزلہ، دانتوں کی کمزوری اور خرابی
 حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں اور بچوں
 کے لیے بہت مفید ہے۔

خوراک: بڑوں کو ایک سے ۳ قرص بچوں
 کو ایک سے دو قرص دن میں تین بار کھلائیں۔

استعمالات: دق الریہ، دق عظام، دماغ
 کی کمزوری، مسوڑھوں سے خون بہنا، مسوڑھوں
 سے پیپ آنا، خونی قے، سنگرہنی، ضعف جگر
 کئی خون، کان بہنا، بہرا پن، نکسیر کھانسی، خون
 تھوین، کثرت حیض، بندش حیض، حمل گرنا،
 بول زلالی (امراض حاملہ)، کئی خون (امراض حاملہ)
 کلی ٹھکنا (امراض اطفال)۔

نوںہال گرائپ سیرپ

ایک خوراک ۵ و ۳۴ سی سی میں حسب ذیل

ست اجزائن	۵۰۵ فی صد	نیلی گوند کاتیل	۱۵۴۳ فی صد
کافور	۱۵۷۵ فی صد	اجزائن کاتیل	۱۵۴۳ فی صد
ست پودینہ	۲ فی صد	کافور کاتیل	۱۵۴۳ فی صد
موم اصلی، ویلین	۸۵۵۷۵ فی صد	موم	۱۵۴۳ فی صد
استعمالات: موتی، حمرہ، خسرہ، دروسر،		ویلین	۱۵۴۳ فی صد
آدھائیس، گٹیا، ذات الریہ، درہ، دروسر		پیرافین لیکوڈ	۷۹۸۶ فی صد
(امراض حاملہ)، ڈوبہ اطفال (امراض اطفال)		کھنڈوئل	حسب ضرورت
کالی کھانسی (امراض اطفال)۔		استعمالات: پھوڑے پھنیاں، بد، انگل طیرا،	
		زخم، بوائی پھٹنا، آنکھوں کا پھولنا، بھٹی کا زخم،	
		(امراض زچہ)، چوٹ لگنا، مریخ آنا۔	

ہمکدر دھرم

اجزا، گندویر وزہ ۱۵۷۸ فی صد

علاج الامراض

متعدی امراض

Infectious Diseases

اگر بلغم میں خون آ رہا ہو تو
سپہر کو: قرص حالبس پانی سے کھلائیں۔

اعدد

اگر بلغم میں عفونت اور کسپیٹروں میں جوف ہوں
اور دست بھی آ رہے ہوں تو
صبح و شام یا بعد غذا حسب عتق و ضرورت
حب مال پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ اعدد

اگر کمزوری و قہامت زیادہ ہو کھانسی میں خون
آ رہا ہو تو
صبح و سہر کو: منڈو غذا کھلائیں۔

۲-۲ اعدد

بعد غذا: عرق کافور پانی میں ملا کر پلائیں۔
۵-۵ قطرے

۱۔ کسپیٹروں کی سل و دق

دق الریہ، سل ریوی

Pulmonary
Tuberculosis

بخار کی حالت میں

صبح کو: قرص بخار پانی سے کھلائیں۔

اعدد

اگر اس کے ساتھ

برگ اڑوسہ، گوسبز، خاکسی پانی میں

۱۲ گرام ۱۲ گرام ۶ گرام

جوش دے کر چھان کر شہد خالص ملا کر

۲۵ گرام

پلا یا بجائے تو بہت مفید ہے۔

شدید کھانسی میں

رات کو: صدوری چٹائیں

۹ لیٹر

۲۔ آنٹوں کی وق

رق الامعاء، سلطانی

Intestinal Tuberculosis

اگر آنٹوں میں ورم ہو، بخار رہتا ہو، گردست نہ آتے ہوں تو

صبح کو: اب برگ کاسنی بجز روق، آب برگ کو
۶۰ ملی لٹر ۶۰ ملی لٹر

بجز روق پائیں۔

دریغ مرقین: ہری کاسنی، ہری موکے پتے لے کر کوٹ کر ان کا پانی پھولیں اور اس پانی کو آگ پر جوش دیں۔ جب یہ پانی پکے پکے پھٹ جائے تو آگ پر سے اتار کر چھان کر ٹھنڈا پلائیں۔

اگر قبض زیادہ ہو تو

مغز الماس اسی میں ملا کر پلائیں۔

۱۲ گرام

اگر ہیٹ میں سختی اور درد ہو تو

مغز الماس، ہری کو اور ہری کاسنی کے پتوں کے ساتھ پیس کر ہیٹ پر لپ

کر رہے۔

اگر دست آتے ہوں، پاخانہ میں خون اور پیپ آ رہی ہو، مروڑ ہو، کھانسی ہو تو
صبح و شام: حب مال پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

بعد غذا: عرق کاغذ پانی ملا کر پلائیں۔

۵-۵ قطرے

بخار بھی ہو تو

قرص بخار کھلائیں۔

۱ عدد

۳۔ گلیٹوں کی وق۔ رق خنایری

Scrofula

اگر بخار اور کھانسی ہو تو

صبح کو: قرص بخار پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

رات کو: صدوری چٹائیں

۹ ملی لٹر

اگر ہاضمہ درست نہ ہوا پھر وہ رہتا ہو بھوک نہ لگتی ہو تو

بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں۔

۲-۲ عدد

گلیٹیوں پر جب دم اور دھن ہو تو
ضما و راحت یا مرہم محل لگائیں
اگر گلیٹیاں پھوٹ کر زخم بن گئے ہوں تو
مرہم مال لگائیں
اگر دواؤں سے یہ گلیٹیاں ختم ہوں تو آپریشن
کرلائیں۔

۴۔ ہڈیوں کی دق۔ دق عظام

Tuberculosis of bone

اگر ماؤف ہڈی میں دم اور دھن ہو، ہضم خراب
ہو، بخار رہتا ہو تو
صبح کو، دو لے اوچلے پانی سے کھلائیں۔
اگر دم

بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں۔

۲-۲ عدد

سہ پہر کو: قرص بخار پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

مقام ماؤف پر ضما و راحت یا مرہم محل
لگائیں۔

اگر کمزوری و تھکت زیادہ ہو تو

صبح و شام: مشدود کھلائیں۔

۲-۲ عدد

ہڈیاں اور غذا، سل و دق کے مریضوں کو
ہدایت کی جائے کہ وہ دوسرے تن دوست لوگوں
سے علیحدہ رہیں۔ دق کے مریض کو غذائیں ایسی
کھلائی جائیں جو سادہ، جلد ہضم ہونے والی اور
توت بخش ہوں۔ غذا اتنی مقدار میں کھلائی جائے
جو آسانی ہضم ہو سکے۔

سل و دق کے مریضوں کے لیے سب سے
اچھی غذا دودھ ہے۔ مریض کے ہضم کے مطابق
دودھ کی مقدار مقرر کی جائے۔ اگر بخار ایک سو
درجے سے کم ہو تو انڈا دودھ میں پھینٹ کر
دیا جائے، یا اس کی زردی نیم برشت دی جائے
لیکن اور ملائی بھی ہضم کے مطابق کھلائیں۔

آنتوں کی دق میں جب مریض کو درست
آہ ہے ہوں اور دودھ ہضم ہوتا ہو تو اس کو
تازہ دہی اور لسی دی جاسکتی ہے۔ اس کے
علاوہ آش جو، ساگو دانہ، اور وٹ اور دلیہ بھی
دے سکتے ہیں۔ اچھی قسم کے بسکٹ اور ڈبل روٹی
بھی کھلائی جاسکتی ہے۔ بکری، مرغ کے چوزوں
تیرا در بیٹرو فیرو کے گوشت کا شوربہ اور بخنی
دے سکتے ہیں۔ بنریوں میں گھیا (رکی) ٹنڈے
توتی، پرہل، شلم، چھند، پالک، خرفہ اور تھو

چیچک

Small Pox

صبح کو: شربت خاکسی گرم پانی میں ملا کر پلائیں۔
۹ ملی لٹر

اگر نزلہ و ذکام اور کھانسی کی شدت ہو تو
رات کو: سعالین گرم پانی میں گھول کر پلائیں۔
۲ عدد

ہدایات و غذا: اس بچے کو دوسرے تندرست
بچوں سے علیحدہ رکھیں اور اگر تندرست بچوں
میں چیچک کا ٹیکہ نہ لگا ہو تو ان کے چیچک کا ٹیکہ
لگوائیں۔ تندرست ہونے کے بعد مریض بچے
کے تمام کپڑے اور بستر اگر ممکن ہو تو جلا دیے جائیں۔
دندان کو پانی میں پکا کر خوب دھو لیں اور
کمرے کو بھی صاف کریں اور اس میں دافع عفونت
دواؤں کی دھوئی دیں۔

غلط: دودھ پلائیں۔ ساگورہ یا گھہوں کا دیر
دودھ میں پکا کر لائیں۔ پھلے پھل سترہ موسمی
انار شیریں مانگو شیریں اند منشی وغیرہ دے سکتے
ہیں۔

کاساگ مناسب ہے۔ گہوں کی روٹی اور
ڈبل روٹی کھلائیں۔ پھلوں میں تازہ اور میٹھے
پھل کھلائیں۔

موسمی بخار

صبح کو: قرص بخار پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

رات کو: قرص بلین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

اگر شدید بخار ہوتے وقت ہی ہو رہی ہو گھبراہٹ
اور پیاس کی زیادتی ہو تو
شربت تمر ہندی چٹائیں یا پانی میں ملا کر
۹ ملی لٹر

پلائیں۔ کاغذی لیموں چٹائیں اس کا
سادہ شربت بنا کر پلائیں، سترہ اور موسمی
وغیرہ کھلائیں۔

شدت بخار کی وجہ سے دم بدم ہو تو سرد پانی میں
کپڑا بھگو کر پیشانی پر رکھیں۔ باری کے روز اگر
غذائے کھلائی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔

موتی جھرہ - حمی محرقة لطنی

Typhoid fever

صبح کو: شربت خاکسی گرم پانی میں ملا کر لیاں۔
۹ ڈالٹر

اگر اس کے ساتھ کھانسی ہو تو
رات کو: سعالین گرم پانی میں گھول کر لیاں۔
۴ عدد

اگر پیٹ میں درد ہو یا اچھارہ ہو تو
گرم پانی میں رند غن تارپن کے چند قطرہ
ملا کر یا اس کے بجائے ہینگ ملا کر تولیہ
اس پانی میں بھگو کر پھوڑ کر پیٹ پر رکھیں۔
جب تولیہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو تبدیل
کر کے دوسرا گرم تولیہ رکھیں اس طریقے
سے کم از کم دس منٹ تک سینک کریں۔
اگر قبض ہو تو گلیسرین کی تہی با اینما گلیسرین کے
ذریعے دور کیا جائے۔

اگر دست آرہے ہوں تو
حب ساق ایک عدد کھلائیں۔

اگر سر میں شدید درد ہو تو
ہلکا ہلکا دباؤ ملنے پر لگائیں۔

اگر سینے یا پسلیوں میں درد ہو تب بھی ہلکا ہلکا دباؤ
کی جگہ ہاتھ سے مالش کریں۔

ہدایات و غذا: اس بخار کے علاج میں جب
تک شدید ضرورت نہ ہو کوئی دست آور دوا نہ
دی جائے اور نہ شدید پسینہ لانے والی دوا کا
استعمال کیا جائے۔ غذا کے متعلق بھی خاص احتیاط
کی جائے۔ کوئی ٹھوس غذا نہ کھلائیں، بلکہ صرف
دودھ اور ٹیٹھے پھلوں کا رس پلایا جائے۔ اگر
قوت ہضم درست ہو اور پیٹ میں اچھا رند نہ ہو
تو ساگو دوا نہ یا گیہوں کا دلیہ دیا جاسکتا ہے لیکن
بہتر یہی ہے کہ کوئی غذا سوائے دودھ اور پھلوں
کے ص کے نہ دی جائے۔

تشخیصی علامات: دم اغشیہ دماغ

(Meningitis) موتی جھرہ، مرض اس

اور ذات الریہ (Pneumonia)

میں بعض اوقات علامات کی مشابہت
کی وجہ سے تشخیص میں دشواری ہو جاتی
ہے۔ ان میں تشخیصی علامات یہ ہیں کہ
موتی جھرہ میں بخار تیز ہوتا ہے، مگر نبض
کی رفتار حرارت کے مقابلہ میں کم ہوتی ہے اور

نکالی کھانسی

Whooping Cough

صبح کو: جب شہیقہ پس کر شہد خالص میں

۱ عدد

ٹاکر کھلائیں۔

رات کو: صدوری چٹائیں، یا

۵ ملی لٹر

سعالین گرم پانی میں گھول کر پلائیں۔

۲ عدد

اگر اس کے ساتھ نزلہ وزکام ہو تو

صبح یا رات کو: جوشینا گرم پانی میں ٹاکر پلائیں۔

۵ ملی لٹر

اگر تکلیف شدید ہو تو بوقت ضرورت یا

رات کو: شربت ربوی گرم پانی میں ٹاکر پلائیں۔

۳ ملی لٹر

بعض اوقات روغن نابیل تین ملی لٹر پلانا

بھی مفید ہوتا ہے۔ اس کو دودھ میں ٹاکر

بھی پلا سکتے ہیں۔

ہدایات و غذا: یہ ایک چھرت مار بیماری ہے

اس لیے مریض بچے کو دوسرے بچوں سے علیحدہ

اس میں یا کثرت سے عفونت مارا سہا آتے ہیں یا قبض ہوتا ہے اور چلد پر گلابی رنگ کے دھبے نکل آتے ہیں۔ اس کے برخلاف دمہ آغشیہ دماغ میں بخار شدید نہیں ہوتا۔ مرض سلسل میں ابتدا ہی سے کھانسی ہوتی ہے۔ ذات الریہ میں بلغم خون آمیز خارج ہوتا ہے۔

Measles

خسرہ

صبح کو: جوشینا نیم گرم پانی میں ٹاکر پلائیں۔

۹ ملی لٹر

رات کو: سعالین گرم پانی میں گھول کر پلائیں

۴ عدد

جب نزلہ وزکام اور کھانسی کی شکایت کم ہو جائے، مگر ابھی تک بخار ہو اور دانے نکلے

ہوں تو

صبح کو: شربت خاکسی گرم پانی میں ٹاکر پلائیں۔

۹ ملی لٹر

اگر سینے یا پسلی میں درد ہو تو

ہمدرد بام کی ہلکی سی مالش کریں۔

رکھیں۔ اس کے جوڑے برتنوں میں دوسرے
تن درست بچوں کو کھانے پینے سے منع کر دیں۔
غذائیں مکی چیزیں مثلاً دیسی گھی، مکھن، چکن شوربہ
باطم، کھدیرا اور چغوزہ وغیرہ کھلانا مفید ہے۔

ہیضہ Cholera

شروع میں جب قے و متلی ہو اور دست بھی
شروع ہو گئے ہوں تو
قلزم چینی میں ملا کر یا تاشے میں ڈال کر
۵ قطرے

کھلائیں، یا شربت قمر ہندی میں قلزم ملا کر
چلائیں۔

اگر دو تین بار یہ دوا دینے سے کوئی افات نہ ہو تو
جب حالس قے پانی کے ہمراہ کھلائیں، یا
۱ عدد

عرق کافور پلائیں۔
۵ قطرے

اگر ہاتھ پر ٹھنڈے ہو گئے ہوں تو گرم پانی کی
بوتلیں بنفلوں اور دانوں میں کھلیں اور
پورینہ خشک الائچی کلاں سکھ، قرضل پانی
۶ گرام ۶ عدد ۱۱ عدد

میں جوش دے کر چھان کر تھوڑا تھوڑا پلائیں
یا دوائے غریزی اس کے ساتھ ہر تین
۱ عدد

گھنٹے بعد کھلائیں۔

اگر پیشاب بند ہو جائے تو گردوں اور مثانہ پر
گرم پانی کی بوتل یا گرم تولیہ سے سینک کریں اور
مرعہ سرخ کا گودا (بیج نکال کر) ۲۵ گرام اور
اتنا ہی شہد ملا کر چلائیں۔ اس سے پیشاب آ جاتا
ہے۔

ہدایات و غذا: ہیضے کے مریض کو تن درست
آدمیوں سے علیحدہ کرے میں رکھیں، اس کی قے
و دست کو کسی گڑھے میں ڈال کر دبا دیں۔ اس
کے کمرے میں دافع عفونت چیزوں کی دھوئی
دیں۔ مریض کو غذا بالکل نہ دی جائے پیماس کی
شدت میں پانی جوش دے کر سرد کر کے بارف
سے ٹھنڈا کر کے خوب پلایا جائے۔ آرام ہونے
کے بعد بہت مکی غذا کھلانی شروع کریں یا
پھلن کارس بالخصوص انار شیریں کالسا پلائیں۔

آتشک Syphilis

صبح درت کو: قرص مصفی تلنے پانی سے کھلائیں۔
۱-۱

اگر پیشاب میں جلن یا رکاوٹ معلوم ہو تو

بعد غذا: قرص الکل پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

ساتھ کھلائیں۔

بعد غذا: قرص الکل پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

اگر اس طریقے سے پورے طور پر آرام نہ ہو تو پھر

صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں۔

۹ فی ٹر

جب پیشاب کی جلن کم ہو جائے اور پیشاب

کھل کر آنے لگے، مگر سواد آ رہا ہو تو

صبح کو: سفوف شرخ پانی کے ساتھ کھلائیں

۳ گرام

رات کو: قرص صنفی جدید پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

اگر پانی میں شربت بنوری ملا کر پلایا جائے

تو زیادہ مفید ہے۔

بعد غذا: قرص الکل پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

زخم پر مرہم کا فوراً لگائیں

ہدایات: آتشک کے مریض کو جنس، ملاپ سے

منع کر دینا چاہیے اور اچھا ہونے کے بعد جب تک

خون کا امتحان Kahn Test منفی نہ

ہو جائے اشادی نہ کرنی چاہیے۔

اگر اس کے ساتھ قبض بھی ہو تو

رات کو: قرص طین گرم پانی یا گرم دودھ سے

۱ عدد

کھلائیں۔

اگر نعوٹا سوزا کی ہو تو

رات کو: قرص مسکن پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

سوزاک

Gonorrhoea

شروع میں جب پیشاب میں شدید جلن اور

کچھ رکاوٹ ہو، پیپ آ رہی ہو، حشفہ متورم

ہو، سوراخ بول بند ہو اور غصہ تناسل دبانے

سے دکھتا ہو تو

صبح کو: سفوف شوره قلمی دودھ کی لٹی کے

۳ گرام

غذا اور پیرہیز: دودھ کی لٹی، دودھ اور سوڈا اور

آتش جو، ساگوٹانہ، فرنی، مال چپاتی اور ٹھنڈی

نرکاریاں کم نمک مرچ ٹال کر کھلائیں۔

گرم اور خارش دار غذائیں، مثلاً اچار،
پٹنی، ترشی، چائے، قہوہ، کافی، شراب، الکوحل
لوکات، آم وغیرہ سے پرہیز کیا جائے اور سخت
درزش، گھوڑے کی سواری اور سائیکل چڑنا بھی
مضر ہے۔

احتیاط: سوزاک کی شدت میں مریض کو چلنے
پہرنے سے منع کر دیں اور خیموں کو لٹکانہ رہنے
دیں، بلکہ لنگوٹ کے سہارے ان کو ادھر پر اٹھاؤ
رکھیں، ورنہ اس بے احتیاطی سے ورم خیمہ
فرقانی ہو جاتا ہے۔

کن پھیڑ (گلسوئے)

Mumps

اگر بخار ہو، سانس سے بدبو آتی ہو اور قبض
ہو تو

صبح کو: جو شینا گرم پانی میں ملا کر پلائیں۔
۹ لیٹر

رات کو: قرص ملین گرم پانی سے کھلائیں۔
اعد

ورم پر فماریا راحت لگائیں۔

اگلا س سے ورم تحلیل نہ ہو اور ورم میں سختی ہو تو
مرہم محلل لگائیں

اگر ورم بہت شدید ہو تو شروع میں چند جگہیں
لگوانے سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔

اگر ورم پاک کر پھوٹ جائے تو زخم پر
مرہم مال لگائیں

اگر ورم کی وجہ سے شدید درد ہو تو

لغائے اوجاڑ پانی سے کھلائیں۔
اگر ام

تشخیصی اشارہ: عفونی ورم غذا مکفہ

اور خناق سے اس کو تشخیص کرنا ضروری ہے،
کیوں کہ بعض عفونی امراض میں بھی یہ غدود

متورم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر دبانے سے یہ

ورم دردناک ہو اور ہاتھ کو گرم معلوم ہو اور اس

کی رنگت نمد ہو تو عموماً یہ مرض ہوتا ہے، کیونکہ

عفونی ورم سرعاً ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گلے

اور منہ کا لاجھی طرح مساس نہ کیا جائے۔ بعض

اوقات شدید بخار بالخصوص ثانی فائدہ نہیں

عفونت پھیل کر بھی یہ غدود متورم ہو جاتی ہیں

اور گلہ کوڑکے کثرت استعمال سے بھی اس مرض

کے جراثیم بہت جلد بڑھتے ہیں۔ اگر غدود میں

پیپ پڑ جائے تو شکاف (آپٹیشن) دوا دینا

چاہیے۔

پیش و بانی نہ جیر

اگر آنہوں میں سترے ہوں، مرد و شہید ہو لیجئے۔
روغن بیدار بخیر دودھ میں ملا کر پلائیں۔

۲۴ ملی لٹر

جب دست کھل کر آجائیں تو

قرص پیش و بانی سے کھلائیں، یا

اعدد

صبح کو: سدوس اسپخول پانی سے پھانکیں

۶ گرام

رات کو: حب ساق پانی سے کھلائیں۔

اعدد

غذا: مونگ کی دال کی کھڑی یا خشک پاؤں

دہی کے ساتھ کھلائیں تو اچھا ہے۔ اس کے

علاوہ دودھ ڈبل روٹی بھی دے سکتے ہیں۔ نمک

مرچ، گوم مسالے کی غذاؤں سے پرہیز کیا جائے

آپ بیل گری پلانا بھی مفید ہے۔

ترکیب آپ بیل گری: بیل نیم بخت کا

گودا ۲۵ گرام ایک گلاس ٹھنڈے پانی میں

ہمکھین اور تھوڑی دیر بعد اس کو مل کر چھان

لیں اور پییں۔

پیش و بانی (زحیر و بانی)

اس کے علاج میں بھی وہی طریقہ اختیار کیا

جائے جو پیش کا ہے۔ اگر خون شدید آ رہا ہو

اور مرد بھی زیادہ ہو تو

صبح و شام کو: حب مال پانی سے کھلائیں اور

۱-۱ عدد

رات کو: تخم ریحان پانی پر چھرک کر کھلائیں۔

۶ گرام

اگر صبح و شام مذکورہ بلانسے کے ساتھ پلایا جائے

تو زیادہ فائدہ مند ہے۔

نزلہ ذر کام

Catarrh, Coryza

فروع میں جب چھینکیں بہت آ رہی ہوں،

ناک سے بہتی ہو تو

صبح و شام: حب نزلہ پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

رات کو: معالین گرم پانی میں گھول کر پلائیں۔

۴ عدد

تین چار روز کے بعد جب ترے کی شدت کم

ہو جائے تو

صبح کو: جوشینا گرم پانی میں ملا کر پلائیں۔
۹ ملی لیٹر

اگر قبض ہو تو

رات کو: قرص ملین گرم پانی سے کھلائیں۔
اعدد

کھانسی کی شدت میں

قرص بادام منہ میں ڈال کر تمام دن میں
چار مرتبہ چوسیں۔

دامی نزلہ کے لیے

رات کو: قرص بلاد پانی سے کھلائیں۔
اعدد

نزلہ دہانتیہ

Influenza

اگر سردی تمام بدن میں درد ہو، بخار ہو، ناک
بہتی ہو، گلہ بگھٹا ہو تو

صبح کو: دوائے اوجاع چائے کے ساتھ کھلائیں۔
۱ گرام

رات کو: جوشینا گرم پانی میں ملا کر پلائیں
۹ ملی لیٹر

اگر قبض ہو تو

قرص ملین جوشینا کے ساتھ کھلائیں۔
اعدد

گلے کی نراش اور دھن کو دور کر کے لیے

سعالین چوستے رہیں
شہین پانی سے غزلے کریں۔ اس کے
بعد حلق میں دوائے مگلو پھیری سولگائیں۔

اگر بخار شدید ہو تو

سپہر کو: قرص بخار پانی سے کھلائیں۔
اعدد

شدید درد اور بخار کی حالت میں

دوائے اوجاع صبح اور رات کو دونوں
۱-۱ گرام

وقت کھلا سکتے ہیں۔ اور

صبح اور پہر اور رات کو: قرص الفلوانتر اگرم
۱-۱-۱ اعدد

پانی میں حل کر کے پلائیں۔

بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں۔

۲-۲ عدد

ہذا آیات: درد سر کی شدت میں مریض کو عذ نہ دیں۔ آرام کرنے کی ہدایت کریں۔ اگر درد سر سر کی ہو تو صحیح تشخیص کے بعد اس عضو کا علاج کریں۔

آدھائی سی شقیقہ

Migraine

شدت کے وقت

دولے اوجاع پانی سے کھلائیں۔
اگرام

قبض کو دور کرنے کے لیے
رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔
۲ عدد

پیشانی اور کپٹیوں پر قلمز یا ہمد درام
لگائیں۔

اگر طیر یا (موسمی بخار) کے بعد یہ مدد ہوا ہو تو
صبح یا رات کو: قرص بخار کھلائیں
۱ عدد

ہذا آیات: مریض کو ایسے کمرے میں بٹائیں

دلغ اور اعصاب کے امراض

درد سر۔ صداع

Head-ache

اگر شدید درد سر ہوا اور نزلہ وز کام بھی ہو تو
صبح یا بوقت ضرورت: دولے اوجاع پانی یا
اگرام

چلنے سے کھلائیں۔

اگر قبض ہو تو
رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں
۱ عدد

یا جوشینا گرم پانی ملا کر اس کے ساتھ پلائیں۔
۹ ٹی لٹر

بیرونی طور پر پیشانی اور کپٹیوں پر قلمز
یا ہمد درام لگائیں۔

اگر انی بلڈ پریشر (فشار الدم قوی) کی وجہ سے
درد سر ہو تو

صبح کو: قرص مسکن یا اکیر شفا پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد ۱ عدد

اگر ہضم خراب ہو تو

جہاں تیز روشنی اور چمک نہ ہو۔ درد شروع
ہونے سے پہلے یا درد کی حالت میں اگر کوئی
غذا نہ دی جائے تو اچھا ہے۔

ضعف دماغ

Cerebral Anaemia

صبح کو: منڈوڑا توڑ کر کھلائیں۔
۲ عدد

شام کو: دو لٹے غذائی دودھ یا پانی کو کھلائیں۔
۱۲ گرام

ہدایات: کمزوری دماغ کے مریض کے
لیے صبح و شام سر سبز اور کھلے میدان میں تفریح
دیر کرنا مفید ہے۔ غذائیں دودھ، گھی، مکھن،
انڈے، بکرے کا بیجا اور ہڈیوں کا گودا خالص
غذائیں ہیں۔ ہر قسم کے پھل اور خشک میوے
مغز بادام، منقہ، کشمش، اخروٹ، چلوغزہ،
بیتہ وغیرہ مفید ہیں۔

نسیان (بھول اور گند زہنی)

Amnesia

اگر دائمی تزلزلہ زکام رہنے کی وجہ سے ہو تو

صبح کو: حب نزلہ پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

سپہر کو: منڈوڑا توڑ کر کھلائیں۔
۲ عدد

اگر قبض رہتا ہو تو
رات کو: قرص ملین تیم گرم پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

کمزوری دماغ کی حالت میں
صبح کو: دو لٹے غذائی پانی یا دودھ سے کھلائیں۔
۱۲ گرام

سلاو و وار (سر چکرانا)

Vertigo, giddiness

صبح کو: منڈوڑا توڑ کر کھلائیں
۲ عدد

شام کو: دو لٹے غذائی پانی یا دودھ سے کھلائیں۔
۱۲ گرام

ہاضمے اور معدے کی کمزوری کے سبب ہو تو
بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں
۱۰۱ عدد

اگر قبض ہو تو

رات کو: قرص ملین گرم پانی سے کھلائیں
۱ عدد

سہر (نیند نہ آنا)
Insomnia

صبح کو: قرص مسکن دودھ سے کھلائیں۔
۱ عدد

اگر مضم کی خرابی اور ریا کی کثرت کی وجہ سے
نیند نہ آتی ہو اور قبض بھی ہو تو
بعد غذا: قرص اکل پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

اگر دماغی خشکی اور کمزوری اس کا سبب ہو تو
صبح کو: دو لٹے غذائی کھلائیں
۱۲ گرام

رات کو: قرص مسکن پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

اگر بانی بلڈ پریشر (نشار الدم قوی) کی وجہ سے
نیند نہ آتی ہو، ہیجانی کیفیت ہو تو
صبح کو: اکسیر شفا پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں۔
۲-۲ عدد

دماغی کمزوری، خشکی اور نیند نہ آنے کی حالت
میں حسب ذیل دوا بہت مفید ہے۔
مغز بادام شیریں، تخم خشخاش سفید
۳ گرام ۷ عدد

پانی میں پیس چھان کر چینی سے میٹھا کر کے
پیا کریں۔
اگر بخار کی وجہ سے نیند نہ آئے تو
ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں
کو سفید کر لیں یا کدو دراز (لوکی) کے
ٹکڑے کاٹ کر یا کانسے کے کٹوروں سے
سہلائیں۔

صرع (مرگی)
Epilepsy

صبح کو: قرص مسکن پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں
۲-۲ عدد

اگر اس کا سبب پیٹ کے کیڑے ہوں تو

صبح کو: قرص دیدارِ جدید پانی سے کھلائیں۔
اعدد ۱

رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔
اعدد ۱

سیہ بہر کو: اکیس شفا پانی سے کھلائیں
اعدد ۱

ہلکیا ت: مرگی کے مریض کے لیے مباشرت
درزش اور دماغی و جسمانی محنت مضر ہے۔ چکدار
چیزوں یا گھومتی ہوئی چیزوں کا دیکھنا اور زور
کی آواز کا سنا سنا ہی نقصان دیتا ہے۔

جنون (یا گل پن)

Insanity, Mania

صبح کو: اکیس شفا پانی سے کھلائیں۔
اعدد ۱

اگر قبض ہو تو

رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں
اعدد ۱

اگر ہائیمہ اور معدہ خراب ہو، ریا ح کی پیدائش
ہوتی ہو تو

بعد غذا: قرص گلی آکھ پانی سے کھلائیں۔
اعدد ۲-۳

اگر اس کا سبب خون حیض یا خون بواسیر کی
بدرش ہو تو اس کا مناسب علاج کیا جائے۔
ہلکیا ت: یا گل مریض کے لیے گائے یا بکری
کا دودھ سب سے اچھی غذا ہے۔ جنون کے
مریض کو کشاہ اور ہوادار کمرے میں رکھیں۔
دن میں کئی بار نہلائیں۔

فالج و لقوہ (ادھرنک)

Paralysis

شروع میں اگر مریض فریہ و قوا نا ہو تو سات
روز تک اور نہ کم از کم چار روز تک غذا
پانی بالکل نہ دیں۔ صرف مار العسل پلاتے رہیں۔
ترکیب مار العسل: شہد خالص کو پانی
۲۴ گرام ۱۲۵ ملی لیٹر

میں ملا کر جوش دیں اور وقت ضرورت پلا
اگر قبض ہو تو اینما (حقنہ) کے ذریعہ
دور کریں یا

قرص ملین نیم گرم پانی کے ساتھ کھلائیں۔
اعدد ۳

اگر پانی کے بجائے بادیاں پانی میں جوش
۲۵ گرام

دے کر چھان کر پلائیں تو زیادہ اچھا ہے

چار پانچ روز کے بعد

اگر بلڈ پریشر ہائی ہو تو

صبح کو: اکیر شفا پانی سے کھلائیں۔

اعد

جب بلڈ پریشر نائل ہو جائے تو

صبح کو: دوائے غریزی پانی سے کھلائیں۔

اعد

بعد غذا: قرص بلاد پانی سے کھلائیں

۱-۱ اعد

ہس کی ایک دو پوتھی چھیل کر پیس کر

شہر خالص میں ملا کر کہانا بھی مفید ہے۔

غذا اور پے پینر: چار پانچ روز کے بعد اگر اس کا

سبب ہائی بلڈ پریشر نہ ہو تو جنگلی کبوتر کی بخنی یا

شوربہ پلائیں۔ اگر یہ نہ ملے تو تیرا پیر یا چوہ مرغ

کی بخنی یا شوربہ دیں۔ جب شدت مرض کم

ہو جائے تو چپاتی بھی شوربے کے ساتھ کھلا سکتے

ہیں۔ موٹھ کی دال، میتھی اور مونگ کی دال پکا کر

بھی کھلا سکتے ہیں۔

علامت: شدت مرض کی حالت میں کوئی

تیز ہل ہرگز نہ دیں، البتہ ہلکی دوا ضرور

کھلائیں۔ اگر حقہ کیا جائے تو بہتر ہے۔

۲۔ شدت مرض کی حالت میں کوئی محرک

دوا نہ دی جائے۔ چلے اور قہوہ سے بھی بہتر

کیا جائے تو بہتر ہے۔

۳۔ ابتدائے مرض میں کسی روغن کی بھی

مالش نہ کی جائے۔

۴۔ اگر فالج کے ساتھ بخار بھی ہو جائے تو

علاج میں اس کا بھی خیال رکھا جائے۔

۵۔ جب فالج کا مریض اپنا ہوجائے تو

اس کو کم از کم چھ مہینے تک غذا کم مقدار میں

دیتے رہیں اور ہر مہینے کوئی ملین دوا بھی کھلا

رہیں۔ ترشی اور ٹھنڈی چیزوں سے منع کریں۔

زیادہ ٹھنڈا پانی بھی نہ پلایا جائے۔

رموز و نکات: بعض اوقات نفع (حرم سخن)

پر چوٹ لگنے سے نیچے کا دھڑ مفلوج

ہو جاتا ہے۔ یہ لاعلاج ہے۔ جب سکے تھکے

بعد فالج ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی محال ہے۔

اگر بڑھاپے میں فالج ہو جائے تو شاید دوا نہ ہی

نائل ہوتا ہے۔

مفلوج عضو جب خشک اور لاغر ہونے لگے تو

سمجھ لینا چاہیے کہ اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔

لقوہ : بعض اوقات تنہا ہوتا ہے یعنی اس کے ساتھ فالج نہیں ہوتا ہے۔ اس کا علاج بھی فالج کے مانند ہی ہوتا ہے۔ پرہیز و غذا کے بارے میں وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو فالج کا طریقہ ہے۔ شدید علامات دور ہونے کے بعد مریض کو جائز فیصلے کی ہدایت کریں اور بطور سہارا باریک پس کر زبان پر ملو یا جلے۔

استحالی امراض

وجع المفاصل

Rheumatism

اگر درد شدید ہو تو
صبح و شب کو: دو لے اوجاع پانی سے پانچ
۱-۱ گرام

کے ساتھ کھلائیں۔

بعد غذا: قرص نصف جدید
۱-۱ عدد

اگر قبض رہتا ہو تو دو لے اوجاع کی بجائے
رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔
۲ عدد

اگر گٹھیا کی تکلیف پرانی ہو، جوڑوں میں درد اور
درد سخت ہو تو
صبح کو: قرص کلونجی پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

بعد غذا: قرص بلا در پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

مقام باؤف پر ہمدردیام کی مالش کریں۔
اگر عدم شدید ہو تو

مرہم محل لگائیں اور برگ آکھ گرم کر کے
باندھیں، یا بنولوں کو کوٹ کر پانی میں جوش
دے کر جوڑوں پر نیم گرم باندھیں۔

ذیابیطس

Diabetes

اگر عیشاب زیادہ آتا ہو، مگر اس میں شکر نہ خارج
ہوتی ہو تو

صبح کو: قرص ملک البیل جدید پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

بعد غذا: قرص بلا در پانی سے کھلائیں
۱-۱ عدد

اگر عیشاب میں شکر خارج ہو رہی ہو تو

اعضائے ہضم کے امراض

دانتوں کا درد

Tooth-ache

اگر درد شدید ہو، مسٹرٹھوں میں درم ہو تو
صبح کو: دولٹے اور جامع نیم گرم پانی یا پچائے
اگرام
سے کھلائیں۔
درد کی جگہ

دوائے دارٹھ میں پشیر میری بھگو کر مسوڑھوں
پر لگائیں۔
اگر نزلہ وز کام اور قبض ہو تو
صبح کو: حسب نزلہ پانی سے کھلائیں۔
اعدد

رات کو: قرص ملین گرم پانی سے کھلائیں۔
اعدد

دانتوں اور مسوڑھوں پر سفید مٹھن ملیں۔
اگر دانتوں میں کیرا لگا ہو تو
کید، باؤڑنگ پانی میں جوش رہے کر
سہ گرام سہ گرام

صبح و شام کو: قرص زیابیطس خاص پانی سے
۱-۱ عدد

کھلائیں۔

بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

اگر کرپے کا موسم ہو تو اس کے ساتھ
آب کرپا سبز ملائیں۔
ترکیب آب کرپا سبز: سبز کرپے کے اندر
بیج نکال کر اس کو کوٹ کر پانی نکالیں اور
اس کو کرپے میں چھان کر ۲۰ ملی لٹر ملائیں۔ اگر
کرپے کا موسم نہ ہو تو

منفر بنولہ ۲۵ گرام پانی میں پیس کر چھان کر
ملائیں۔ اگر اس میں تھوڑا سا پیلا کا پانی نکال کر
ملا کر پیاجائے تو بہت مفید ہے۔

منفر جامن پیس کر تین تین گرام صبح و شام
پانی سے پھانکیں۔ اکثر حالات میں بہت فائدہ مند
ہے۔

غذا پر مہیز: زیابیطس کے مریض کی غذا اند
پر مہیز کا مفصل بیان غذا پر مہیز کے بیان
میں ملاحظہ کریں۔

چھان کر اس سے کلیاں کریں۔
اور قلم میں ذرا سی رندی پھگو کر سودا
میں رکھ دیں۔ درخت نیم کی شاخ کی
مساک کریں۔

دانتوں کا میل

Tartar

اگر دانت صاف نہ ہوں، میل لگا ہوا ہو تو
منجن سفید روزانہ پابندی سے لگائیں
اور روزانہ پابندی سے مساک یا ٹوٹر
برش منجن کے بعد استعمال کریں۔

دانتوں کا ہلنا

Loose-teeth

اگر دانتوں کے پہلے کا سبب نزلہ ہوا اور ساتھ
ہی معدہ بھی خراب ہو تو
صبح کو: حب نزلہ پانی سے کھلائیں۔
عد ۱

بعد غذا: قرص گل آکھ مانی سے کھلائیں۔
عد ۲-۲

مسوڑھوں پر منجن سفید پابندی سے

دونوں وقت میں۔
لیکر کی شاخ کی مساک کریں۔

مسوڑھوں سے خون بہنا

Bleeding gums

صبح و شام کو: منڈونا توڑ کر کھائیں
عد ۲-۲

منجن سفید ملیں اور
پھٹکری پیس کر پانی میں ملا کر رکھیں
۶ گرام ۱/۲ لٹ
اس سے صبح و شام کلیاں کریں۔
درخت لیکر کی نرم پھال پان کی طرح
چبا کر تھوک دبا کریں۔

مسوڑھوں سے پیپ آنا

Pyorrhoea

صبح کو: مانی پانی ملا کر ملائیں
۱/۲ لٹ

سپہر و شب کو: منڈونا توڑ کر کھائیں۔
عد ۲-۲

پیرینگینٹ آف پوٹاس ۱/۲ گرام ایک گلاک

زبان کے امراض

قوتِ ذائقہ کا زوال

Ageusia

اس مرض میں کڑوی چیز کی کڑواہٹ اور مٹھی چیز کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گرمی اور سردی بھی زبان کو محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے دفیعیہ کے لیے رائی پانی میں جوش دے کر کلیاں کرائیں۔
۱۲ گرام

یا کالی مرچ اور نوشادر پیس کر شہد خاص
۶ گرام ۶ گرام

میں ملائیں اور زبان پر ملیں اور بعد طوبت نکلے اس کو گراتے رہیں۔ اسی طرح داہنی یا بچھ پیس کر شہد ملا کر زبان پر ملنا بھی مفید ہے۔

بعض آدمیوں کی قوتِ ذائقہ افیون یا کوکین کے کثرت استعمال سے جاتی رہتی ہے۔ اس کے لیے مغز الماس ۲۴ گرام کو گرم ردھ ۲۵۰ غی لٹریں ملا کر کلیاں

نیم گرم پانی میں ملا کر دن میں دو تین بار کلیاں کریں، یا

نیلا تھو تھا بھونا ہوا، پٹکری بھونی ہوئی
۲ گرام ۲ گرام

شک سب کو پیس کر ایک گلاس نیم گرم سو گرام

پانی میں ملا کر کلیاں کریں۔
صبح و شام کو: دوائے داڑھ پھریں سو لگائیں۔
اگر ہاضمہ خراب ہو تو
بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں۔
۲-۳ عدد

نوٹ: اگر مرض زیادہ بڑھ گیا ہو، دانت اپنی جگہ چھوڑ چکے ہوں تو دانتوں کو نکلوادیں۔
بب اس مرض کی وجہ سے ہضم خراب ہو جاتا ہے تو پیپ خون میں شامل ہو کر معدہ، آنتوں، آکھ، ناک امدکان وغیرہ کی مختلف قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔

کرنا مفید ہے۔

دار چینی منہ میں رکھ کر چبائیں۔
منغز بادام شیریں مقشر، کالی مرچ پانی
عدد ۹ عدد ۹

ہکلانا (لکنت)

Stammering

میں پیس کر چلی سی بنا کر چاٹ لیں۔ اس
میں چینی بھی ملا سکتے ہیں۔
روغن بادام شیریں سر اور گردن پر مالش کریں۔

اگر معادی بخار (ٹائی فائیڈ فیور) چھپک اور
سرمام وغیرہ سے آرام ہونے کے بعد لکنت
ہو جائے تو

زبان کا پھٹنا

Fissure of the tongue

صبح شام کو: دولے غذائی دودھ کے
۱۲-۱۲ گرام

اگر قبض ہو یا آتشک کا اثر ہو تو
صبح کو: صافی پانی ملا کر پیلائیں
۹ ملی لیٹر

ساتھ کھلائیں۔

رات کو: مندرجہ ذیل توڑ کر کھلائیں
۲ عدد

اگر قبض شدید ہو تو اس کے ساتھ
قرص ملین کھلائیں

اگر فالج و لقمہ اور غلبہ بلغم کی وجہ سے لکنت
ہو تو

۲ عدد

بعد غذا: قرص بلادر پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

اسپنفل مسلم یا بہدان شیریں ۶ گرام کو
۲۵۰ ملی لیٹر پانی میں بھگو کر عذاب نکال لیں
اور اس سے سکلیاں کریں۔ اس کے بعد
زبان پر دودھ کی بالائی لگائیں۔

دولے لکنت: زبان پر کالی مرچ اور
نوشادر چھچھے گرام باریک پیس کر شہد
خالص ۶ گرام میں ملا کر رکھیں اور روزانہ صبح
شام زبان پر ملائیں اور جو رطوبت خارج ہو
اس کو گرائیں۔

اگر بیان میں زیادہ چونا کھانے سے زبان
پھٹ جائے تو کھوپڑیاں یا روغن نایل

زبان پر ملیں۔

منہ آنا (قلاع)

Thrush

اگر مضم کی خرابی اور قبض کی وجہ سے منہ آئے ہوں
ہو تو

صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں۔
۹ ٹی لٹر

بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

منہ میں قلاعی لگائیں، یا سہاگ تین گرام
باریک پیس کے شہد خالص یا گلیسرین ۲۵
ٹی لٹر ملا کر لگائیں۔

اگر پارسے کے مرکبات کھانے سے منہ آجائے تو
صبح و شب: قرص مصفی جدید پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

کتھی گلیسرین منہ میں لگائیں۔

مسودہ جلا کر کوئلہ بنائیں اور اس کے برابر
کتھہ ملا کر باریک پیس چھان کر منہ میں
چھڑکیں۔

ہونٹوں کا پھٹنا

Cracked Lips

صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں۔
۹ ٹی لٹر

بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

ہونٹوں پر مرہم کا فور لگائیں۔

حلق کا درد اور دم

Pharyngitis, Sore
throat

اگر قبض ہو تو

صبح یا رات کو: قرص ملین گرم پانی سے کھلائیں
۱ عدد

دولے غرغره پانی میں جوش دے کر
کھلیاں کرائیں۔

دولے گلو پیئریری سے گلے میں لگوائیں۔
اگر گلے کے باہر دم ہو اور دامن زیادہ ہو تو
عنا و راحت بیرونی طور پر گلے پر لگائیں۔
اگر گلے کے غدد بڑھے ہوئے ہوں، متوہم ہوں،
یعنی ٹائفلوائس ہو تو

چوبی گلیسرین پھریری سے اندر غدد پر
لگائیں۔

دوائے غرغره: مغز الماس ۲۵ گرام پانی
میں جوش دے کر چھان کر غرغره کرائیں۔ اندر
گلے میں دوائے گلو لگائیں۔ اگر آواز بیٹھ گئی ہو تو
رات کو: سمالین گرم پانی میں گھول کر پلائیں۔
۲۷ عدد

قرص بادام مخفیہ ڈال کر چوستے رہیں۔

معدہ اور آنتوں کے امراض

معدہ کا درد

Gastralgia

اگر درد شدید ہو تو

قلزم پانی میں ملا کر پلائیں
۵ قطرے

اگر اس کے ساتھ

قرص گل آکھ کھلائی جائے تو زیادہ میرے۔

۲ عدد

گرم پانی بوتل میں بھر کر اس سے درد کی جگہ
سینک کریں۔

اگر درد بدہضمی کی وجہ سے ہو، اتے اور مستی کی
شکایت ہو تو

گرم پانی میں نمک ملا کر پلائیں تاکہ تے
ہو کر معدہ صاف ہو جائے۔ اگر قبض ہو تو
قرص ملین گرم پانی سے کھلائیں، یا
۲ عدد

کیسٹر آئل کا اینما (حقنہ) کریں اور اجابت
ہونے کے بعد

قلزم پانی میں ملا کر پلائیں۔ اس کے
۵ قطرے

ساتھ قرص انکی کھلائیں۔
۲ عدد

غذا اوپر مہیز: اگر غذا کی خرابی سے درد کی
شکایت ہو تو غذا بالکل نہ دی جائے۔ جب درد
کو بالکل آرام ہو جائے تو کوئی نرم غذا، بکری
کے گوشت کا شوربہ یا مونگ کی پتی والی پلایا

بھوک کی کمی

Anorexia

اگر غلبہ شہری کی وجہ سے بھوک نہ لگتی ہو، یا کم لگتی
ہو تو

صبح و شام کو: شربت ترمہندی چٹائیں، یا پانی
۹-۹ ملی لیٹر

میں ملا کر پلائیں، یا

صبح کو: کاغذی لیموں کا شربت بنا کر پلائیں اور
بعد غذا: قرص گل آکھ کھلائیں۔

۲-۲ عدد

اگر تڑپ ڈکاریں آتی ہوں معدہ میں بھاری پن
رہتا ہو تو

بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

یادقت ضرورت کھلائیں۔

پیس کی زیادتی

Polydipsia

اگر معدے میں صفرا کے غلبہ کی وجہ سے پیاس
زیادہ لگتی ہو تو

شربت ترمہندی پانی ملا کر پلائیں یا
۱۸ ملی لیٹر

آپ لیموں کاغذی کا شربت بنا کر پلائیں،
یا کچھ روہنگ

تخم خرفہ پانی میں پیس کر چھان کر چینی سر
۱۲ گرام

میٹھا کر کے پلایا جائے، یا
بہارنہ شیریں کو کچھ دیر تک ٹھنڈے
۶ گرام

پانی میں بھگو کر اس کا لعاب نکال لیں
اور چینی سے میٹھا کر کے پلائیں۔

اچھارہ

Flatulenco

اگر اچھارہ شدید ہو تو

قرص گل آکھ یا قرص الکی کھلا کر اس
۲ عدد ۲ عدد

کے اوپر قلم پانی ملا کر پلائیں۔
۵ قطرے

دولے ٹکڑے: نمک اور باجرہ ۲۵، ۲۵ گرام
لے کر اس کی بوٹی بنا کر اس سے پیٹ کو سینکیں۔
اگر قبض ہو تو

قرص ملین گرم پانی سے کھلائیں۔
۲ عدد

روغن ازندی، روغن تانبہ میں ملا کر
۱۰ ملی لیٹر ۶ ملی لیٹر

پیٹ پر مالش کریں۔

کی چلم میں رکھ کر اس کا دھواں کھینچیں۔
 لائی ۱۲ گرام پانی میں جوش دے کر
 چھان کر پلائیں۔ بچکی خواہ کسی وجہ سے
 آہستہ ہو، اس سے بند ہو جاتی ہے۔

قے متلی

Vomitting, Nausea

اگر معدے میں صفرا کی زیادتی کی وجہ سے قے
 متلی کی شکایت ہو تو

شربت ترمہندی چٹائیں یا پانی میں ملا کر
 پالیں۔

ضماد: آملہ کو عرق گلاب اور سرکہ خالص
 ۶ گرام ۱۲ گرام ۱۲ گرام

میں پیس کر نیم معدہ پر لپیپ کریں اور
 جب جالس قے کھلائیں۔ اس کے ایک
 عدد

گھنٹے بعد شربت ترمہندی چٹانا ضرورت
 کر دیں۔

اگر معدے میں رطوبات کے جمع ہونے سے قے
 متلی کی شکایت ہو تو پہلے نیم گرم پانی میں نمک
 ملا کر پلائیں اور اناجلی ٹال کو قے کرادیں پھر

اگر بواسیر کی وجہ سے پیٹ میں ریاہ کی پیدائش
 ہوتی رہتی ہو تو
 بعد غذا: قرص تخمیر پانی سے کھلائیں
 ۱-۱ عدد

شام کو: مرکبی پانی سے کھلائیں۔
 عدد

بچکی

Hiccough

اگر بلغم اور کثرت ریاہ کی وجہ سے بچکی آتی
 ہوں تو

قرص گل آکھ یا قرص انکلی کھلائیں
 ۲ عدد ۲ عدد

اگر خشکی کی وجہ سے آ رہی ہوں تو
 قرص بادام منہ میں ڈال کر چٹائیں۔
 اگر عصبی کمزوری کی وجہ سے ہوں تو
 اکیر شفا کھلائیں
 عدد

اگر عدم معدہ و جگر بچکیاں آنے کا سبب ہو
 تو ان اعضا کا علاج کیا جائے۔
 ہلدی کی گرہ یا سالم اُرد (ماش) حقہ

قرص گل آکھ کھلائیں

۲ عدد

اگر آنتوں میں کیڑوں کی وجہ سے یہ شکایت ہو تو
صبح یا رات کو: قرص دیدان جدید کھلائیں۔

انار دانه، زرشک، پودینہ وغیرہ کی چٹنی
چٹائیں۔ اگر اس میں آپ لیموں کا فزی
ملا لیا جائے تو اچھا ہے۔ انار ترش، لوکاٹ،
سنترہ وغیرہ پھلوں کا رس پلائیں۔

خونی تے

Hematemesis

جب تک مریض کونے آتی رہے کوئی غذا نہ دی
جائے۔ اس کو آرام سے بستر پر لیٹائے رکھیں۔
پیاس کو تسکین دینے کے لیے برف کی ڈیاں
چٹائیں اور برف کو کوٹ کر ایک قبیل میں بھر کر
معدے کے مقام پر رکھیں یا ٹھنڈے پانی میں
کپڑے کی گدی پھلو کر رکھیں۔

اگر قبض ہو تو اینا (حقنہ) کریں یا گلیسرین کی
بتی سے قبض کو دور کریں، خون کو روکنے کے لیے۔

صبح کو: قرص حالبس پانی سے کھلائیں۔

۲ عدد

بعد غذا، عرق کافور پانی ملا کر یا چینی میں ملا کر
۵-۵ قطرے

کھلائیں۔

تے بند ہونے کے بعد کمزوری کو دور کرنے کے لیے

کچھ روز متواتر کھلانے کے بعد

نات کو: قرص طین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔

۲ عدد

اگر حاملہ عورتوں کے تے اور منتلی کی شکایت ہو تو
شریت تمر ہندی چٹائیں۔ انار شیریں یا
ترش حسب موقع کھلائیں۔ خالی پیٹ
نہیں۔ قلم چینی میں ملا کر کھلائیں۔
۵ قطرے

اگر جہانیا ریل کے سفر میں تلی و تے کی شکایت
ہو تو شدت کی حالت میں

حب حالبس تے کھلائیں اور پھر

۱ عدد

قلم چینی میں ملا کر کھلائیں
۵ قطرے

سفر کے سامان میں قلم کی ایک شیشی ضرور
رکھنی چاہیے۔

صبح دشام کو: منڈوڑا توڑ کر کھلائیں۔

۲-۴ عدد

رات کو: قرص یا پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

غذا دیر پہلے: جب چوبیس گھنٹے تک مریض کو قے نہ آئے تو اس کو پہلے انڈے کی سفیدی پانی میں پھینٹ کر پلائیں، یا دودھ کو پھاڑ کر اس کا پانی پلائیں۔ اس کے بعد جب مریض کی حالت اچھی ہونے لگے تو دودھ یا ساگودا دے دیں پکا یا ہوا کھلائیں۔

دست آنا

Diarrhoea

اگر آنتوں میں سڑے ہوں تو پہلے

روزغن بید بخیر (کیسٹر آئل) ۲۵ ملی لیٹر

دودھ میں ملا کر پلائیں اس کے بعد

رات کو: حب ساق پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

اگر صفرا کی زیادتی کی وجہ سے ہرے پیلے دست

آتے ہوں، تھے دستی کی شکایت ہر تو پہلے

شربت تر بندی چٹائیں، یا پانی میں ملا کر ۹ ملی لیٹر

پلائیں۔ اگر اسی میں قلم ملا کر پلائیں تو

۵ قطرے

زیادہ اچھا ہے، پھر

رات کو: قرص پچیس پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

سنگرہنی کی حالت میں

بعد غذا: حب مال پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

آب بیل تازہ کا شربت بنا کر پلائیں جس

کی ترکیب مرض پچیس کے علاج میں درج ہے

یا تازہ منتر بیل گری کو بھون کر ۲۵ گرام

کھلائیں۔

اگر دستوں میں خون آ رہا ہو، پیٹ میں مڑھ ہو تو

بعد غذا: عرق کافور پانی میں ملا کر یا چینی میں ملا کر

۵-۵ قطرے

کھلائیں۔

اگر پیچھی کی وجہ سے دست آ رہے ہوں، پیٹ

میں درد اور اچھاہ ہو تو

قرص گل آکھ کھلا کر قلم پانی میں ملا کر

۲ عدد ۵ قطرے

پلائیں، یا

جوشاندہ : بادیان ، پودینہ خشک ، قرفص
۵ گرام ۵ گرام ۵ عدد

الانچی کلاں مسلم پانی میں جوش دے کر
۵ عدد

چھان کر چینی سے میٹھا کر کے پلائیں مگر
اس میں تلزم ملا کر پلایا جائے تو زیادہ
اچھا ہے۔ اس کے ساتھ قرص گل آکھ
کھلائیں۔

غذا : اگر اچانک دست آنے لگیں قے دینی
ہو، پیٹ میں نفخ ہو تو غذا بالکل بند کر دیں۔
آرام ہونے کے بعد مونگ کی دال کی نرم کھجڑی
دہی سے کھلائیں۔ پودینہ کی چٹنی بھی کھلائیں۔

قبض

Constipation

اگر اتفاقی طور پر قبض ہو جائے تو
قرص ملین نیم گرم پانی یا گرم دودھ
۳ عدد

کے ساتھ کھلائیں

اگر دائمی قبض ہو تو

صبح یا رات کو : سبوس اسپنول دودھ یا پانی
۶ گرام

کے ساتھ کھلائیں۔

ہاضمے کی درستی کے لیے

بعد غذا : قرص تخمیر یا قرص الکلی پانی سے کھلائیں
۱-۱ عدد ۱-۱ عدد

رات کو : شربت تمر ہندی پانی ملا کر پلائیں۔
۱۸ ملی لیٹر

ہدایات : دائمی قبض کو درواؤں سے دور کرنے
کی بجائے غذا کے ذریعے درست کیا جائے۔
اس کی ترکیب یہ ہے کہ موٹے آٹے کی روٹی،
ساگ پات اور سبز ترکاریوں کے ساتھ کھلائیں۔
سبز ترکاریاں مقدار میں زیادہ کھائی جائیں۔ گاجر،
شلجم، چقندر، پرسل، لوکی (کر دران) ٹیٹے
تورنی، پالک، چولائی کا ساگ وغیرہ کھلائیں۔
کھانا کھانے کے بعد میسم و مزاج کے مطابق
آم، خرہوزہ، امروہ، انجیر، آلو بخارا، پیتھا
(انڈ خرہوزہ) ادا انگور وغیرہ کھلائیں۔

سنگرہنی

Sprue

جب یہ مرض پڑنا ہو، منہ میں چھالے ہوں کمزوری
نیا رہے ہو تو

صبح کو، منڈنا توڑ کر کھلائیں۔

۲ عدد

بعد غذا: حب مال پانی سے کھلائیں

۱-۱ عدد

منہ کے چھالوں پر

تلاخی لگائیں۔ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو

کتھی گھیسرین لگائیں۔

آب بیل گری چلائیں، یا تازہ بیل گری

کا گودا کھلائیں۔

آب جگر: بکری کی تازہ کلیجے کے اس کا قیہ

کر کے پانی نکالیں اور یہ پانی پلائیں نہایت مفید

چمیر ہے۔ تازہ کلیجی کو آگ پر بھون کر بھی کھلا

سکتے ہیں۔

غذا: ہلکی اور زود ہضم ہو جس میں برہی یا

گھی نہ ہو۔ نشاستہ دار اجزاء بھی کم ہوں۔ تندست

گھائے کا خالص دودھ جوش دے کر پلائیں۔

اس میں آتش جو یا زاکم ملا یا جاسکتا ہے۔

دہی مونگ کی مال کی نرم کھچری کھلائیں۔

اناروٹ اور ساگودانہ کی کھیر کھلائیں پھلوں میں

سیب اور انار شیریں مفید ہیں۔

مضی

Dyspepsia

اگر معدے میں ترشی بڑھی ہوئی ہو کھٹے دھار

آتے ہوں تو

قرص الکی کھانا کھانے کے بعد یا پہلے

۱-۱ عدد

کھلائیں۔

اگر اس کے ساتھ قے و متلی کی شکایت ہو پیٹ

میں درد اور اچھال بھی ہو تو

حب جالین قے پانی سے کھلائیں پھر

۱ عدد

صبح کو: شربت ترہندی چلائیں

۹ ملی لٹر

سپہر کو: قرص تخمیر کھلائیں

۲ عدد

اگر سردی کے غلبے سے برہمی ہو بدبودار دھاری

آتی ہوں پیٹ میں ریاح کی کثرت ہو، کھانا

کھانے کے بعد پیٹ میں گرانی اور دم بوجھتا ہو تو

صبح کو شربت منقش پانی میں ملا کر پلائیں

۵ ملی لٹر

بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں

۲-۲ عدد

بعد غذا: قرص الکل پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

اگر قبض رہتا ہو تو پیٹے میں دہن بار
رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

اگر بد ہضمی عصبی خرابی سے ہو جو جلق یا سیکوئل
نیورسٹینیا کے مریضوں کو عموماً ہوتی ہے۔ ان کو
صبح کو: اکسیر شفا پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

اگر بد ہضمی کے ساتھ دست آہ ہے ہوں تو ان
کو فوراً بند نہ کریں، بلکہ

جوشاندہ: بادیان، پودینہ خشک، الائچی کلاں
۵ گرام ۵ گرام ۵ عدد

زیر سفید پانی میں جوش دے کر پلائیں
۳ گرام

اور بارہ گھنٹے تک غذا بھی بند کر دیں۔

اس کے بعد جب ساق ایک عدد کھلا کر
قلزم پانی میں ملا کر پلائیں۔

جب بد ہضمی خراش یا مزمن سوزش معدہ کی وجہ
سے ہو اور کھانا کھانے کے بعد معدے میں جلق،
درد اور گدائی محسوس ہوتی ہو، ہاتھ پیر کی ہتھیلیاں
جلتی رہتی ہوں تو اس حالت میں

صبح و شام: آب کمر سبز مروق، آب کاسنی سبز

مروق پلائیں۔ (ان کی ترکیب تیار دی

دق عضوی کے تحت ملاحظہ کیجیے)

بعد غذا: قلزم پانی ملا کر پلائیں۔

۵-۵ قطرے

غذا و پیرہیز: بد ہضمی اگر ترشی معدہ کے
سبب سے ہو تو شراب و کباب اور کھٹی میٹھی
چیزوں سے پرہیز کریں۔ نمک اور مسالے بھی
بہت کم کھائیں۔ پانی کی بجائے سوڈا و اٹر پینا
بھی مفید ہے۔ اگر بد ہضمی کا سبب ترشی معدہ
کی کمی ہو تو کھانے میں نمک اور مسالے کھانے
چاہئیں۔ پانی کم پینا چاہیے۔ مولی کا اچار،
پودینہ کی چٹنی اور شوربہ چپاتی کھانا مفید ہے۔

قولج

Colic

اگر درد خفیف ہو تو

قرص گل آکھ کھلا کر قلزم پانی میں
۳ عدد ۵ قطرے

ملا کر پلائیں

اگر قبض ہو اور درد شدید ہو تو آنتوں کو صاف کرنے کی غرض سے

قرص ملین کھلا کر بادیان نیم کوفتہ،
۳ عدد ۶ گرام

زنجبیل نیم کوفتہ پودینہ خشک، سوڈا خوردنی
۳ گرام ۶ گرام ۱ گرام

پانی میں جوش دے کر چھان کر پلائیں، یا
قرص ملین کھلا کر روغن ارندہ، عرق نعف
۳۶ ملی لیٹر ۱۲۵ ملی لیٹر

میں ملا کر پلائیں۔

شدید درد کی حالت میں

حب حالب سے یا اکیر شفا پانی سے
۲ عدد ۱ عدد

کھلائیں۔

بہل میں گرم پانی بھر کر اس سے پیٹ کی
سینک کریں درد کم ہونے کے بعد اجابت
لانے کے لیے

صابن، روغن بیدانجیر، روغن تارپین
۱۲ گرام ۲۴ ملی لیٹر ۱۲ ملی لیٹر

گرم پانی میں ملا کر انیما (حقنہ) کریں۔

جگر اور تلی کے امراض

جگر کی گرمی، سورمناج کبد حار

Congestion of liver

اگر جگر میں گرمی زیادہ بڑھی ہوئی ہو، جگر کی جگہ
جلن ہو، پیاس زیادہ لگتی ہو، پاخانہ خشک آتا
ہو تو

صبح و شام: شربت ترمندی پانی میں ملا کر پلائیں۔
۱۸-۱۸ ملی لیٹر

اگر یہ شربت آب کاسنی سبز مرق، آب مکو
سبز مرق میں ملا کر پلایا جائے تو زیادہ مفید ہے۔

اگر غذا اچھی طرح ہضم نہ ہو تو
بعد غذا: قرص الکلی پانی سے کھلائیں
۱-۱ عدد

اگر قبض ہو تو

رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

غذا: ٹھنڈی سبز ترکاریاں اور پھلوں میں
انار شیریں، سنترہ اور موسمی اور آب لیموں کاغذی
پلائیں۔ چھاپھ (جو گھٹی نہ ہو) پانی ملا کر پلانا

بہت فائدہ کرتی ہے۔

درم جگر

Hepatitis

صبح کو: آپ کا سنی سبز مرق، آب مکو سبز مرق
پلائیں۔

اگر گرمی و پیاس زیادہ ہو، صفر کی کثرت ہو
تو شربت تمر ہندی اس میں ملا کر پلا سکتے ہیں۔
بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

اگر قبض ہو تو کوئی قوی سہل نہ دیا جائے بلکہ
رات کو: قرص ملین ایک یا دو عدد ضرورت
کے مطابق کھلائیں۔

شام کو: کسندی بولی کے پتے، سیاہ مرچ
۱۲ گرام
۷ عدد

پانی میں پیس پھان کر پلانا بھی مفید ہے۔
جب درم دور ہو جائے، جسم میں کمزوری اور
خون کی کمی ہو تو

بعد غذا: عرق فولاد خام پانی میں ملا کر پلائیں۔
۹-۹ ٹی لٹر

رات کو: قرص تخیر پانی سے کھلائیں۔
۳ عدد

نکات: درم جگر کے علاج میں یہ یاد رکھنا
چاہیے کہ اگر درم جگر کے محتب حصے میں ہو تو
مرد و عورتیں دی جائیں۔ سہل ہرگز نہ دینا چاہیے۔
اگر شدید ضرورت ہو تو کوئی ہلکی ملین دوا دی جائے
اگر درم جگر کے مقعر حصے میں ہو تو ملین او سہل
دوائیں کھلائیں، مگر تیز سہل نہ دیں۔ مرض کی
انتہا میں بہت توجہ اور احتیاط کی ضرورت ہوتی
ہے، کیوں کہ اس زمرے میں اگر علاج میں دواسی
بھی غلطی ہو جائے تو جگر میں یا تو سختی پیدا ہو جاتی
ہے، یا جگر میں پیپ بڑھ کر پھوٹا بن جاتا ہے۔ اگر
جگر میں سختی پیدا ہو جائے تو اس حالت میں شربت
اور شربت بزووری ملا کر پلانا مفید ہے۔ اگر جگر
میں پیپ بڑھ کر پھوٹا بن جائے تو اس حالت
میں کسی ہوشیار سرجن سے مشورہ کرنا چاہیے۔

ضعف جگر

Dullness of liver

صبح: قرص گز پانی سے کھلائیں
۱ عدد

بعد غذا: عرق فولاد خام پانی ملا کر پلائیں۔
۹-۹ ٹی لٹر

رات کو: قرص تخمیر کھلائیں

عدد ۲

اگر ضعف جگر کی وجہ سے اسہال آ رہا ہے ہوں تو

صبح: منڈوڑا توڑ کر کھلائیں

عدد ۲

سہ پہر: قرص پیمیش پانی سے کھلائیں

عدد ۱

رات: حب حدید پانی سے کھلائیں۔

عدد ۲

خون کی کمی

Anaemia

بعد غذا: عرق فولاد خام پانی میں ملا کر پلائیں۔

۹-۹ ملی لٹر

سہ پہر کو: قرص تخمیر پانی سے کھلائیں۔

عدد ۲

اگر بھوک نہ لگتی ہو، پیٹ میں نفخ ہو جاتا ہو،

قبض رہتا ہو تو

بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں۔

عدد ۲-۲

رات کو: قرص ملین گرم پانی سے دوسرے

عدد ۱

تیسرے روز کھلائی جائے۔

اگر جسم کے کسی حصے سے زیادہ خون نکل جانے

کی وجہ سے خون کی کمی ہو اور خون جاری بھی ہو تو

صبح و سہ پہر کو: منڈوڑا توڑ کر کھلائیں۔

عدد ۲-۲

جب خون بند ہو جائے تو اس کے ساتھ

رات کو: عرق فولاد خام پانی میں ملا کر پلائیں۔

۹ ملی لٹر

اگر تلی یا غذا کی خرابی کی وجہ سے خون کی کمی ہو

پیٹ میں ریاح کی پیدائش ہوتی ہو، خون میں

ہیموگلوبین کی تعداد کم ہو تو

بعد غذا: حب حدید پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

سہ پہر: قرص تخمیر پانی سے کھلائیں

عدد ۲

اگر خون میں سرخ دانوں (R.B.C) کی تعداد

کم ہو تو مذکورہ بالا دواؤں کے ساتھ بکری کی

تازہ کلیجی کا پانی پلائیں۔

ترکیب آب جگر: بکری یا بھیر کی تازہ کلیجی

۵۰۰ گرام لے کر اس کا قیمہ کریں اور اس کو نچوڑ کر

کپڑے میں پھان کر پلائیں۔ ذائقہ کے لیے تھوڑا سا

استسقاء

Dropsy

شروع میں

صبح کو: برگ کسوندی فلفل سیاہ پانی میں
۱۲ گرام ۷ عدد

پیس چھان کر پلائیں۔ اگر برگ کسوندی
نہ مل سکے تو اس کی جگہ مویز منقہ والے
شامل کریں۔

بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں۔
۲-۲ عدد

اگر قبض ہو تو

رات کو: قرص ملین گرم پانی سے کھلائیں۔
۲ عدد

نوٹ: استسقاء لحمی اور زرقی میں دوتین

بارہ پاخانہ روزانہ ضرور موجانا چاہیے اور
اس مقصد کے لیے قرص ملین بہت مفید ہے۔

اگر قرص ملین کے ساتھ آب کریلا سبز
پلایا جائے تو درم جگر کی وجہ سے جو استسقا

ہو اس کے لیے بہت مفید ہے۔

ترکیب آب کریلا سبز: کریلا سبز کوٹ کر اس

نمک ملا کر پی سکتے ہیں۔

سفوف کبد: بکری یا بھیر کی تانہ کلیجی ایک
کیلوئے کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں اور
ان پر نمک ۱۲ گرام باریک پیس کر چھڑکیں اور
سرکہ خالص ۱۲۵ ملی لیٹر اس پر ڈال کر رکھ چھوڑیں
۲۰ گھنٹے بعد ایک کلو پانی ڈال کر دونوں ہاتھوں
سے اچھی طرح ملیں۔ اس کے بعد پانی کو چھان
لیں۔ اس پانی کو قلعی وارد گچی میں ہلکی آنچ پر
پکائیں، یہاں تک کہ پانی اُڑ جائے اور گاڑھا
حصہ باقی رہ جائے۔ اب اس کو بھی ہلکی آنچ پر
خشک کر لیں۔ پھر اس کو باریک پیس کر خشک
کر لیں۔

مریض کو ۳ گرام سے ۶ گرام تک انار کے
پانی کے ساتھ کھلائیں۔ اگر مذکورہ بالا دواؤں
کے ساتھ ایک وقت یہ دوا کھلائی جائے تو
تقریباً ہر قسم کے کئی خون کے لیے نہایت
مفید ہے۔

بکری کی کلیجی کو نیم برشت کر کے کھانا بھی
فائدہ مند ہے۔

غذا اور پرہیز کی بابت غذا اور پرہیز کا
عنوان ملاحظہ کیجیے۔

کا پانی پھوڑ لیں۔ اس کو کپڑے میں چھان کر پلائیں۔
اگر اس میں شہد خالص یا شربت بزوری ملا دیا
جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس سے مادے کا
اخراج بہت ہوتا ہے۔ اگر پیاس زیادہ لگتی ہو
تو خالص پانی کی بجائے پانی میں سرکہ خالص ملا کر
پلائیں۔ اس کا تناسب یہ ہو کہ ستو حصے پانی
میں ایک حصہ سرکہ خالص ملا کر پلایا جائے اور
نمک قطعی بند کر دینا چاہیے۔

اگر یہ مرض خون کی کمی کی وجہ سے ہو تو
اس کا علاج وہی کریں جو کمی خون میں تحریر کیا
گیا ہے۔ اس حالت میں

بعد غذا: عرق فولاد خام پانی ملا کر پلائیں، یا
۹-۹ ملی لٹر

حب حدید کھلائیں۔

۱-۱ عدد

رات کو: قرص تخمیر کھلائیں

۲ عدد

اگر تلی اور جگر کی وجہ سے استسقا ہو تو
بعد غذا: عرق گھیکو اور خام پانی ملا کر پلائیں۔
۹-۹ ملی لٹر

یا بعد غذا: عرق استسقا خام پانی ملا کر پلائیں۔
۲۵-۲۵ ملی لٹر

یہ عرق ہر قسم کے استسقا کے لیے مفید ہے۔
انتباہ: استسقا لمبی میں کھانسی کا ہونا اور
پیروں پر پھوڑے پھنسیوں کا نکلنا خطرناک
ہے۔ استسقا رزقی میں اگر فطوں میں بھی پانی
بھر جائے تو علاج دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر استسقا
کے مریض کے برانہ میں خون آنے لگے تو یہ بھی
ایک خطرناک علامت ہے۔

یرقان

Jaundice

صبح و شام: قرص گز پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

اگر اس کے ساتھ پانی کی جگہ بادیان ۱۲ گرام
پاؤ بھر پانی میں جوش دے کر اور چھان کر پلائیں
تو زیادہ مفید ہے یا اس کے ساتھ آب برگ
ترب سبز مروق تو بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔
ترکیب آب برگ ترب سبز مروق: تازہ مولی
کے پتوں کو کوٹ کر ۱۲۰ ملی لٹر پانی نکالیں اور اس
کو آگ پر رکھیں۔ جب جوش اٹھ جائے اور پانی
پھٹ جائے تو اس کو نیچے اتار کر چھان لیں اور
اس میں لال شکر ملا کر پلائیں۔

صبح کو: شربت تمر ہندی پانی میں ملا کر پلائیں۔
۱۸ ملی لٹر

بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

اگر صرف گرمی کی وجہ سے یہ مرض ہو، یا پیاس کی کثرت ہو اور موسم بھی گرم ہو تو تریبوز کا پانی، گلدزی کا پانی یا انار شیریں کا پانی پلانا بھی فائدہ کرتا ہے۔ چھ اچھ میں پانی ملا کر پینا نہایت مفید ہے۔ کمزوری دور کرنے کے لیے

بعد غذا: حب جدید ہمراہ آب کھلائیں۔
۱-۱ عدد

رات کو: قرص تخمیر پانی سے کھلائیں۔
۲ عدد

اگر مرقان پتہ کی پتھری (سنگ مرارہ) کی وجہ سے ہو تو اس کا علاج کریں۔ مذکورہ دوائیں اس حالت میں بھی نفع بخش ہیں۔

پیر ہیز: چکنی اشیاء گھی دودھ وغیرہ نہ کھلائیں۔ مفصل غذا پیر ہیز کا بیان اسی عنوان میں دیکھو

تلی کا بڑھ جانا یا تلی کا درم

Enlargement of the spleen

صبح و شب: قرص گز پانی سے کھلائیں
۱-۱ عدد

بعد غذا: عرق گھیکو اور خام پانی ملا کر پلائیں۔
۹-۹ ملی لٹر

اگر تلی میں درد اور دکھن ہو تو
ضماد راحت کپڑے پر چپکا کر لگائیں۔
اگر تلی اور پیٹ پر درم ہو، بخار ہو تو
آب کاسنی سبز مرق، آب مکو سبز مرق
۶۰ ملی لٹر ۶۰ ملی لٹر

کے ساتھ قرص گز کھلائیں اور
۲ عدد

شام کو: قرص بخار پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

جب تلی کا درم دور ہو جائے اور خون کی کمی ہو
جسانی قوت کم ہو تو
بعد غذا: حب جدید پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

یا اس کے بجائے

عرق فولا خام پانی ملا کر پلائیں۔
۹-۹ ملی لٹر

رات کو: قرص تخمیر کھلائیں۔
۲ عدد

اگر تلی میں سختی ہو تو

آپ برگ ترب سبز مرق نوشادر ملا کر
۱۲۵ ملی لٹر اگر آم

پلائیں، یا

آپ کر یا سبز پلائیں۔

۲ تولہ

ذرا پکے ہوئے پیسے کو چھیل کر ٹکڑے کر کے
سرکہ میں ڈال دیں۔ ایک ہفتے یا دس دن کے
بعد کھانے کے ساتھ یا صبح و شام کھایا کریں۔
نوٹ: مولی، ارتد خربوزہ (پیتا) اور انجیر
تلی کی بیماریوں میں بہت مفید ہیں۔ کھانا کھانے
کے بعد ان میں جو بھی دل کے ضرور کھایا کریں۔

آنتوں کے کیڑے

Intestinal Worms

صبح کو: قرص دیدان جدید پانی سے کھلائیں
۱ عدد

بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں۔
۲-۳ عدد

کم از کم دس بارہ روز یہ کھلا کر
رات کو: قرص ملین گرم پانی سے کھلائیں۔
۳ عدد

دستوں کے بعد پھر قرص دیدان جدید کھلانا
شروع کر دیں اور ہر چوتھے روز رات کو قرص ملین
گرم پانی سے کھلا دیا کریں۔ اگر قرص دیدان جدید
کے ساتھ کھٹے انار کی چھال ۴۸ گرام پانی میں
جوش دے کر پلائیں تو زیادہ فائدہ مند ہے۔
اس طریقے سے پیٹ کے ہر قسم کے کیڑے خارج
ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے تک
صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں۔
۹ ملی لٹر

بعد غذا: حب جدید پانی سے کھلائیں
۱-۱ عدد

اگر ان دواؤں کے شروع کرنے سے پہلے تین
دن تک دودھ شکر ملا کر پلا یا جلے اور پھر مذکورہ
بالا علاج شروع کیا جائے تو یہ بہتر طریقہ ہے۔
کدو دانوں کے اخراج کے لیے کیلہ مصفی
ایک گرام کھٹی چھا چھو یا دہی یا گل قند

میں ملا کر کھلانا بھی مفید ہے۔

اگر چرتوں کی وجہ سے پاخانے کی جگہ
خارش ہو تو نیم کاتیل لگائیں۔

آنکھوں کی بیماریاں آنکھیں نہ کھنا (آشوب چشم)

Conjunctivitis

صبح و شام: قطرہ چشم ڈرا پر سے آنکھ میں ڈالیں۔

اگر اس کی وجہ زبردست کام ہو تو

صبح و شام: حسب نزلہ پانی سے کھلائیں

(۱-۱ عدد)

اگر آنکھوں میں یا سر میں درد ہو تو

رات کو: دوائے اوجاع پانی سے کھلائیں

اگر ام

اگر قبض ہو تو

رات کو: قرص ملین گرم پانی سے کھلائیں۔

۲ عدد

اگر سوزا کی ہو تو

صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں

۵ لیٹر

بعد غذا: قرص الکل پانی سے کھلائیں

(۱-۱ عدد)

جب آنکھیں اچھی ہو جائیں اور سرخی باقی رہے تو

رات کو: سرمہ مطب سلائی سے آنکھوں میں

لگانا شروع کر دیں۔ اگر معمولی طور پر آنکھیں

دکھنے آجائیں تو شروع میں یہ سرمہ لگانے

سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ جن آدمیوں کی

آنکھیں اکثر دکھتی رہتی ہوں، ان کے لیے

یہ سرمہ روزانہ رات کو آنکھوں میں لگانا

بہت نفع بخش ہے۔

ہدایات: جب آنکھیں دکھ رہی ہوں تو ان

کو بار بار ہاتھوں سے ملنا مناسب نہیں ہے، بلکہ

ہلکی باریک پس کر اس میں ایک سفید کپڑا

رنگ کر آنکھ کے سامنے لٹکائیں اور اسی کپڑے

سے آنکھ صاف کرتے رہیں۔ دھوپ میں چلنے

پھرنے، چمک دانا اور روشن چیزوں کے دیکھنے

اور لکھنے پڑھنے کے کام سے پرہیز کیا جائے۔

بینائی کی کمزوری (ضعف بصر)

Asthenopia

اگر دماغ و جسم کی کمزوری، ہضم کی خرابی اور

میں کچھ دیر تک پیروں کو رکھنا مفید قرار ہے۔
 گاجروں کا پانی نکال کر روزانہ صبح و شام پینا
 مفید ثابت ہوتا ہے۔

جالا، پھولا

Nebula, Macula

اگر آنکھ میں سرخی ہو تو پہلے اس کو دور کرنے کے
 لیے کچھ دن تک
 صبح و شام: قطرہ چشم ڈرا پر سے آنکھ میں ڈالیں۔
 پھر

صبح و شام: شیا ف اکیر چشم پانی کے چند قطرہ
 ۱ عدد

میں گھس کر آنکھوں میں لگائیں۔
 اگر اس کے ساتھ رات کو سرمہ مطب بھی آنکھوں
 میں لگایا کریں تو مفید ہے۔

شورہ قلمی اور انہ ہلدی دونوں برابر
 وزن لے کر سرمے کی مانند کھول کریں۔ پھر کپڑے
 میں چھان کر رکھیں اور صبح و شام سلائی سے
 آنکھ میں لگایا کریں۔ بہت مفید دوا ہے۔

قبض وغیرہ سے نگاہ کمزور ہو تو
 صبح کو: دوائے غذائی دودھ سے کھلائیں۔ اگر
 ۱۲ گرام

دودھ میں مغز بادام شیریں مقشرا اور
 سات عدد

مرچ سیاہ پیس کر اس کے ساتھ پلائیں
 ۷ عدد

تو بہت فائدہ کرتی ہے۔
 بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں
 ۲-۶ عدد

اگر قبض رہتا ہو تو
 رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے ہفتے میں
 ۱ عدد

دو یا تین بار کھلا دیا کریں۔

روزانہ بادیاں ۶ گرام صبح و شام عرصے
 تک کھاتے رہنا نگاہ کی کمزوری کو دور کرنے کے
 لیے بہت مفید ہے۔

رات کو آنکھوں میں سرمہ مطب پابندی
 سے لگایا کریں۔

ھڈا یا ت: صبح و شام سبزہ زار میں سیر و تفریح
 کرنا، تازہ پانی سے آنکھوں کو دھونا اور تازہ پانی

کی کمی سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے خوردنی طور پر
صبح وشام: دولے غذائی درودھ سے کھلائیں
۱۲-۱۳ گرام

آنکھوں میں لگانے کے لیے مندرجہ ذیل دوا بہت
مفید ہے۔

دولے شب کو رمی: بکری کی کھجی لے کر
اس کو چاقو سے گوہر کر اس پر فلفل دراز (پیل)
باریک پیس کر چھڑکیں۔ پھر اس کو ایک سیخ میں
پرو کر کوئلوں کی آگ پر سینکیں۔ سینکتے وقت جو
رطوبت اس ٹکڑے میں سے نکلے اس میں سلائی
تر کر کے آنکھوں میں لگائیں۔ یہ عمل پابندی سے
کچھ روز تک کرتے رہیں۔ اس سے فائدہ ہوگا۔
اگر کھجی کی بجائی بنا کر پیائیں یا اس کا قیمہ
کر کے پانی نکال کر پیاجائے تو بہت جلد فائدہ
ہو جاتا ہے۔

غذا: اس مرض میں گاجر، ٹماٹر، پالک،
انڈے اور درودھ مفید غذائیں ہیں۔

ڈھلکا

Epiphora

اگر آشوب چشم کی وجہ سے ہو تو آنکھوں میں

ناخونہ

Pterygium

اس کے علاج میں بعض اوقات خون کو صاف
کرنے والی دوائیں کھلائی جاتی ہیں۔ اس غرض
کے لیے

صبح: صافی پانی ملا کر پلائیں
۹ ملی لیٹر

اور آنکھوں میں

صبح وشام: شیاف اکیر چشم پانی کے چند قطرے
اعدد

میں گھس کر لگائیں۔

شک لاهوری لونگ سرہ کی مانند
۶ گرام اعدد

کھل کر کے رکھیں اور صبح وشام سلائی سے
آنکھیں لگایا کریں۔ مفید ہے۔

اگر ناخونہ بڑا ہو اور دواؤں سے کم نہ ہو تو کسی
ماہر امراض چشم سے اس کو صاف کرا دیں۔

رتوندا

Night—Blindness

یہ مرض متوازن غذا نہ کھانے اور بالخصوص ٹماٹر

قطر چشم ڈالیں۔ اگر نزلہ دزد کام بھی رہتا ہو تو
صبح و شام: جب نزلہ کھلائیں
۱-۱ عدد

اگر قبض ہو تو قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں
۱ عدد

اگر کمزوری دماغ کی وجہ سے آنکھوں سے پانی
آتا رہتا ہو تو

صبح و شام کو: دولے غذائی دودھ یا پانی کو کھلائیں
۱۲-۱۳ گرام

رات کو: سرمہ مطب سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔
دولے چشم: گل منڈی، ہیلہ میا، کشنیر خشک
۱۳۵ گرام ۶۰ گرام ۶۰ گرام

سفوف بنا کر رکھیں یا اس کو بطور حلہ تیار
کر لیں۔ صبح و شام یہ سفوف ۶ گرام اور اگر
حلہ تیار کیا جائے تو ۱۲ گرام کھلائیں۔ آنکھوں
سے پانی جانا، بار بار آنکھیں دھوئے رہنا وغیرہ
امراض چشم کے لیے نہایت مفید ہے۔

بامھنی

Blephritis

کھانے کے لیے

صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں۔
۱۰ ملی لٹر

غسول چشم: برگ نیم کو پانی میں جوش دے کر
چھان لیں اور اس سے آنکھوں کو دھوئیں، یا
تر پھلا ۱۲ گرام رات کو پانی یا عرق گلاب
میں بھگو دیں۔ صبح کو یہ پانی چھان کر اس سے آنکھوں
کو دھوئیں۔

برگ خرفہ ۶ گرام پس کر گھی میں ملا کر پوٹے
کے کناروں پر لگائیں، یا

مرہم کا فور پوٹے پر احتیاط سے لگائیں۔
دولے چشم (جو مرض دمعہ کے تحت
درج ہے) کا کھلانا بھی مفید ہے۔

گوبانجی (شعیرہ)

Stye

جب گوبانجی بار بار نکلتی ہو اور اس کے ساتھ
ہاضمہ بھی خراب ہو تو

صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں۔
۹ ملی لٹر

بعد غذا: قرص الکلی پانی سے کھلائیں
۱-۱ عدد

لیے بہت مفید ہے۔
پپوٹوں کو الٹ کر ان پر مصری کی ڈل
رگڑنا بھی فائدہ مند ہے۔

کان کے امراض

کان کا درد

Otalgia

اگر کان کا درد نزلہ و زکام کی وجہ سے ہو تو
صبح و شام: حب نزلہ پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

اگر قبض ہو تو
رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

تومی گلیسرین کان میں ڈالیں۔ یا
تلازم روغن گل میں ملا کر کان میں ڈالیں
۲ قطرے ۸ قطرے

یا پیاز کا پانی نکال کر ایک دو قطرے نیم گرم
کان میں پڑھائیں۔

اگر کان کے باہر کی طرف درد ہو تو
ضماد راحت لگائیں۔

گوہا بخنی پر مرہم کا نور لگائیں۔ اگر زیادہ
سخت ہو تو مرہم محلل یا ہمدرد مرہم لگائیں۔
ابتداء میں لونگ کو پانی میں گھس کر
لگا لینے سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح
چھوڑے کی گٹھلی پانی میں گھس کر لگانا بھی
مفید ہے۔

روپے (لکڑے)

Trachoma

صبح و شام: شیاف اکیر چشم پانی کے چند قطرے
۱-۱ عدد

میں گھس کر سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔
اگر اس کے ساتھ
صبح کو: صافی پانی میں ملا کر پلائیں تو جلدی آرام
۹ ملی لٹر
ہو جاتا ہے۔

دولے جست: جست پھونکے ہوئے کو
تھوڑے پانی میں گھول کر رکھ دیں۔ پانچ منٹ
بعد پانی کو نتھار کر الگ کر دیں۔ نیچے بیٹھے ہوئے
جست کو گرد و غبار سے بچا کر خشک کر لیں۔ رات
کو ایک چٹکی جست آنکھ میں ڈالا کریں۔ روہوں کے

اگر کان میں پھنسی ہو تو

لہسن اور اجوائن تلوں کے تیل میں

۳ گرام ۳ گرام ۴۸ ملی لیٹر

جلا کر صاف کر کے رکھیں اور یہ تیل

دو تین قطرے کان میں ڈالیں، یا

ٹومی گلیسرین کان میں ڈالیں۔

اگر کان میں زخم ہو تو برگ نیم کو پانی میں جوش

دے کر چھان کر اس میں شہد ملا کر پچکاری کریں

اور پھر کان کو خشک کر کے اس میں قلزم اور

ردغن گل ملا کر چند قطرے کان میں ڈالیں۔

درد کی شدت کی حالت میں

دولے اوجاع پانی سے کھلائیں۔

۱ گرام

اگر کان میں درد دائرہ دانت کی کسی خرابی سے

ہو تو اس کا مناسب علاج کریں۔

کان بہنا

Ototorrhea

غسول گوش : برگ نیم با دیان کیمہ سہاگہ

۱۲ گرام ۳ گرام ۳ گرام ۱ گرام

شہد خالص پانی میں جوش دے کر چھان کر

۲ گرام

اس پانی سے پچکاری کے ذریعے کان کو دھوئیں

پھر صاف روئی کسی سینک پر لپیٹ کر اس سے

کان کو صاف کریں۔ اس کے بعد

ٹومی گلیسرین کان میں ڈالیں، یا

نیلا تھوٹھا ردغن کبند آگ پر پکا کر

۱/۸ گرام ۱۲ ملی لیٹر

چھان لیں اور اس تیل کے دو قطرے کان

میں ڈالیں۔

اندر دینی طور پر

صبح کو: منڈرنا کھلائیں

۲ عدد

اگر قبض ہو تو

رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

اگر ہضم خراب ہو تو

بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں

۲ - ۲ عدد

نوٹ: یہ مرض اکثر ناک اور حلق کی بیماریوں

کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے علاج

کے وقت ان اعضا کا معائنہ ضرور کرنا چاہیے۔

کم شنائی دیتا ہو، ان سب حالتوں کے لیے یہ بہت مفید ہے۔

بہرا پن (ثقل سماعت)

Deafness

اگر کان میں میل جمع ہو تو اس کو صاف کرنے کے بعد روغن بادام تلخ چار پانچ قطرے کان میں ڈالیں۔

اگر میعاد بخاروں، چیچک اور موتی جھرہ وغیرہ کے بعد بہرا پن پیدا ہو جائے تو صبح کو: دولے غذائی دودھ سے کھلائیں ۱۲ گرام

شام کو: منڈوڑا کھلائیں ۲ عدد

اگر نزی رطوبات کی وجہ سے ہو تو رات کو: جوشینا گرم پانی میں ملا کر پلائیں۔ ۹ ملی لٹر

روغن سماعت کشا: سرسوں کا تیل ۱۲۵ ملی لٹر اس میں رتن جوت ۱۲ گرام ڈال کر یہاں تک پکایا جائے کہ رتن جوت جلنے کے قریب ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو آگ پر سے اتار کر چھان کریشی میں رکھیں اور دو تین قطرے کان میں ڈالا کریں۔ کان بہتا ہو، کان میں درد ہو،

کان کی پھنسیاں

Eczema of the Ear

صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں ۹ ملی لٹر

بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں ۱-۱ عدد

نیم کے پتوں کے جوشاندے سے کان کو دھو کر مرہم کافور لگائیں۔

اگر پھنسیاں کان کے اندر بھی ہوں تو

نومی گلیسرین کان میں ڈالیں، یا روغن کیلہ دد چار قطرے کان میں ڈالیں۔ اگر ان پھنسیوں میں خارش ہو، پانی نکلتا ہو تو مرہم خارش جدید لگائیں۔

کان کا درم

Otitis media

اگر قبض ہو تو

رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔ ۲ عدد

درم پر ضما دراحت لگائیں۔

اگر درد شدید ہو تو

دوائے اوجاع کھلائیں

۱ گرام

نومی گلیسرین کان میں ڈالیں، یا

قلزم اور روغن گل ملا کر چند قطرے

کان میں ڈالیں۔

ناک کے امراض

نکسیر

Epistaxis

قرص طابس پانی سے کھلائیں

۲ عدد

سر کے بال ترشوا کر اس پر ٹھنڈا پانی گرائیں تاکہ

نخک پانی میں پیس کر سر کے تالو اور پیشانی پر

سیپ کریں۔

سیال بندش خون میں روئی تر کر کے

نتھنوں میں رکھیں۔

اگر خون کی گرمی اور رقت کی وجہ سے بار بار

نکسیر پھوٹتی ہو تو

صبح کو: منڈوزا کھلائیں

۲ عدد

بعد غذا: عرق کافور تھوڑا پانی ملا کر پلائیں۔

۵-۵ قطرے

رات کو: قرص سیانی پانی سے کھلائیں

۱ عدد

ہلالیات: اگر تیز بخاروں اور دماغی بیماریوں

میں نکسیر آنے لگے تو اس کو فوراً بند کرنے کی

کوشش نہ کی جائے، کیوں کہ یہ ایک اچھی

علامت ہے۔

جب نکسیر جاری ہو تو مرین کو کام سے

چار پانی پر چت لیٹے رہنے کی ہدایت کریں اور

اس کی چار پانی کے پانٹی کی طرف اینٹ

لگا کر ادبجا کر دیں۔

ناک کی بدبو

Ozena

اگر نزلہ بگڑنے کی وجہ سے یہ شکایت ہو تو گرم

پانی میں نمک ملا کر اس سے ناک کو دھوئیں۔

اس کے بعد قلزم روغن گل ملا کر ایک

قطرے ناک میں ڈالیں۔

کے ذریعے قبض کو دور کریں، یا
قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں
۱ عدد

شام یا رات کو: اکسیر شفا پانی سے کھلائیں
۱ عدد

اگر ہاضمہ درست نہ ہو، پیٹ میں نفخ رہتا ہو
ریاح کی زیادہ پیدائش ہوتی ہو تو
بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں۔
۲-۲ عدد

اگر پیشاب میں شکر خارج ہوتی ہو، یا پیشاب میں
الیومن آہی ہو اور وجع المفاصل اور تقرص
کی بیماری بھی ساتھ ہو تو ان امراض کے لیے بھی
حسب موقع دوا کھلائی جائے۔
غذا اور سہ ماہیہ: اور اس مرض کی مفصل
کیفیت و ہدایت علیحدہ درج ہے وہاں ملاحظہ
کیجیے۔
خون کے دباؤ کی کمی (فشار الدم ضعیف)

Hypotension

صبح و شام کو: دولے غرنیزی پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

اگر داغی کام کرنے کے باعث قوت حافظہ کمزور

تلسی کے خشک پتے نو شادر کاغذ
۶ گرام ۳ گرام ۳ گرام

سب کو باریک پیس کر ہلاس کی مانند
سنگھائیں۔

اگر تشنگ کی وجہ سے یہ بیماری ہو تو
صبح کو: صافی پانی ملا کر پیلائیں
۹ لیٹر

رات کو: قرص مصفی جدید پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

ناک کے کیڑے

Vermis Nasi

برگ نیم کے جوشاندے میں تھوڑا سا
سہاگہ ڈال کر اس سے ناک کو اچھی طرح دھوئیں
پھر روغن کبیلہ چار قطرے ناک میں ڈالیں، یا
روغن تارپین ۲ قطرے ناک میں پٹکائیں۔

دوران خون کے اعضا کے امراض
خون کے دباؤ کی زیادتی (فشار الدم قوی)

Hypertension

اگر قبض اور پیٹ میں اچھارہ ہو تو اینما (حقنہ)

ہو تو

دوائے غذائی دودھ کے ساتھ کھلائیں۔

۱۲ گرام

اگر بدن میں سے خون نکل جانے کے سبب کمزری
اور نقاہت ہو گئی ہو تو

صبح کو: شربت منقش پانی میں ملا کر پلائیں
۵ ملی لٹر

بعد غذا: حب حدید پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

رات کو: قرص تخمیر کھلائیں
۲ عدد

اس مرض کی پوری تفصیلات علیحدہ صبح
ہیں وہاں ملاحظہ فرمائیے

دل کا درد (وجع القلب)

Angina Pectoris

اگر ہضم کی خرابی سے ہو تو

قرص محل آکھ کھلا کر اوپر سے قلم پانی
۲ عدد
۵ قطرے

میں ملا کر پلائیں، یا

برگ باور بنجورے ۱۲ گرام پانی میں جوش

دے کر چھان کر شہد خالص یا چینی سے
میٹھا کر کے پلائیں۔

درد کی جگہ صفا و راحت لگائیں۔

ہیرا ہینگ موزر منقش میں رکھ کر کھلانا
۱/۲ گرام

بھی مفید ہے۔

اگر ڈکاریں ترش آتی ہوں، معدے میں
ترش کی زیادتی ہو تو

بعد غذا: قرص اسکی کھلائیں
۱-۱ عدد

ہدایات: اس کے مریض سادہ زندگی بسر
کریں۔ موٹر چلانے یا انجن ڈرائیوری کا پیشہ
نہ اختیار کریں۔ کھانے پینے میں اعتدال کو ملحوظ
رکھیں اور کھانا کھانے کے بعد ہی کوئی دماغی
وجہانی کام نہ کریں۔ اس سے دور رہ سکتا ہے۔
دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد سونا یا لیٹ جانا
چاہیے۔ سردی سے بھی محفوظ رہنا چاہیے۔ تباکو
چائے اور شراب نوشی سے پرہیز واجب ہے۔

صبح کو: دوائے غذائی دودھ سے کھلائیں
۱۲ گرام

بعد غذا: حسب حلیہ کھلائیں
۱-۱ عدد

ہدایات: دل کی بیماری والوں کے لیے
زیادہ بلند مقام اور زیادہ گرم میدان میں رہنا
مضر ہے۔ دریاؤں اور باغوں کی سیر کرنا مفید ہے۔
صبح کو سبز میدان میں چہل قدمی کرنا فائدہ مند ہے۔

پھیپھڑوں کے امراض

پھیپھڑوں کا دم (ذات الریہ)

Pneumonia

اگر قبض ہوا اور بخار شدید ہو تو اس حالت میں
ایسا (حقنہ) کے ذریعے قبض دور کریں۔ اگر بخار
شدید نہ ہو اور قبض بھی شدید نہ ہو تو
قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں، یا
۲ عدد

اس کے ساتھ جوشینا نیم گرم پانی میں ملا کر
۱۰ گرام

پلائیں۔

دل کی دھڑکن (اختلاج قلب و خفقان) Palpitation

اگر مضم خراب ہو، قبض رہتا ہو، پیٹ میں اچھا
ہو تو
صبح کو: شربت منعش پانی میں ملا کر پلائیں۔
۵ ملی لٹر

بعد غذا: قرص الکلی پانی سے کھلائیں
۱-۱ عدد

رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں
۱ عدد

شیرہ بادیان: بادیان کشنیز شک کشنر بنر
۵ گرام ۳ گرام ۱۱ عدد
پانی میں پیس کر چھان کر صینی سے میٹھا کر کو پلائیں۔
اگر سردی کا موسم ہو تو یہی دوا گرم پانی میں بھگو کر
چھان کر پلائیں اور

بعد غذا: سیال خیریں پانی میں ملا کر پلائیں
۵-۵ قطرے

اگر کئی خون اور کمزوری اعصاب کی وجہ
سے ہو تو

شدید درد کی حالت میں

دوائے اوجاع دودھ یا چائے سے کھلائیں۔
اگر گرم

اور مقام درد پر ہمدرد بام کی مالش کریں۔

مالش: روغن تاربین اور روغن کجد ملا کر مالش
۱۲ ملی لیٹر ۳۶ ملی لیٹر

کریں، بہت مفید ہے۔

صبح کو: قرص بخالہ کھلائیں
اعداد

کھانسی کی صورت میں سعالین چوسیں، یا
سعالین گرم پانی میں گھول کر پلائیں، یا
۴ عدد

صدوروی چٹائیں۔
۱۰ ملی لیٹر

قرص بادام منہ میں ڈال کر چوستے رہیں۔
غذا: ابتدا میں چار دن تک اگر کوئی غذا نہ دی
جائے تو اچھا ہے۔ اس کے بعد مکی اور مرقوی غذا
مثلاً بکری کے گوشت کا شعدیہ یا بخینی پلائیں۔
آتش جو یا ساگودانہ کھلائیں۔ سرد پانی تھنی پلائیں
بلکہ پانی کو جوش دے کر رکھ لیں اور پیاس کے
وقت ہی پانی پلائیں۔

ہدایات: مریض کو افیون، بھنگ اور چرس
وغیرہ کوئی نشہ آور چیز یا ان کا کوئی مرکب نہ دیا
جائے۔ مریض کو آرام سے بستر پر لیٹے رہنے کی
تاکید کریں۔ سردی سے بھی محفوظ رکھیں، گر کر
میں ہوا ضرور آنی چاہیے۔

کھانسی (سعال)

Cough

اگر نزلہ کی وجہ سے شدید کھانسی ہو تو
صبح شب کو سعالین گرم پانی میں گھول کر پلائیں۔
۴-۴ عدد

قرص بادام منہ میں ڈال کر چوستے رہیں۔
۱ عدد

اگر کھانسی پرانی ہو، بلغم بہت خارج ہوتا ہو تو
صدوروی چٹائیں
۹ ملی لیٹر

اگر ہاضمہ درست نہ ہو، بھوک نہ لگتی ہو، قبض
بھی رہتا ہو تو
بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں۔
۲-۲ عدد

رات کو: قرص طین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

اگر کھانسی کے ساتھ خون آنے لگے تو

قرص حالبس پانی سے کھلائیں۔

اعدد

جب خون بند ہو جائے تو پھر کچھ دنوں تک

منڈوزا کھلائیں

اعدد ۲

اگر تشنہ کھانسی ہو تو

صبح، دوپہر اور شب کو: حب شہیقہ کھلائیں

۱-۱-۱ اعدد

(دمہ) ضیق النفس

Asthma

اگر قبض ہو تو سب سے پہلے قبض کو دور کرنے کے لیے

قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں

اعدد ۲

اگر اس کے ساتھ

تخم اسی نیم کوفتہ کو پاؤ بھریانی میں جوش ۱۲ گرام

دے کر اندھ جان کر شہد خالص سے میٹھا

۲۵ گرام

کے پلائیں تو بہت فائدہ مند ہے۔

رات کو: شربت ربوی گرم پانی میں ملا کر پلائیں۔

۵ ملی لیٹر

دورے کے وقت بھی شربت ربوی

چٹائیں، یا گرم پانی ملا کر پلائیں اور

ہمدوبام کی سینہ پر مالش کریں۔

جب دورہ بند ہو جائے تو پھر

صبح و شام: صدوری چٹائیں

۹-۹ ملی لیٹر

اگر ہضم خراب ہو، بھوک نہ لگتی ہو تو

بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں

۲-۲ اعدد

برگ بانہ پانی میں جوش دے کر چھان کر

۷ اعدد

شہد خالص ملا کر پلائیں۔

ھڈا دیات: دمہ کا دورہ عموماً سردی لگنے،

یا قبض کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ ان دونوں

باتوں کی طرف خاص توجہ رکھنی چاہیے۔ غذا کی

کم مقدار اور شام کو جلدی کھالیا کریں اور غذا

کھانے کے تین گھنٹے بعد سوئیں۔ اگر کسی خاص

پیشہ یا غذا سے اس مرض کا تعلق ظاہر ہو تو

اس کو ترک کر دیں۔ دم کے مریض کو غذا کی بہت خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون سی غذا اس کو موافق ہے اور کس غذا سے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طرح جہاں کی آب و ہوا اس کو موافق ہو وہاں رہنا اختیار کرے۔ جب ایام حمل میں مریض ہو جاتا ہے تو وضع حمل کے بعد ہی تمام ہوتا ہے۔

خون تھوکانا (نفث الدم)

Hemoptysis

شدت کی حالت میں

صبح و شام کو: قرص سیانی یا قرص حابس پانی

۱-۱ عدد ۱-۱ عدد

سے کھلائیں۔ اگر اس کے ساتھ برگ اندہ ۱۲ گرام

(بالسم) پانی میں پیس چھان کر شہد خاص ۲۵ گرام

سے میٹھا کر کے پلایا جائے تو بہت نفع بخش ہے۔

اگر اس کے ساتھ خشک کھانسی ہو تو

رات کو: سعالین گرم پانی میں گھول کر پلائیں۔ ۴ عدد

جب خون بند ہو جائے تو تقویت کے لیے صبح کو: منڈوڑا کھلائیں ۲ عدد

بعد غذا: عرق کافور پانی یا جینی میں ملا کر کھلائیں۔ ۵-۵ قطرے

اگر کھانسی شدید ہو، بلغم بہت آتا ہو، اس میں بدبو ہو تو

رات کو: صدوری چٹائیں۔ ۹ لیٹر

شربت گولر: کچے گولر ۲۵۰ گرام لے کر ڈھان کھوپانی میں جوش دیں، جب گولر مٹی جائیں اور پانی چھٹا حقہ رہ جائے تو آگ پر سے اتار کر گولروں کو مل کر چھان لیں اور اس پانی میں ۵۰۰ گرام جینی ملا کر شربت تیار کر لیں۔ یہ شربت روزانہ ۲۵ لیٹر چاٹ یا جائے۔ خواہ کورونے کے لیے مفید ہے۔

خون آنے کی حالت میں

گیرو، سیل کھڑی ایک ایک گرام ہر ایک پیس کر شربت گولر میں ملا کر چٹانا بہت نفع بخش ہے۔

ہلا یات: خون آنے کی حالت میں چوبیس

گھنٹے تک کوئی ٹھوس غذا نہ دی جائے مریض کو
بستر پر آرام سے بٹائے رکھیں اور بھوک کی حالت
میں کوئی سیال غذا دیں، مثلاً آتش جو، ساگودانہ،
دلیہ یا صرف دودھ جوش دے کر ٹھنڈا کیا ہوا
پلا یا جائے۔ غم و غمہ، سخت حرکات، زیادہ
چلنے پھرنے، شراب، تباکو اور چلہ سے پرہیز
کرایا جائے۔

گروہ اور مشانہ کے امراض

دردِ گروہ (وجع الکلیہ)

Renal Colic

اگر دردِ ریاح کی وجہ سے ہو تو
قرص الکل کھلا کر اوپر سے قلم پانی
۲ عدد ۵ قطرے

میں ملا کر پلائیں۔

اگر قبض ہوا دسے دستی بھی ہو تو درد کو سکون
ہونے کے بعد

قرص ملین کے ہمراہ شربت تر ہندی
۳ عدد ۱۸ ملی لٹر

گرم پانی میں ملا کر پلائیں۔

درد کی جگہ ضما د راحت لگائیں، یا
کافور، سرکہ، یا شراب میں حل کر کے
۲۵ ملی لٹر

درد کی جگہ مالش کریں، یا

ضماد: سرخ مرچ پانی میں پیس کر گردوں پر
ضما کریں اور ایک دمنٹ میں اس کو دھک
صاف کر دیں مگر اس جگہ جلن ہو تو گھی لگا دیں۔

اس سے بعض اوقات حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔
اگر پیشاب بھی بند ہو تو گرم پانی بوتلی میں
بھر کر اس سے گردوں کی جگہ سینس کریں اور
سفوف شورو قلمی سوڈا واٹر سے کھلائیں
۳ گرام ۲۵ گرام

یا لمبی کے بچے پر جو بال ہوتے ہیں وہ
۲۵ گرام لے کر پانی میں جوش دے کر
پلائیں۔ اس سے پیشاب آنے لگتا ہے۔

گروہ و مشانہ کی پتھری

Renal Calculus

اگر پتھری کی وجہ سے دردِ گروہ ہو تو حسب
موقع و ضرورت دہی علاج کیا جائے (جو درد
گروہ میں بیان کیا گیا۔ مریض کو گرم پانی کے ٹب

اگر قبض ہو تو اسی وقت ایسا (حقہ) کرائیں:
قرص ملین کھلا کر گرم پانی پلائیں۔

۳ عدد

ہڈیا ت: یہ معلوم کرنے کے لیے کہ پتھری کس
قسم کے مادے سے ہے، تاکہ غذا اور پریز
باقاعدگی کے ساتھ بتایا جاسکے، پیشاب کا
امتحان کرنا بہت ضروری ہے۔

یورک ایسڈ کی پتھری بھوری سُرخ مائل
ہوتی ہے اور یہ گوشت غذا ششام کے گردہ و
شانہ میں بنتی ہے۔ اس کے مریض کو نباتی غذا
اور نیکیں مسہلات دیے جاسکتے ہیں، مگر شراب
اور کباب اور گوشت سے قلعی پرہیز کرنا چاہیے۔
آکسے لیٹ آف لائم (Oxalate of lime)
کی پتھری سیاہ، سخت اور کھردری ہوتی ہے۔
یہ سبزی خورد لوگوں میں بنا کرتی ہے۔ اس کے
مریض کو پالک، ٹماٹر، گاجر، شلجم، پیاز، انجیر،
سیب، کھجور اور شراب سے پرہیز کرایا جائے۔
اور بہ طور غذا بھیڑ، بکری اور پرندوں کا گوشت
مٹر، لوبیا، مکھن، دال، چاول، انگور، اُرداؤ
اندھے کھانے کی اجازت دی جائے۔ فوسفیٹ
(Phosphate) کی پتھری نمد اور سفید رنگ

میں بٹھائیں اور تاکید کریں کہ اس میں پیشاب
کرنے کی کوشش کریں۔ اگر گل ٹیسو، نمک طعام
اور سبوس گندم پانی میں جوش دے کر اس میں
مریض کو بٹھایا جائے تو بہت مفید ہے۔ اس
کے بعد پتھری کے اخراج کے لیے مندرجہ ذیل
دوائیں کچھ روز تک پابندی سے پلائیں۔ ان
سے اکثر اوقات پتھری خارج ہو جاتی ہے۔
برگ چولائی ۶۰ گرام کو تین پیسے کاٹ کر
پانی میں جوش دے کر چھان کر پلائیں اور اسی
کاساگ پکا کر کھلایا جائے۔

دیگر: آپ برگ ترب سبز مرق ۶۰ ملی لیٹر
میں جوا کھار ۶ گرام ملا کر صبح و شام پلانا
بھی پتھری کو خارج کرتا ہے۔
بعد غذا: قرص الکل پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

اگر قبض رہتا ہو تو
ات کو، قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔

۲ عدد

اگر درد بہت شدید ہو، اس کے ساتھ تے اور
متلی بھی ہو، مگر قبض نہ ہو تو
حب حابس تے پانی سے کھلائیں۔

۲ عدد

کی ہوتی ہے اور پیشاب کی کیفیت کھاری ہوتی ہے۔ اس میں بہ طور غذا گوشت، آلو امد وال چپاتی کھلائیں، مگر انڈا، پنیر، مچھلی، دودھ پھل اور سبز ترکاریاں بند کر دی جائیں۔

نوٹ: مذکورہ بالا ماقے جب تک متفرق نذات کی صورت میں رہتے ہیں تو ان کو ریگڑہ کہتے ہیں اور جب یہ ذرات ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو پتھری بن جاتی ہے۔

اگر ایکسے سے یہ ثابت ہو جائے کہ پتھری بڑی ہے تو مرین کو آپریشن کا مشورہ دیا جائے۔

پیشاب کی بندش (احتباس البول)

Retention of the Urine

سفوف شورہ قلمی دودھ کی لسی یا سوڈا
۳ گرام

ناٹر کے ساتھ کھلائیں۔

اگر اس کے ساتھ

مکئی کے جھٹے پر جربال ہوتے ہیں ۲۵ گرام
لے کر پانی میں جوش دے کر پلا یا جائے تو
بہت جلد آرام ہو جاتا ہے۔

اگر پیشاب جلن سے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہو تو اسی

دوا کے ساتھ

بعد غذا: قرص الکل پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

روغن بیدانجیر (کیسٹر آئل) دودھ میں

۲۵ ملی لٹر

طا کر پلائیں۔ اس سے اجابت بھی ہو جائیگی
اور پیشاب بھی آجائے گا۔

اگر غدہ قدامیہ (Prostate gland)

کے بڑھ جانے یا متورم ہونے کی وجہ سے پیشاب

بند ہو جائے تو اس صورت میں پیشاب لانے

والی دواؤں کا کثرت استعمال نقصان پہنچاتا ہے۔

ایسے مریض کو نیم گرم پانی میں بٹھانا مفید ہے۔

اگر مریض کو پہلے سوزاک ہو چکا ہے (اعلا س) کی

وجہ سے درم غدہ قدامیہ ہے تو

صحیح کو: صافی پانی طا کر پلائیں

۹ ملی لٹر

بعد غذا: قرص الکل کھلائیں

۱-۱ عدد

مات کو: قرص مصفی جدید پانی سے کھلائیں

۱ عدد

ھلا جات: شدید تکلیف کی صورت میں

سلائی (Catheter) کے ذریعہ پیشاب
نکھوانا چاہیے۔ کیتھی ٹر کو پانی میں اُبال لیں،
جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو تیل لگا کر
مجری بول میں نرمی سے آہستہ آہستہ داخل
کیا جائے۔

اگر غرہ قدامیہ زیادہ متورم ہو یا اس
میں پیپ پڑ گئی ہو تو اس کا آپریشن کرنا مناسب
ہے۔

نوٹ: اگر گردے پیشاب بنانا بند کر دیں تو
اس حالت میں چوں کہ مثانہ پیشاب سے خالی
ہوتا ہے، اس لیے کیتھی ٹر کے ذریعہ بھی پیشاب
نہیں آتا ہے۔ اس وقت مریض کو کمر تک گرم
پانی میں بٹھانا، یا گردوں کو گرم پانی میں کپڑا
بھگو کر سینکنا مفید ہو سکتا ہے۔

غذائیں دودھ سوڈا پلائیں، آتش جو
پلائیں، دودھ چاول اور کچھڑی وغیرہ دیں۔

پیشاب کی جلن

Irritability of the Urine

صبح کو: سفوف شہدہ قلمی سوڈا داڑ یا دودھ
۳ گرام

کی لسی کے ساتھ کھلائیں۔
بعد غذا: قرص الکل پانی سے کھلائیں
۱-۱ عدد

پانی کی بجائے دن میں کئی مرتبہ دودھ کی
لسی کھانڈ سے میٹھی کر کے پلائیں۔
کیلے کے تنے کا پانی نکال کر پیسے سے بھی
پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔

پیشاب کی زیادتی

Polyuria

اگر ضعف، مثانہ و اعصاب کی وجہ سے ہو تو
صبح و شام: قرص ماسک البول جدید پانی یا
۱-۱ عدد

دودھ سے کھلائیں۔
اگر بڑھاپے میں پیشاب کی کثرت ہو تو
صبح کو: قرص دیا سیس خاص پانی سے کھلائیں
۱ عدد

بعد غذا: قرص بلادر پانی سے کھلائیں
۱-۱ عدد

جاسن کی گٹھلی کو باریک میں کر صبح و شام
۱-۱ گرام

کھلانا بھی مفید ہے۔
خون بھان (کلیجن) کو بائیک پیس کر دینا
۳ گرام

پانی سے کھلانا بھی فائدہ کرتا ہے۔

خونی پیشاب (بول لٹم)

Hematuria

صبح و شام : قرص مابس پانی سے کھلائیں۔ اگر
۱-۱ عدد

اس کے ساتھ برادہ عندل سفید پانی میں
۶ گرام

دو گھنٹے بعد چھان کر پلائیں تو بہت مفید ہے۔
بعد غذا : عرق کا فور پانی میں ملا کر پلائیں۔
۵-۵ قطرے

سفید دوب گھاس مرچ سفید پانی
۱۲ گرام ۷ عدد

میں پیس چھان کر پلائیں بہت فائدہ مند
ہے۔

رات کو : قرص یمانی ہمراہ آب کھلائیں۔
۱ عدد

ہڈی بات : جب کسی شخص کے پیشاب میں

خون آئے تو اس کو آرام سے بستر پر بٹادیں اور
سبب مرض کی تحقیق کر کے علاج شروع کریں۔
جب سردی لگنے یا خونی حیض یا بھاسیری خونی
کی بندش کی وجہ سے بغیر درد خونی پیشاب آئے
تو دو تین گھنٹوں میں یہ خود بہ خود درست
ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے
کہ نشانہ کی رسولی کی وجہ سے بول خونی پیشاب
بغیر درد کے آیا کرتا ہے۔

تشخیصی نکتہ : جب پیشاب میں خون یا
پیپ آئے تو مریض کو ہدایت کریں کہ وہ ایک
وقت میں پیشاب دو برتنوں میں علیحدہ علیحدہ
کرے۔ اگر خون یا پیپ پیشاب کے پہلے
حصے میں آئے اور قطرہ قطرہ ٹپکتا ہو تو یہ نازہ
میں نقص ہونے کی علامت ہے، جیسک سوزاک
میں عموماً ہوتا ہے۔ اگر پچھلے حصے میں مواد یا خون
آئے تو یہ نشانہ میں پتھری ہونے کی نشانی ہے
یا اس بات کی علامت ہے کہ سوزاک کی وجہ سے
نازہ کا درم غلہ قدامیہ یا نشانہ نکلتا ہو گیا ہو۔
اگر خون یا پیپ پیشاب کے دونوں حصوں میں
آئے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گردہ ماؤف ہے۔
جب گردہ سے خون آتا ہے تو پیشاب میں ملاحز

چھان کر مینی ۱۲ گرام سے بیٹھا کر کے پلائیں۔

کیلوسی پیشاب (بول کیلوسی)

Phosphaturia

صبح کو: سفوف شورہ قلمی پانی سے کھلائیں۔

۳ گرام

بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں

۱-۱ عدد

رات کو: عرق گھیکو اور خام پانی میں ملا کر پلائیں۔

۹ ملی لٹر

ہدایات: اس کے علاج میں معدہ دہنم اور
جگر کی اصلاح و تقویت کی جائے۔

نلالی پیشاب (بول زلالی)

Albuminuria

صبح کو: زیرہ سفید کمونک پانی میں جو خش

۶ گرام ہگلام

وے کر چھان کر پلائیں

بعد غذا: عرق گھیکو اور خام پانی میں ملا کر پلائیں۔

۹-۹ ملی لٹر

اگر خون کی کمی اندام جسمانی کمزوری ہو تو

ہوتا ہے۔ اس میں پیپ اور تلچھٹ کی آمیزش

نہیں ہوتی اور اس کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے

لیکن جب گردہ میں زخم ہو تو پیشاب میں پیپ

اور چھلکے (قشور) (Cast) بھی خارج

ہوتے ہیں اور گردوں کے مقام پر درد ہوتا ہے۔

پیشاب کا قطرہ قطرہ آنا

(تقطیر البول)

Strangury

اگر قبض شدید ہو تو پہلے

ردن، سیدانجیر (کیٹر آئل)، ۲۵ ملی لٹر

(دوتولے) دودھ میں ملا کر پلائیں یا

قرص ملین گرم پانی کے ساتھ کھلائیں پھر

۳ عدد

صبح کو: سفوف شورہ قلمی پانی یا دودھ کی لسی

۳ گرام

کے ساتھ پلائیں۔

اگر مشانہ کی کمزوری سے ہو تو

بعد غذا: قرص بلا در پانی سے کھلائیں

۱-۱ عدد

کیے کے تنے کا پانی ۶۰ ملی لٹر نکال کر

بعد غذا: قرص انکلی پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

مشانہ کا درد (بجع المشانہ)

Vesical Spasm

اگر قبض ہو تو بہتر یہ ہے کہ ایسا (حقنہ) کے ذریعے
قبض دور کیا جائے، ورنہ
روغن بیدانجیر (کیشٹر ایل) دودھ میں ملا کر
۲۵ ملی لیٹر (۲ قہے)

پلائیں۔ اگر کثرتِ ریح کی وجہ سے درد ہو تو
قرص طین گرم پانی سے کھلائیں۔ اگر پانی
۳ عدد

کی بجائے بادیاں زنجبیل نیم کو فٹہ پانی
۱۲ گرام ۳ گرام

میں جوش دے کر چھان کر سوڈا خوردنی
ایک گرام اس میں ملا کر پلایا جائے تو زیادہ
اچھا ہے۔ قبض دور ہونے کے بعد
قرص گل آکھ کھلا کر قلمز پانی میں ملا کر
۲ عدد ۵ قطرے

پلائیں

آبزن: گل ٹیسو، سبوس گندم، نمک طعام

بعد غذا: عرق فولا و خام پانی میں ملا کر پلائیں۔
۹-۹ ملی لیٹر

اگر یہ مرض گردوں کی ساخت میں خرابی ہونے
کی وجہ سے ہو تو اس کی تشخیص کر کے علاج کیا
جائے۔

غذا پر ہنیر، دودھ، آتش جو، پھلچھ، دہی،
ساگودانہ اور مونگ کی دال کا پانی پلائیں۔ اگر
درد کی شکایت ہو، نمک بند کر دیں۔ چاول اور
گوشت سے پرہیز کریں۔

پیشاب کا بے ارادہ نکلنا (سلسل البول)

Incontinence of Urine

اگر استر فار مشانہ کی وجہ سے ہو تو۔
بعد غذا: قرص بلاند پانی سے کھلائیں
۱-۱ عدد

اگر ضعفِ مشانہ کی وجہ سے ہو تو
صبح و شام کو: قرص ماسک ابول جدید پانی
۱-۱ عدد

سے کھلائیں۔

اگر پیشاب میں تیزابیت ہو تو

بقدر ضرورت لے کر پانی میں جوش دے کر اس کو ٹب میں ڈال کر دس پندرہ منٹ اس میں لیٹ کر کوٹھائیں، پھر جسم کو خشک کر کے صاف و راحت پیڑ پر لگائیں۔
اگر ٹب کا انتظام نہ ہو سکے تو گرم پانی بوتل میں بھر کر اس سے پیڑ کی سینک کریں۔

جلد کے امراض خارش

Scabies

صبح کو: صاف پانی ملا کر پلائیں۔
۹ ملی لیٹر

بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں
۱-۱ عدد

مرہم خارش جدید مقام مائوف پر لگائیں۔
اگر خارش رات کو زیادہ ہوتی ہو تو
صبح کو: ٹنگہ باری ملت کو گرم پانی میں بھگو کر
۱۲ گرام

صبح اس کا پانی تنہا کر کپڑے میں بچان کر پلائیں۔

رات کو: سیال مسکن پانی میں ملا کر پلائیں۔
۵ قطرے

اگر اس کے ساتھ صبح کو آب برگ شاہترہ بنر پلا یا جائے تب بھی جلدی فائدہ ہوتا ہے۔
ترکیب آب برگ شاہترہ سبز: ہرے شاہترہ کو کوٹ کر پانی پھڑپھڑیں اور اس کو کپڑے میں چھان کر یہ پانی ۱۲۰ ملی لیٹر لے کر اس میں شہد خالص ملا کر پلائیں۔

اگر خارش خشک ہو تو
صبح کو: صاف بکری کے دودھ میں ملا کر پلائیں
۹ ملی لیٹر

اور دوائے خارش سفید روغن کبیلہ یا
۱۲ گرام ۳۶ ملی لیٹر
روغن سرسوں میں ملا کر لگائیں، یا حسب
ذیل دوا کی مالش کریں۔

دوائے خارش: تخم خشاش سفید پانی میں
۲۵ گرام

پیس لیں، پھر اس میں آب بیوں کاغذی روغن چلی
۲ عدد ۱۲ ملی لیٹر

ملا کر مالش کریں۔

داد

Ring Worm

صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں۔

۹ ملی لٹر

بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

حب داد خاص آب لیوں کاغذی، یا

پانی میں گھس کر لگائیں، یا

سہاگہ آب لیوں میں پس کر داد کو کھجا کر

لگائیں۔

اگر داد جسم کے اکثر حصوں پر ہو تو

صبح کو: صافی مانی ملا کر پلائیں۔

۹ ملی لٹر

بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں

۱-۱ عدد

رات کو: قرص مصفی جدید پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

مرہم خارش جدید مقام ماؤف پر لگائیں یا

دوائے خارش سفید مرہم کافور ملا کر

۳۶ گرام

۱۲ گرام

لگائیں اور

تخم پنواڑ کوٹ کر دہی میں بھگو کر رکھیں

۲۵ گرام ۱۲۰ ملی لٹر

ادر تین روزہ کے بعد داد پر اس کا پیپ کریں

داد کے لیے مفید ہے۔

اگر صبح کو زلال نگندہ با بری پلایا جائے تو

بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے۔

زالال نگندہ با بری: نگندہ با بری (ایک تولی

۱۰ گرام

مرح سیاہ سات عدد نیم کو فترت کو گرم

پانی میں بھگو کر رکھیں۔ صبح کو اس کا پانی

کپڑے میں چھان کر شہد خاص یا چینی سے

میٹھا کر کے پلائیں اور

مرہم ابیض داد پر لگائیں۔

گنج (سعد)

Favus

صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں

۹ ملی لٹر

بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں

۱-۱ عدد

رات کو: قرص مصفی جدید پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

روغن کیدہ سر پر لگائیں یا

آم کے آچار کا تیل جو ایک سال پڑانا ہو
سر پر لگائیں۔ جس گج میں سر پر پھنسیاں ہوں
ادمان سے پانی بہتا ہو، اس کے لیے
یہ تیل بہت مفید ہے۔

روغن کنیر: کنیر کے پتے سرسوں کے تیل
۹۰ گرام ۲۵۰ ملی لیٹر

میں جلائیں پھر تیل کو صاف کر کے رکھیں اور
اس کو سر پر مالش کریں گج کے لیے مفید ہے۔

پھلجھری (برص)

Leucoderma

صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں۔
۹ ملی لیٹر

رات کو: قرص مصنوعی جدید پانی سے کھلائیں
۱ عدد

مرہم برص جدید داغوں پر لگائیں۔
تشخیصی نکتہ: سفید داغوں والی جلد کو
چٹکی سے پکڑ کر اوپر اٹھا کر گوشت سے علیحدہ
کر کے موٹی چھو کر دیکھیں۔ اگر اس میں سے خون
نکے تو یہ قابل علاج ہے اور اگر پانی جیسی رطوبت

نکے تو علاج مشکل ہے۔

دولتے باجی: اس مرض کے لیے ابتدا
میں باجی نہایت مفید دوا ہے۔ اس کی ترکیب
یہ ہے کہ باجی حسب ضرورت نے گرنے پھینکے
پیشاب یا ادراک کے پانی میں کم از کم تین روز
تک بھگوئیں اور یہ پیشاب یا ادراک کا پانی
روزانہ تبدیل کرتے رہیں۔ تین روز بعد باجی کو
ہاتھ سے مل کر اس کا چھلکا اتار دیں اور اس کو
خشک کر کے سفوف بنالیں۔ روزانہ یہ سفوف
ایک گرام تازہ پانی سے پھانک لیا کریں اور
اسی کو پانی میں پیس کر۔ اعنوں پر پیپ کریں۔
اس کو چالیس روز تک کھاتے رہیں۔

پچھیمپ اور جھائیاں

Pityriasis, Chloasma

اگر فسادِ خون یا آتشک کے سبب سے ہو،
معدہ و جگر کا فعل خراب ہو تو
صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں۔
۹ ملی لیٹر

بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

معدل سفید پانی میں گھس کر لگانے سے بھی
گرمی دانوں کی جلن وغیرہ دور ہو جاتی ہے

مہاسے

Acne

اگر خون اور ہاضمہ خراب ہو تو
صبح کو: صافی پانی میں ملا کر پلائیں۔
۹ لیٹر

بعد غذا: قرص الکل پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

اگر عورتوں میں آیام خراب ہوں تو ان کا علاج کریں۔
مرہم ابیض مہاسوں پر رات کو لگائیں۔
دولے مہاسہ: سرس کی چھال، نیم کی چھال
اور ہلدی ہم وزن لے کر پانی میں پیس کر چہرے
پر لگایا کریں۔

تخم خرفہ کو دودھ میں پیس کر چہرے پر لگاؤ
سے بھی مہاسے دور ہو جاتے ہیں۔

بجھاجن (جمرہ)

Eczema

صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں
۹ لیٹر

مرہم ابیض نشانوں پر لگائیں۔ اگر اس
سے فائدہ نہ ہو تو

مرہم برص جدید لگائیں۔

دولے بہق: گندک آملہ سار اور گولہ برابر
وزن لے کر بکری کے دودھ میں پیس کر لگائیں۔

گرمی دانے

Prickly Heat

معدنی حالات میں ملتان مٹی، ریشہ خطمی کے
عاب یا پانی میں گھول کر دانوں پر لگائیں
اور پینے کے لیے

عاب ۷ دانے پانی میں پیس چھان کر
چینی سے میٹھا کر کے صبح و شام پلائیں۔
اگر گرمی دانے بہت شدید ہوں اور ان میں
جلن اور جھین زیادہ ہو تو

صبح کو: صافی پانی میں ملا کر پلائیں۔
۹ لیٹر

مرہم کافور دانوں پر لگائیں یا
جست شگفتہ چھان کر روغن گل اور
۱۲ گرام ۱۰ لیٹر

ترق گلاب میں ملا کر لگائیں۔
۳۵ لیٹر

بعد غذا: قرص گزنہ پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

مرہم خارش جدید یا مرہم ابیض لگائیں۔
اگر خارش اور جلن شدید ہو تو

بیج کو: زلالی نلگند بابری پلائیں (اس کی ترکیب
داد کے علاج میں ملاحظہ کیجیے)۔

رات کو: سیال مسکن پانی ملا کر پلائیں اور
قطرے

درائے خارش سفید مرہم کا فوہ ملا کر لگائیں۔
۳ گرام ۱۰ گرام

احتیاط: مقام ماؤف کو صابن اور پانی
سے ہرگز نہ دھوئیں، بلکہ پہلے تلوں کا تیل لگا کر
کھڑنڈ نرم کر کے اتاریں اور پھر مرہم لگائیں۔

تشخیصی نکتہ: یہ مرض شدید اور مزمن
دو قسم کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات نہایت پریشان

کُن اور دیر سے علاج پذیر ہوتا ہے۔ ہاضمہ کی خرابی
جسمانی کمزوری، درم گزردہ، زیاسیطس، نفرس

اور وجع المفاصل وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔
اگر نفرس، ایل بیومی فوریا اور زیاسیطس

کے ساتھ یہ مرض ہو تو زیادہ پھیلتا ہے اور لگنے
کی دوا سے نائدہ نہیں ہوتا، اس لیے مریض کے

پیشاب کا امتحان ضرور کرنا چاہیے تاکہ اصل
سبب معلوم ہو جائے۔

پتی اُچھلنا، چھپاکی

Urticaria

اگر بعضی کی وجہ سے پتی نکل آئے تو گرم پانی میں
نمک ملا کر پلائیں اور انگلی ڈال کرتے کرادیں اور
بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

رات کو: اکیس شفا پانی سے کھلائیں
۱ عدد

اگر کھجلی اور جلن بہت زیادہ ہو تو
دوائے مالش: ردغن گل، عرق گلاب، سرکہ خالص
۳۰ ملی لیٹر ۴۰ ملی لیٹر ۲۰ ملی لیٹر

ملا کر لگائیں یا

گیرو اہد پھٹکری برابر وزن لے کر باریک
پیس کر جسم پر ملیں۔

اگر اس طریقے سے فائدہ نہ ہو تو حسب ذیل دوائے
ناگ کیسہ کھلائیں۔ بعض اوقات اس سو حیرت انگیز
فائدہ ہوتا ہے۔

صبح و شام: ناگ کیسہ پیس کر شہد خالص ملا کر
۴۰ گرام ۲۰ ملی لیٹر

کھلائیں۔

میں یہ دوائیں ترک کرادیں۔

اگر مرض بہت پُرانا ہو تو

صبح کو: قرص ملین کھلا کر اوپر سے پودرینہ خشک

۲ عدد ۶ گرام

شکر سرخ پانی میں جوش دے کر چھان کر

۲۴ گرام

پلائیں تین روز تک یہ نسخہ پلا کر پھر

صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں۔

۹ لیٹر

بعد غذا: قرص الکلی پانی سے کھلائیں

۱-۱ عدد

رات کو: اکسیر شفا پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

تشخیصی نکات: پتی نکلنے کا سبب عام

طو پر معدہ اور قوت ہاضمہ کی خرابی ہوا کرتا ہے

اس لیے اس کے علاج میں معدہ اور ہاضمہ کی

درستی کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ بچوں میں

اس کا سبب کرم شکم بھی ہوتا ہے۔ علاج کے

وقت اس طرف بھی توجہ دینی ضروری ہے۔ بعض

اوقات کوفین، کباب چینی وغیرہ دواؤں کے

استعمال سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت

بال خورہ

Alopecia Areata

صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں۔

۹ لیٹر

جس جگہ سے بال اُڑ گئے ہوں وہاں سرمہ سیاہ

اور لہسن تین تین گرام پیس کر لگائیں۔ اگر اس

کے لگانے سے آبلہ پیدا ہو جائے یا خارش پیدا

ہو جائے تو اس کا دگنا بند کر دیں اور اس پر

لکھن یا مرہم کا فور لگائیں۔

یا شروع میں مرہم محل لگائیں۔

اگر اس سے فائدہ نہ معلوم ہو تو

مرہم ابيض لگائیں۔

جراحی امراض

Surgical Diseases

پھوڑے پھنساں

Boil, Abscess

اگر ٹھنڈی معمولی ہو تو رسوت، پوست درخت نیم

پانی میں پیس کر لگائیں، یا

مرہم کا فور لگائیں۔

اگر پھنسیاں بڑی ہوں، اُن میں مواد ہو، ورم
اور زکھن زیادہ ہو تو

صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں۔

۹ ملی لٹر

بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

کھانے کے لیے

صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں۔

۹ ملی لٹر

اگر پھڑے پھنسیاں تمام بدن پر بہت زیادہ ہو

تو مندرجہ بالا نسخے کے ساتھ

رات کو: قرص مین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔

۲ عدد

اس طریقے سے خون صاف ہو جاتا ہے۔

بکر (ورم غدود کنج ران)

Bubo

مرہم خلل کپڑے پر لگا کر اس پر چپکائیں۔

اس سے دب جائے گی۔ اگر پکنے کے قابل ہوگی تو

پک جائے گی۔ اگر درد شدید ہو تو غما دراحت

لگائیں، جب پک جائے تو سیال اگری فلیوین

میں پچا یا بھگو کر اس سے صاف کریں اور پھر

مرہم مال کپڑے پر لگا کر زخم پر چپکائیں۔

اگر اس میں درد زیادہ ہو تو

دوائے اد جاع کھلائیں، پھر

اگرام

صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں۔

۹ ملی لٹر

پھنسیوں پر ہمدرد مرہم لگائیں۔

اگر بڑے بڑے پھوڑے پیدا ہو جائیں تو ان پر

مرہم محل لگا کر پاں کا پتا گرم کر کے

باندھ دیں۔ اس سے ورم تحلیل ہو جائے گا

اور اگر پکنے کے قابل ہو گا تو پک کر پھوٹ

جائے گا۔ پھر اس پھوڑے کو سیال اگری فلیوین

سے صاف کریں یا برگ نیم پانی میں پکا کر

اس پانی سے دھوئیں۔ اس کے بعد پیپ

وغیرہ کو صاف کریں۔ اور پھر

مرہم مال کپڑے پر لگا کر زخم پر چپکادیں۔

اگر اس پس دم زیادہ ہو اور درد ہو تو نیم

اور مکو سبز کے پتوں کو بھو بھل میں دبا کر اس

کی نیم گرم ٹکیہ اس پر باندھ دیں۔ بارہ یا

چوبیس گھنٹے بعد تبدیل کر دیں۔

رات کو: قرص مصفی: برید پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

صافی پانی ملا کر پلائیں۔

۹ ملی لٹر

رات کو: قرص مصفی جدید پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

گندہ بہروزہ کپڑے پر چپکا کر اُس پر لگانا
اور گرم پانی کی بوتل سے سینک کر نابھی مفید

اگر بہت سخت ہو اور ان دواؤں سے نہ
پکے تو

گھیکوار کے پٹھے کا ٹکڑا لے کر ایک طرف
سے پھیلیں اور اس پر تھوڑی سی رسوت ہلدی
اور سہاگہ باریک بیس کر چھڑک کر باندھیں۔
دو تین روز میں اس سے یہ پھوٹ جائے گی۔ پھر
زخم کو ریتال اگری فلیوین سے صاف کر کے ہمدرد
مرہم یا مرہم رال لگائیں۔

شروع میں چوننا اور شہد ملا کر کپڑے پر
لگا کر باندھنا بھی مفید ہے۔

کچھرالی (درم غدد بعل)

Axillary Abscess

مرہم محتل کپڑے پر لگا کر چپکائیں۔

اگر درد اور جلن کی شدت ہو تو

ضاد راحت لگائیں۔

دولے اجاع پانی سے کھلائیں۔ پھر
اگر گرم

Fistula in Ano

عجی کو: صافی پانی ملا کر پلائیں۔

۹ ملی لٹر

بھگندر

رات کو: قرص مصفی جدید پانی سے کھلائیں۔

اعدد

نوٹ: ان دواؤں کے کھانے سے مواد خشک ہو جائے گا۔ اجابت روزانہ ہوتی رہے گی اور ماضور کے اندام میں زیادہ وقت خرچ نہیں ہوگا، مگر اس کا صحیح علاج عملِ جراحی ہے۔ کسی ماہرِ سرجن سے آپریشن کرانے کا مشورہ دیا جاؤ۔

انگل بڑا

Whitlo

جب یہ ورم شروع ہو تو

اسپنول مستم لے کر سرکہ خالص میں بھگوئیں
۱۲ گرام ۴۵ گرام

جب اسپنول پھول جائے تو اس کو انگلی پر لگا کر صاف ملل کا پیڑا اس کے اوپر باندھ دیں اور اس کو ہر وقت ٹھنڈے پانی سے تر رکھیں۔ درد گھٹنے بعد اسی طرح اسپنول کا نیالیپ لگاتے رہیں۔ چند بار لگانے سے درد اور جلن کم ہو جائے گی اور دو تین روز میں ورم مرجھا کر پھٹ جائے گا۔

یا

ایک عدد لیموں میں چاقو سے اتنا سودا رخ کر لیں کہ اس میں مادہ انگلی داخل ہو جائے پھر اس میں سیندور تین گرام ٹال کر انگلی پر اس کو باندھ دیں۔ نہایت مفید ہے۔

اگر زخم ہو جائے تو آب لیموں میں سیندور تین گرام ملا کر زخم پر لگائیں۔ اس سے زخم بہت جلدی اچھا ہو جائے گا۔

اگر ان میں سے کوئی دوا وقت پر نہ مل سکے تو شروع میں جب درد بہت ہو تو ضماد راحت لگائیں اور

دوائے اوجاع پانی سے کھلائیں۔
اگر ام

اگر پک کر پھوٹ جائے تو

مرہم نال یا ہمدرد مرہم لگائیں۔

ناروا

Guinea Worm

جب ناروا شروع ہو، یعنی آبلہ پیدا ہو جائے تو اس کو تیل سے چپڑ کر آکھ کے پتے سے گرم کر کے سینک دیں اور یہی پتا ہلکا گرم کر کے اس پر باندھ دیں۔ جب یہ پک کر پھوٹ جائے اور

ناروانکلفا شروع ہو جائے تو یہ احتیاط کی جائے کہ یہ ٹوٹ نہ جائے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ اس کپڑے کو آہستہ سے اٹھا کر موسم کے ٹکڑے یا مچس کی تیل پر رکھیں اور دن رات میں آستلی اور نرمی سے اس پر پیٹ دیا کریں اور اس جگہ کو ہر وقت ٹھنڈے پانی سے تر رکھیں۔ جب بدن کے کسی حصے پر یہ نمودار ہونے لگے تو آب کاسنی سبز، آب کشنیز سبز یا ایلوا گھس کر لگائیں، یا صابن دیسی تلوں کے تیل میں حل کر کے مرہم سانا کر لگائیں۔

زخم (قرحہ)

Ulcer

زخم کو گرد و غبار اور کھپوں سے محفوظ رکھیں۔ اگر زخم میں بدبو ہو تو برگ نیم پانی میں جوش دے کر اس سے زخم کو دھوئیں۔ اگر چھچھڑے نظر آئیں تو پہلے چند روز برگ نیم اور گیہوں کے آٹے کی پلٹس بنا کر باندھیں، تاکہ چھچھڑے صاف ہو جائیں۔ پلٹس مٹانے کے بعد سیال ایکری فلیوین میں روئی بھگو کر اس سے زخم کو

صاف کریں اور پھر

مرہم رال یا ہمد مرہم کپڑے پر لگا کر چپکائیں اور اس کے اوپر سیال ایکری فلیوین میں صاف روئی بھگو کر مرہم کے اوپر رکھ کر باندھ دیں۔ اگر زخم گہرا ہو یا ناصور بن گئے ہوں تو روغن گیلہ بچکاری سے زخم میں پہنچائیں یا اس میں تہی تر کر کے رکھیں۔ زخم کو جلدی اچھا کرنے کی غرض سے اگر مندرجہ ذیل دوائیں کھلائی بھی جائیں تو بہتر ہے۔ صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں۔ ۹ ٹی لٹر

سہ پہر: منڈوزا کھلائیں

۲ عدد

مرہم سیاہ: تلوں کا تیل (بیس تولے) ایک ۱۲۵ ٹی لٹر

کڑھائی میں پکائیں، پھر اس میں سیندور ۱۲ گرام

(دس تولے) ڈال کر پکائیں، یہاں تک کہ تیل کی رنگت کالی ہو جائے اور اس کی بوندیں زمین پر ڈالنے سے جم جائیں۔ اب

میں پیس کر اس کی ٹکیہ بنا کر مسوں پر رکھ کر
لنگوٹ باندھ لیا جائے تو درد اور دم
بہت جلد دور ہو جاتا ہے۔

اگر خون بہت زیادہ آ رہا ہو تو اس کے ساتھ
رات کو: قرص یمانی ہمراہ آب کھلائیں۔

اعدد

جب خون بند ہو جائے تو کچھ روز پابندی سے
صبح و شام: قرص بواسیر جدید پانی سے کھلائیں۔

جب خون زیادہ آنے سے مریض بہت کم زور
ہو جائے تو بدن کی رنگت زرد پڑ جائے۔ ہاضمہ
اور معدہ و جگر کمزور ہو جائیں تو
بعد غذا: حب جدید پانی سے کھلائیں۔

۱- اعدد

رات کو: عرق فولاد خام پانی میں ملا کر پلائیں۔
۹ ملی لٹر

اگر بواسیر کے مسوں میں خارش، جلن اور دم ہو
قبض رہتا ہو، مگر خون نہ آتا ہو تو اس حالت میں
صبح کو: مرکب پانی سے کھلائیں
۲ اعدد

رات کو: اسپنول مسلم یا اس کی بھوسی پانی سے کھلائیں۔
۶ گرام

اس کو آگ سے اتار لیں اور اس میں نیلا
تھوکتا تین گرام (تین ماشے) پیس کر ملا کر
کچھ دیر تک موسے سے گھوٹیں۔ اب یہ تیار
ہے۔ اس کو کپڑے پر لگا کر زخم پر لگائیں۔
ہر قسم کے زخموں کے لیے مفید ہے۔

بوائی پھٹنا

Chapped Hands

ہمدرد مرہم بوائی میں مردوں اور ہاتھ
پیروں پر لیں۔ اگر زیادہ بھٹی ہوئی ہو، اس
میں جلن اور تکلیف زیادہ ہو تو
مرہم کافور لگائیں۔

بواسیر

Piles

اگر خون آ رہا ہو تو
صبح کو: قرص حالبس پانی سے کھلائیں۔
۲ اعدد

اگر متورم ہوں، ان میں درد ہو تو
مرہم بواسیر جدید مسوں پر لگائیں۔ اگر
مرہم لگانے کے بعد برگ بھنگ کو بانی

بعد غذا: قرص تخمیر پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

مرہم کا فورستوں پر لگائیں۔

خصیوں کا درد اور ورم

Orchitis

مریض کو چلنے پھرنے سے منع کر دیں۔

برگ بھنگ ۲۵ گرام (۲ تولے) پانی میں

جوش دے کر اس میں کپڑے کی گڈی بھگو بھگو کر

اس سے فوطوں کی ٹکڑ کر لیں۔ پھر ضما د راحت

لگا کر اس پر یہ جوش دی ہوئی بھنگ نیم گرم باندھ

دیں۔ اگر بھنگ نہ مل سکے تو

برگ تمباکو ذرا گرم کر کے خصیوں پر باندھیں

اس سے ورم اور درد دور ہو جاتا ہے۔

اگر سوزاک کی وجہ سے ورم اور درد ہو تو

نوشادر ۱۲ گرام (ایک تولہ) کو پانی میں

جوش دے کر اس میں کپڑے کی گڈی بھگو کر

بار بار خصیوں پر رکھیں اور اسی گرم پانی سے

دھاریں۔

اگر پیشاب میں جلن ہو یا کم آ رہا ہو تو

صبح کو: سفوف شوره قلعی دودھ کی لسی، یا

۳ گرام

شربت بزمردی (پانی ملا کر) کے ساتھ کھلائیں۔

بعد غذا: قرص الکی ہمراہ آب کھلائیں۔

۱-۱ عدد

اگر خصیوں کے درد اور ورم کا سبب آتشک

ہو تو

صبح کو: صفائی پانی ملا کر پلائیں۔

۹ ملی لیٹر

بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

خصیوں میں خارش اور زخم

Scrotal ulcers

صبح کو: صفائی پانی ملا کر پلائیں۔

۹ ملی لیٹر

بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

اگر شدید خارش ہو اور جلن ہو تو

رات کو: سیال مسکن پانی ملا کر پلائیں۔

۵ قطرے

مرہم خارش جدید مقام آؤف پر لگائیں۔

اگر اس سے جلن اور خارش میں کمی نہ ہو تو

مرہم ابیض لگائیں، یا

مرہم جتنا: برگ مہندی (ایک تولہ)، کافور

۱۲ گرام ۶ گرام

(۶ ماشے) دونوں کو باریک کر کے گائے کا

گھی ایک سو ایک مرتبہ دھویا ہوا ملا کر نیم کے

ڈنڈے سے خوب گھوٹ کر رکھ لیں۔ یہ

مرہم خسیوں کی خارش کے لیے بہت مفید ہے۔

بعض عمومی امراض

کمر کا درد (وجع القطن)

Lumbago

صبح کو: قرص کلونجی پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

بعد غذا: قرص بلادر پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

اگر قبض ہو تو

رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔

۲ عدد

درد کی جگہ

ضاد راحت لگائیں۔ اگر درد شدید ہو تو

تقریباً دس قطرے ضاد راحت میں ملا کر

ہلکی مالش کریں، اندر

صبح کو: دوڑائے اور جاع چلنے سے کھلائیں۔

۱ گرام

بعد غذا: قرص اصفہر جدید پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

درد کمر کے لیے سفوف اسگند کھلانا بھی مفید ہے۔

۶ گرام

نسخہ سفوف اسگند: اسگند کی جڑ کو باریک

کوٹ چھان کر اس کے برابر وزن کھانڈ ملا کر

رکھیں اور ۶ گرام صبح، ۶ گرام شام کو درد

سے کھلائیں۔

برگ اسگند تیل سے چپڑ کر گرم کر کے درد

کی جگہ رکھ کر باندھنا بھی درد کمر کے لیے مفید ہے۔

ھڈیاات: مریض کو ٹھنڈک لگنے سے بچائیں۔

گرم بستر پر ٹائیں۔ کمر کی گرم روئی سے سینک

کریں۔ اگر نلک اور گہیوں کی بھوسہ پڑی میں

باندھ کر تو بے پر گرم کر کے سینک کی جائے تو

بہت مفید ہے۔ قبض نہ ہونے دیں۔

پُرانا بخار (حمی مزمن)

Chronic fever

اگر بخار ہلکا ہلکا ہر وقت رہتا ہو، بھوک نہ لگتی ہو، قبض کی شکایت ہو، جگر کا فعل درست نہ ہو تو

صبح کو: شربت خاکسی گرم پانی میں ملا کر پلائیں۔
۶ ملی لٹر

بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

سہ پہر کو: قرص بخار پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

اگر قبض شدید ہو اور اس نسخے سے اجابت نہ ہو تو

قرص بلین شربت خاکسی کے ہمراہ کھلائیں
۱ عدد

یا قرص بلین رات کو گرم پانی سے کھلائیں
یا شربت خاکسی کے بجائے صبح کو زلال اجوائن پلائیں۔

ترکیب نے لال اجوائن: اجوائن دیسی (۱ تولہ)
۱۲ گرام

لے کر صبح کو ایک مٹی کے کورے آب خورے میں ڈیڑھ پاؤ پانی میں بھگو دیں اور آٹھ پہر کے بعد دوسری صبح کو اس کا صاف پانی چھان کر پلائیں۔ کم از کم ایک ہفتہ تک ضرور پلائیں۔ یہ پُرانے بخار کے لیے نہایت مفید دوا ہے۔

دیگر: گلو سبز، خاکسی، اجوائن ہر ایک ۶ گرام کو پانی میں جوش دے کر چھان کر صینی سو میٹھا کر کے پلائیں۔ یہ بھی پرانے بخار کے لیے مفید دوا ہے۔

اگر تلی یا جگر بڑھ گئے ہوں، ہاضمہ خراب ہو تو صبح و شام کو: قرص گز پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

انگیلیوں کا پھولنا

سردیوں میں بعض آدمیوں کے ہاتھ اور پیر کی انگلیاں ٹھنڈ کی وجہ سے سوج جاتی ہیں، ان میں خارش بھی ہوتی ہے۔ بر فانی مقامات کو باشندے بالخصوص اس میں مبتلا ہوتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ

شہجم یا چغندر کے پتے پانی میں پکا کر کھیں

جب نیم گرم ہو جائے تو اس میں ہاتھ اور پیر دس
منٹ تک رکھیں اور پھر اس میں سے ہاتھ پیر
نکال کر ہمدرد مرہم لگائیں۔

آواز بیٹھ جانا (بختہ الصوت)

Hoarseness

اگر نزلہ و زکام کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے تو
صبح و شب: سعالین گرم پانی میں گھول کر لائیں۔

۴-۴ عدد

قرص بادام مخمیں ڈال کر چوستے رہیں۔
دوائے غرغره گرم پانی میں ملا کر کلیاں
کرائیں، یا

سبوس گندم اور نمک پانی میں پکا کر
چھان کر اس سے کلیاں کرائیں۔

خونجان یا لونگ پان میں رکھ کر کھلائیں
اگر خشکی کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے تو

عج کو: مغز بادام شیریں مقشر مرچ سیاہ

۷ عدد ۷ عدد

تھوڑے سے پانی میں پیس کر چٹنی سی بنا کر
اور نماسی مینی ملا کر چٹایا کریں۔

رات کو: قرص بادام ۴ عدد گرم پانی میں

گھول کر پلائیں۔

اگر سینہ درد کھانے سے آواز بیٹھ جائے تو
نمک لاہوری اور تمباکو (آدمی آدمی رقی)
۶۰ ٹی گرام ۶۰ ٹی گرام

پان میں رکھ کر کھلائیں۔

گھینگھا (غوطر)

Goitre

ابتدا میں ضما در راحت لگائیں، یا

سن کے بیچوں کو پانی میں پیس کر ہلکا گرم
کو کے گھینگھا پر لگائیں۔ اس کے اوپر ارنڈ کا
پتہ رکھ کر بانڈھ دیں۔ اس سے بھی چند روز میں
گھینگھا گھل جاتا ہے، یا

ہلدی، دار ہلد، سہاگ سب کو باریک
پیس کر گھینگھا کے پٹھے پر چھڑک کر نیم گرم کر کے
بانڈھیں۔ چند روز میں اس سے بھی فائدہ ہو
جاتا ہے، یا

مرہم محلل لگائیں

ھڈن یا ت: مذکورہ علاج سادہ گھینگھا کا
ابتدائی حالت میں کرنا چاہیے۔ اگر مرض زیادہ
بڑھ جائے، یا گھینگھا رسولی والا یا ریشہ والا ہو

تو کسی ہوشیار ڈاکٹر سے آپریشن کرانے کا مشورہ
دیا جائے۔

بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں
۲-۲ عدد

مردوں کے خاص امراض

نامردی (ضعف باہ)

Impotency

جالیئیس کا قول ہے کہ نفوذِ کامل کے لیے
مرکزِ تناسل کے اعصاب کے علاوہ دل، دماغ،
جگر، معدہ وغیرہ کے افعال کا باقاعدہ ہونا اور
جسمانی صحت کا درست ہونا ضروری ہے۔ ان میں
سے کسی ایک کی خرابی سے قوتِ باہ میں خلل
اجاتا ہے۔ اس لیے بغیر سوچے سمجھے صرف
مقوی و محرک دوائیں استعمال کرنا ٹھیک
نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ علاج یہ ہے کہ جسمانی
صحت کو درست کیا جائے اور جو عضو کمزور ہو
اس کی اصلاح و تقویت کی جائے۔ پس
اگر دماغ کمزور ہو، نزلہ زکام رہتا ہو اور ہضم
خراب ہو تو

صبح کو: حب نزلہ پانی سے کھلائیں

۱ عدد

جب نزلہ رفع ہو جائے تو دماغی اور جسمانی
کمزوری کو دور کرنے کے لیے
صبح و شام کو: دولے غذائی دودھ کے ساتھ
۱۲ گرام

کھلائیں

اگر اس کے ساتھ مندرجہ ذیل دوا پلائی جائے تو
زیادہ فائدہ مند ہے۔

نسخہ: ثعلب مصری مغز پنہ دانہ آرد سنگھارہ
۶ گرام ۶ گرام ۶ گرام
مصری پانی میں پیس کر پلائیں۔

۲۴ گرام

اگر پانی کی بجائے دودھ میں پیس کر اور جوش
دے کر پلائی جائے تو بہت ہی نفع دیتی ہے۔
اگر دل کمزور ہو، جلع کے ارادے سے دل کی
حرکت تیز ہو جاتی ہو تو

صبح کو: شربت منعش پانی میں ملا کر پلائیں۔
۵ ٹی لٹ

بعد غذا: سیال شیریں پانی میں ملا کر پلائیں۔
۵-۵ قطرے

اگر جگر و معدہ کمزور ہوں، ہضم خراب ہو، بدن
کی رنگت نمد ہو، خون کی پیدائش کم ہو تو
صبح کو: منڈوڑا کھلائیں

۲ عدد

بعد غذا: عرق فولاد خام پانی میں ملا کر پلائیں یا
۹-۹ ملی لٹر

حب جدید پانی سے کھلائیں

۱-۱ عدد

اگر اعصاب کمزور ہوں، عمر زیادہ ہو تو
صبح کو: دوائے عزیز پانی سے کھلائیں

۱ عدد

بعد غذا: قرص بلادور پانی سے کھلائیں

۱-۱ عدد

اگر حلوائے بیضہ مرغ کا ناشتہ پابندی سے
کیا جائے تو بہت مفید ہے۔

بیضہ مرغ ۲ عدد کی زردی و سفیدی
نے کر پھینٹیں، پھر ایک دہلی میں گھی ۶۰ گرام
زہ توڑے، اور لونگ سات عدد ڈال کر آگ پر
رکھیں، جب لونگیں سرخ ہو جائیں تو پھینٹ

ہوے انڈے اور چینی ۱۲۵ گرام (آدھ پاؤ)
اس میں ڈال کر حسب قاعدہ حلواتیار کر لیں اور

دار چینی اور سوٹھ ایک ایک گرام (ایک ایک ماش)
باریک میس کر اس میں ملا کر کھائیں اور اس کے
اوپر دودھ پیئیں۔

یہ بہترین مقوی و محرک دوا ہے۔ اس کا
بہترین موسم جاڑے ہیں۔

اگر زکات ویت جس بڑھی ہوئی ہو، جریان و احتلام
رقت و سرخیت کی شکایت ہو تو سب سے پہلے
اس کو دور کرنے کے لیے

صبح و شام کو: قرص سیاہ جریان دودھ کے ساتھ
۱-۱ عدد

کھلائیں۔

بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

جب زکات ویت جس دور ہو جائے تو پھر مذکورہ
بالا مقوی و محرک دوائیں کھلائی جائیں۔

نکتہ: کوئی دوا مقوی بدن یا جزو بدن
نہیں ہوتی ہے، صرف غذا ہی بدل مایتحمل
ہوتی ہے، اس لیے مقوی باہ دواؤں کے
ساتھ مقوی غذائیں کھانا بہت ضروری ہے۔

مقوی غذائیں: دودھ، بالائی، انڈے،
کھن، مچھلی، مرغ، چنا، لوبیا، تمام مغزیات

اور بیل وغیرہ کھانے کی تاکید کی جائے۔

ہالیا ت : منواج اور عمر کے مطابق ہر شخص میں قوت باہ مختلف مدارج پر ہوتی ہے۔ تمام مردوں میں اور عمر کے ہر حصے میں یہ قوت یکساں نہیں رہتی ہے، اس لیے ہر وقت اسی کی نگرانی میں مبتلا نہ رہنا چاہیے۔ قوت باہ کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب تک کسی تحریک و ترغیب کے بغیر خود بہ خود خواہش نہ پیدا ہو۔ وظیفہ زوجیت کا ارادہ نہ کیا جائے اور جب خواہش پیدا ہو تو وظیفہ زوجیت کی تکمیل سکون و اطمینان کے ساتھ کی جائے۔ اس قسم کے جماع کے بعد طبیعت میں فرحت و تازگی پیدا ہوتی ہے اور کسی قسم کی کسل و ماندگی نہیں ہوتی۔

آج کل ضعف باہ کی وجہ عام طور پر کثرت مواصلت اور دیگر بد عادات ہیں۔ ان کا علاج یہ ہے کہ بے اعتدالی اور بد کرداری کی عادت ترک کر دینی چاہیے۔ کھلی ہوا میں صبح کو سیر و ورزش کرنی چاہیے۔ خیالات کو پاکیزہ رکھا جائے صحت مند رہے۔ چکر کا مطالعہ کیا جائے۔ جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے قوت بخش غذائیں کھانی جائیں اور

چند ہفتے تک صبر کے ساتھ اس فرض کی ادائیگی کی طرف سے لاپرواہی جائیں۔
طریقہ علاج : ضعف باہ کے علاج میں پہلے ذکاوت جس (جس کی وجہ سے جریان اور احتلام وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے) کو دور کیا جائے۔ اس کے بعد مقوی اور محرک دوائیں کھلائی جائیں۔

جریان منی سیلان منی)

Spermatorrhoea

اگر ذکاوت جس بڑھی ہوئی ہو، ہاضمہ خراب ہو، قبض رہتا ہو تو
معج کو: قرص سیاہ جریان دودھ سے کھلائیں۔
۱ عدد

بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں

۲-۲ عدد

رات کو: قرص ملین پانی سے کھلائیں

۱ عدد

اگر پیشاب میں یا پیشاب کی نالی میں جلن معلوم

ہو تو قرص گل آکھ کی بجائے

بعد غذا: قرص انکلی پانی سے کھلائیں

۱-۱ عدد

اگر اس کے ساتھ نزلہ وزکام رہتا ہو، دماغی اور
جسمانی کمزوری ہو تو

صبح کو: حب نزلہ پانی سے کھلائیں

۱ عدد

سپہر کو: دوائے غذائی پانی کے ساتھ کھلائیں
۱۲ گرام

معدہ و ہضم کی اصلاح کی غرض سے انھی دواؤں
کے ساتھ

بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں

۲-۲ عدد

اس مرض کو دور کرنے کے لیے دوائے ببول اور
سفوف جریان بھی مفید ہیں۔

دوائے ببول: ببول (کیکس) کی نرم و نازک
پھلیاں (جن میں ابھی بیج نہ پڑے ہوں) لے کر
سائے میں خشک کریں اور پھر کوٹ چھان کر
سفوف بنائیں اور اس میں برابر وزن دیسی
گھانڈ ملا کر رکھیں۔

خوراک: روزانہ صبح کو ۶ گرام (۱۶ ٹشے)
دودھ کیسا کھلائیں۔ جریان کے لیے کم خرچ بالا
نشین نسخہ ہے

سفوف جریان: ستا ورا در سیل کھری دو

برابر وزن لے کر کوٹ چھان کر سفوف بنائیں
اور ان کے برابر کھانڈ ملا کر رکھیں۔

خوراک: روزانہ صبح کو ۶ گرام (۱۶ ٹشے)
دودھ کے ساتھ کھلایا کریں۔ جریان کے لیے
بہت مفید ہے۔

نوٹ: ان دواؤں کے استعمال کے ساتھ
ہاضم اور قبض کشا کوئی دوا ضرور کھلاتے رہیں۔
تشخیصی نکات: آج کل نوجوانوں میں
عام طور پر یہ شکایت پائی جاتی ہے، مگر بہت کم
لوگ حقیقی جریان کے مریض ہوتے ہیں، ورنہ

عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ضابطہ ہاضمہ کی وجہ
سے پیشاب میں فاسفیٹ خارج ہونے لگتے ہیں۔

یا پیشاب کی نالی اور غدة قدامیہ کی سوزش کی
وجہ سے رطوبت خارج ہونے لگتی ہے، یا بعض
تیز و گرم مزاج جوانوں میں جوش و قوت کی وجہ
سے کبھی کبھی خود بخود انزال ہو جایا کرتا ہے اور
بعض پرہیزگار اور شرمیلے جوانوں میں رفع حاجت

کے وقت مزی کی رطوبت خارج ہونے لگتی ہے،
بالخصوص اگر یہ اشخاص قبض میں بھی مبتلا رہتے
ہوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ احتلام

کے وقت مزی کا کچھ حصہ کیسا المنی (ویسی کیوالائی)

ضرور کی جائے۔ غذاؤں میں حیوانی سالے دار
غذائیں، شراب و کباب، چائے اور کافی وغیرہ
سے پرہیز کر لیا جائے اور سبز ترکاریاں کھلائی جائیں۔
اگر شادی شدہ ہوں تو کئی مہینے تک مباشرت سے
پرہیز کرنے کی تاکید کی جائے۔

احتلام (بد خوابی)

Night Discharge

اگر ذکاوت جس کی وجہ سے ہو تو
صبح کو: قرص سیاہ جربان دودھ سے کھلائیں
۱ عدد

اگر قبض ہو تو اسی کے ساتھ
رات کو: قرص ملین پانی سے کھلائیں
۱ عدد

اگر ہضم خراب رہتا ہو، بھوک ابھی طرح نہ لگتی
ہو تو
بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں
۲-۲ عدد

اگر ان دواؤں سے کوئی فائدہ نہ ہو، مریض مجرؤ
نوجوان ہو تو
صبح کو: قرص مسکن یا اکسیر شفا پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد ۱ عدد

یہی نے نیز، میں باقی رہ جاتا ہے اور وہ بیداری
میں پیشاب کے وقت خارج ہو جاتا ہے۔ ان
تمام شکایات کو مریض جربان منی خیال کرتا ہے
اور اس کی فکر و تشویش میں روز بہ روز مریض
گھٹا رہتا ہے جس سے اس کی صحت و قوت
اور بھی کمزور ہو جاتی ہے، ورنہ اصل جربان منی
جس میں کرم منی خارج ہوتے ہیں، بہت کم
اشخاص میں پایا جاتا ہے، اس لیے جو شخص اس
قسم کی شکایت بیان کرے، اس کو ایک مہینے
دوائیں نہ دی جائیں، بلکہ اصل سبب کو تلاش
کر کے علاج کیا جائے۔ اگر فساد ہاضمہ کی وجہ سے
فاسفیٹ خارج ہوتے ہوں تو عمدہ اور
قوت ہاضمہ کا علاج کیا جائے۔ اگر قبض رہتا ہو
تو اس کا ازالہ کیا جائے۔ اگر مجری بول یا غدہ
قدامیہ کی سوزش کی وجہ سے رطوبت خارج ہوتی
ہو تو مسکن دواؤں سے اس کا علاج کیا جائے۔
ھدایات: ان مریضوں کو دوائیں تجویز کرنے
کے ساتھ سرد پانی سے غسل کرنے، سرد پانی میں
بیٹھنے، صبح کو کھلی ہوا اور سرسبز میدان میں سیر اور
تفریح اور ہلکی ورزش کرنے، نیک خیالات ابھی
صحبت اور صحت مند لٹریچر کے مطالعے کی ہدایت

بادوائے کشنیز کھلائیں

دوائے کشنیز: دھینا خشک ضرورت کے مطابق لے کر کوٹ کر چھان لیں اور اس کے برابر شکر سفید ملا کر رکھ لیں۔

خوراک: صبح کو ۶ گرام (۱ ماشے) ٹھنڈے پانی سے کھلائیں۔

تلہ بایر: روزانہ صبح کو نہار منہ ایک گلاس ٹھنڈا پانی پینے سے کثرت احتلام کی شکایت کم ہو جاتی ہے۔ بالخصوص گرم مزاج نوجوان اشخاص کے لیے بہت مفید ہے۔

ھڈا یات: مریض کو ہدایت کر دیں کہ وہ اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھے۔ عشقیہ قصے کہانیوں اور ناولوں کے پڑھنا اور سینما کے دیکھنے سے پرہیز کرے۔ رات کا کھانا سونے سے تین گھنٹے پہلے کھائے۔ دودھ چلے وغیرہ پی کر فوراً نہ سوئے۔ چست ہرگز نہ لیٹے۔ ہمیشہ کرٹ پر سونے کی کوشش کرے اور یہ خیال بار بار دہرا کر سوتے کہ مجھے احتلام ہرگز نہیں ہوگا۔

سرعت انزال

Premature Ejaculation

اگر بد عادات اور کثرت جماع کے سبب سے زکات حس پیدا ہونے کی وجہ سے یہ شکایت ہو تو

صبح کو: قرص سیاہ جریان دودھ سے کھلائیں
عدد

بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں۔

۲-۲ عدد

جریان و احتلام کے علاج میں جو دوائیں تجویز کی گئی ہیں حسب موقع و ضرورت وہ اس مرض کے لیے بھی مفید ہیں۔

تشخیصی اشارہ: عام طور پر یہ شکایت رقت و حرارت منی اور خزانہ منی کے ضعف کی وجہ سے ہوا کرتی ہے، اس لیے اس کے علاج میں نظام عصبی کو سکون پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس غرض کے لیے مسکن، بارداور مغلط منی دوائیں کھلائی جائیں اور محرک و گرم دوائیں اور غذائیں تجویز نہ کی جائیں۔

طبعی طور پر دخول کے بعد انزال کی مدت کم از کم دو منٹ اور زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ ہوتی ہے۔ اس کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے اور یہ بات مریض کے ذہن نشین کرانا چاہیے

تاکہ اس کا وہم و خیال دور ہو جائے اور وہ خود اپنا اندازہ کر سکے۔

عورتوں کے خاص امراض

رحم کی سوجن (ورم الرحم)

Metritis

آب برگ مکو سبز مرق اور آب برگ کاسنی سبز مرق ہر ایک ایک سو اسیس لی رطبت میں سے میٹھا کر کے پلائیں۔ بھجیا برگ سنبھالو پیرد پر باندھیں۔

نسخہ بھجیا برگ سنبھالو: برگ سنبھالو، برگ سہنجنہ، برگ بکائن، برگ کاسنی، برگ مکو، برگ خطمی، برگ کپاس اور برگ سویا پچیس پچیس گرام لے کر پانی میں پکائیں۔ جب پٹے گل جائیں اور پانی ختم ہو جائے تو ان کو تیل کے تیل ۱۲ گرام میں بھجیا کی طرح تیل کر لے گا گرم پیرد پر باندھیں۔

اگر پیرد میں ورم کی وجہ سے درد ہو تو دوائے ارجاع پانی سے کھلائیں اور ۱ گرام

ضماد راحت لگا کر اوپر یہ بھجیا باندھ دیں۔ اس طریقے سے درد کو فوری سکون ہو گا اور ورم بھی بہت جلدی جاتا رہے گا۔

اگر قبض ہو تو

رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔

اعدد

اضمہ کی درستی کے لیے

بعد غذا: قرص الکلی پانی سے کھلائیں۔

۱- اعدد

اگر مریضہ فربہ ہو تو رانوں کے اندر کی طرف چند جونکیں لگوانا بھی مفید ہے۔ اندرونی صفائی رکھنا ضروری ہے تاکہ رطوبت کی عفونت اور خراش سے زخم نہ ہو جائے۔ اس غرض کے لیے مندرجہ ذیل پانی کی پککاری کریں:

نسخہ پککاری (ڈوش): برگ نیم سہاگہ، پانی ۲۵ گرام ۳ گرام اٹکو

میں جوش دے کر چھان کر اس سے پککاری کریں اور اسی پانی میں کپڑا بھگو کر پیرد پر سینک کریں۔

زخم رحم

Cervical Ulceration

برگ نیم، کیلہ، سہاگہ، پانی میں جوش دے کر
۶ گرام ۶ گرام ۳ گرام اکلو

چھان کر پھکاری کے ذریعے اندرونی صفائی
کریں اور اس کے بعد
مرہم کا فورہ لگائیں۔

اگر اس کے ساتھ درم رحم ہو تو اس کا علاج کیا
جائے۔ اگر سیلان الرحم ہو تو

صبح کو: قرص سیلان خاص دودھ سے کھلائیں
۱ عدد

اگر قبض کی شکایت ہو، انعمہ خراب ہو تو
بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں
۲-۲ عدد

رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں
۱ عدد

سیلان الرحم

Leucorrhoea

صبح کو: قرص سیلان خاص دودھ سے کھلائیں
۱ عدد

بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں
۲-۲ عدد

اگر قبض رہتا ہو تو

رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

حب عروس اندام نہانی میں دانی کے
۱ عدد

ذریعے رات کو رکھوائیں اور صبح کو علیحدہ
کردیں، اسی طرح ایک ہفتے تک استعمال
کریں۔

اگر کئی خون کی وجہ سے ہو تو

بعد غذا: حب جدید پانی سے کھلائیں
۱-۱ عدد

اگر پیٹ میں کڑے ہوں تو

رات کو: قرص دیدان جدید پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

دولے سیلان: سیل کھڑی چنے بھنے ہوئے
۳۶ گرام ۲۳ گرام

مازو ان کو کوٹ چھان کر برابر وزن کھانڈ
۱۲ گرام

ملا کر رکھیں۔

خود ادا: صبح کو ۶ گرام دودھ کے ساتھ
کھلائیں۔ سیلان الرحم کے لیے بہت مفید ہے

گھوڑے کی سواری، سائیکل اور پاؤں سے چلنے والی کپڑے سینے کی مشین چلانا وغیرہ منع کر دینا چاہیے۔

حیض کی زیادتی

Menorrhagia

صبح کو: قرص حالبس پانی سے کھلائیں۔ اگر اس

۲ عدد

کے ساتھ زلال گل ملانی پلایا جائے تو زیادہ مفید ہے۔

ترکیب زلال گل ملانی: ملانی مٹی ۱۲ گرام پانی میں گھول کر رکھ دیں۔ کچھ دیر بعد نتھرا ہوا پانی لے کر پییں۔

بعد غذا: عرق کافور پانی میں ملا کر پلائیں۔

۵-۵ قطرے

جب خون بند ہو جائے تو جسمانی کمزوری کو دور کرنے اور رحم کو تقویت دینے کے لیے۔

صبح کو: منڈوڑا کھلائیں

۲ عدد

خون آنے کی حالت میں دوائے گیر بھی مفید ہے۔

مبجوں سیلان: آم خشک، اصل السوس مقشر دونوں برابر وزن لیں اور ان کو باریک کوٹ چھان کر تین گئے شہد خالص میں ملا کر رکھیں۔
خوراک: صبح و شام ۶-۶ گرام دودھ کے ساتھ کھائیں۔ یہ بھی سیلان الرحم کے لیے بہت مفید ہے۔

تشخیصی نکات: سیلان الرحم بہ ذات خود کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ رحم متعلقات رحم اور معدہ دامعائی اکثر تکالیف اس کا سبب ہوتی ہیں۔ پھوٹی لڑکیوں میں چرنوں (چنوں) اور پیشاب میں اجزائے غیر منہضمہ کے باعث یہ تکلیف ہو جایا کرتی ہے۔ چرنوں کے سبب سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے تو وہ کپڑے میں لگنے کے علاوہ رانوں میں دونوں طرف بھی لگی رہتی ہے اور اس سے اندام نہانی کے دونوں لب بھی چپک جایا کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں عورتوں کے رحم سے کئی قسم کی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ ان میں بھی فرق اور امتیاز کرنا ضروری ہے۔ غرض کہ اسباب کو تلاش کر کے علاج کرنا چاہیے اور تمام امراضی رحم میں مباشرت زیادہ چلنا پھرنا،

نسخہ: سیل کھڑی، گیر و برابر وزن لے کر
کوٹ چھان کر رکھیں۔

خوراک: صبح و شام تین تین گرام پانی یا
سرد دودھ کے ساتھ کھلائیں، یا اس کی بجائے
صبح و شام: قرص یانی پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

اگر قبض رہتا ہو تو

رات کو: قرص ملین پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

جب ایام مقررہ کے دو چار روزہ جائیں تو
صبح و شام: قرص در کھلائیں۔

۱-۱ عدد

اگر فریبی اور بلغم کی کثرت اس کا سبب ہو تو
بعد غذا: عرق گھیکو اور خام پانی میں ملا کر پلائیں۔
۹-۹ ٹی لٹر

اور ایام مقررہ سے چند روز پہلے صبح کو جو شانہ
ادرار پلائیں۔

نسخہ جو شانہ ادرار: تخم گاجر، گڑ پانی
۱۲ گرام ۲۲ گرام

میں جوش دے کر چھان کر پلائیں۔

باجھپن

Sterility

اگر عورت میں کوئی نقص نہ ہو، یعنی اس کو حیض
باقاعدہ آتا ہو اور مرد کا مادہ تولید بھی درست
ہو تو کچھ دنوں تک رحم کی تقویت کیلئے
عدت کو

ہلایات: کثرت حیض کی حالت میں مریضہ
کو آرام سے بستر پر لیٹے رہنے کی تاکید کر دیں اور
چار پانی کو پانسی کی طرف سے ادبنا کر دیں۔ یہی
عسرت میں چلنا پھرنا، کوئی سخت حرکت کرنا اور
آگ کے پاس بیٹھنا مضر ہے۔

حیض کی بندش (اعتباس حیض)

Amenorrhoea

اگر جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کے سبب
سے ہو تو

صبح کو: مندوڑا کھلائیں

۲ عدد

بعد غذا: عرق فولاد خام پانی میں ملا کر پلائیں
۹-۹ ٹی لٹر

یا حب حدید کھلائیں۔

۱-۱ عدد

صبح و شام: قرص سیلان خاص دودھ سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

اگر عورت فریب ہو، اس کا ہاضمہ درست نہ ہو تو
بعد غذا: قرص گل آکہ پانی سے کھلائیں۔
۲-۲ عدد

حیض سے پاک ہونے کے بعد مندرجہ ذیل
دواؤں میں سے کوئی ایک دوا کھلائی جائے۔
سفوف نشاء عالج: برادہ ہاتھی دانت
نہایت باریک پس کر رکھیں۔

خودالک: ۲ گرام (۲ ماشے) صبح کو دودھ
کے ساتھ ایک ہفتہ تک کھلائیں۔
سفوف شولنگی: تخم شولنگی باریک پس کر
چھان کر رکھیں۔

خودالک: ۳ گرام (۳ ماشے) روزانہ صبح کو
دودھ کے ساتھ ایک ہفتہ تک کھلائیں اس
کے بعد مجامعت کی جائے۔

اگر ان دواؤں کے کھلانے سے پہلی دفعہ
حاصل قرار نہ پائے تو اسی ترکیب سے تین مہینے
ضرور کھلاتے رہیں۔

اسباب عقر: بانجھ پن کے اسباب مختلف
ہیں۔ عورتوں میں رحم اور خصیتہ الرحم کی پیدائشی

نقص، مثلاً رحم کا نہ ہونا یا چھوٹا ہونا۔ جب
رحم چھوٹا ہوتا ہے تو خصیتہ الرحم میں بھی کوئی
نقص ضرور ہوتا ہے۔ اس حالت میں عورت
کو حیض بالکل نہیں آتا اور اس کے پستان بھی
پورے طور پر ابھرے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔
بہی اصلی بانجھ پن ہے اور یہ لاعلاج ہے۔

اس کے علاوہ (۱) ایام عا ہواری کی
یہ قاعدگی یا بندش (۲) سفید رطوبت کا بہ کثرت
اخراج (۳) رحم کا درم مزمن (۴) فریبی اور
کثرت بلغم وغیرہ بانجھ پن کے عام اسباب ہیں۔
پہلے ان امراض کا علاج کیا جائے۔ اس کے
بعد تقویت رحم اور استقرار حمل کے لیے دوائیں
استعمال کرائی جائیں۔

اگر عورت میں کوئی خرابی نہ معلوم ہو تو مرد کو
مادہ تولید کا امتحان کرایا جائے۔ اگر اس میں کرم منی
کمزور یا کم تعداد میں ہوں تو ان کا علاج کیا جائے۔

باؤ گولہ (اختناق الرحم)

Hysteria

دورے کی حالت میں مریضہ کو آرام سے
ٹٹائیں۔ اس کے سینے اور گلے کی بندش کو

کھول دیں۔ سر کے نیچے اونچا تکیہ رکھیں، بازوؤں اور پنڈلیوں کو کس کر باندھیں۔ ہوش میں لانے کے لیے چہرے پر عرق گلاب اور عرق کیوڑہ کے پھینٹے ماریں۔ اگر یہ نہ ملے تو سرد پانی کے پھینٹے منہ پر ماریں۔ ناک کے نتھنوں کو ایک دو منٹ کے لیے بند کر دیں۔ ہیننگ یا لہسن سو نگھائیں، یا درائے ہوش آور سو نگھائیں۔

نسخہ دو: ہوش آور: نوشادر اور چونا ہر ایک چھٹے چھٹے گرام باریک پیس کر ایک شیشی میں رکھیں اور اس میں چند قطرے پانی ڈال کر مریضہ کو سو نگھائیں۔ اس سے بہت جلدی ہوش آجاتا ہے۔ جب ہوش آجائے تو

صبح کو: شربت منمش پانی میں ملا کر پلائیں۔

۵ ملی لٹر

رات کو: اکیر شفا پانی یا دودھ کے ساتھ کھلائیں۔

اعدد

اگر ہاضمہ درست نہ ہوا پیٹ میں نفخ یا درد رہتا ہو تو

صبح کو: شربت منمش پانی میں ملا کر پلائیں۔

۵ ملی لٹر

بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں۔

۲-۲ عدد

اگر قبض رہتا ہو تو
رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں
اعدد

اگر مریضہ غیر شادی شدہ ہو، جنسی خواہشات کا غلبہ ہو تو

صبح اور رات کو: اکیر شفا پانی سے کھلائیں۔

اعدد

اگر حیض کی خرابی ہو، یا ورم رحم ہو تو ان کا علاج کیا جائے۔

نوٹ: دورہ رفع ہونے کے بعد مریضہ مختلف قسم کی شکایات بیان کیا کرتی ہے۔ اس کا علاج کیا جائے۔

علامات فارقم: اختناق الرحم اور مرگی میں فرق مانتا کرنا بہت ضروری ہے، کیوں کہ یہ دونوں امراض علامات کے لحاظ سے بہت کچھ مشابہ ہوتے ہیں۔

اختناق الرحم میں مریضہ کے منہ سے مرگی کی طرح جھاگ نہیں آتے ہیں اور مرگی کا مریضہ آواز نہیں سن سکتا، لیکن اختناق الرحم کی مریضہ آواز سنتی ہے۔ شدید مرگی میں چہرہ نیلا اور خفیف مرگی میں زرد ہو جاتا ہے، مگر اختناق الرحم کی

مریضہ کا چہرہ سُرخ ہوتا ہے۔ مرگی کا دورہ رخص ہونے کے بعد گہری نیند آجاتی ہے۔ لیکن اختناق الرحم کا دورہ دور ہونے کے بعد نیند نہیں آتی۔ مرگی کے مریض کا بول و براز بڑا اختیاً نکل جاتا ہے، لیکن اس کی مریضہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ اختناق الرحم میں مریضہ کو پیٹ میں سے ایک گولا سا اٹھ کرا دپر کو جا کر گلے میں اٹکتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ مرگی کے مریض میں پاؤں یا پیٹ سے ایک قسم کی سرسراہٹ شروع ہو کر بہ تدریج ادپر کو چل کر سرتک پہنچتے ہی دورہ ہو جاتا ہے۔

شرم گاہ کی خارش

Vulvae Pruritis

اگر میلا کچیلارہنے کی وجہ سے شرم گاہ میں خارش ہو تو روزانہ نیم گرم پانی سے غسل کرائیں اور صاف کپڑے پہننے کی ہدایت کریں۔ خارش کے مقام پر

مرہم کا فوراً لگائیں، یا سرسول یا چمیلی کا تیل لگائیں۔

اگر جسم جوئیں پیدا ہونے کے سبب سے خارش

ہو تو اس حالت میں بھی روزانہ نہانا اور صاف کپڑے پہننا چاہئیں۔

اور مقامی طور پر روغن نیم لگائیں۔
اگر خون کی خرابی سے خارش ہو تو
صبح کو: صافی پانی میں ملا کر پلائیں
۹ ملی لٹر

بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

اگر حیض کی بندش یا اس کی بے قاعدگی، یا سیلان الرحم وغیرہ اس کا سبب ہو تو ان امراض کا علاج کیا جائے اور مقام ماؤف پر مرہم خارش جدید لگائیں۔

شرم گاہ کی پھنسیاں

Abrasions of Vulva

صبح کو: صافی پانی یا دردھ میں ملا کر پلائیں۔
۹ ملی لٹر

رات کو: قرص مسکن پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

اگر پیشاب میں جلن ہو تو
بعد غذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں۔
۱-۱ عدد

پستان کا ورم (تھنیلہ)

Mastitis

شررت میں درد اور ورم دور کرنے کے لیے
ضمارِ راحت یا ضمارِ دھتورہ لگائیں۔

ضمارِ دھتورہ : برگ دھتورہ سبز، ہلدی
۳ عدد ۲ گرام

پانی میں پیس کر ورم پر نیم گرم پیس کریں۔ اس
سے ورم اور درد بہت جلدی دور ہو جاتا ہے۔
اگر کپنے کے قابل ہو تو پک جاتا ہے۔

جب ورم پھوٹ جائے تو برگ نیم کے جوشانک
سے زخم کو دھو کر اور صاف کر کے مرسم رال
کپڑے پر لگا کر چپکائیں اور اس پر
سیال اگری ٹیلوین میں روزی بھگو کر رکھ کر
باندھیں۔

ھڈا یات : متورم پستان کا دودھ بچے کو
نہ پلایا جائے۔ اگر دودھ کی وجہ سے تناؤ اور درد ہو

تو آک مخرج اللبن Breast-Pump
کے ذریعے دودھ نکال دیں۔ اگر دودھ نکالنے
سے پہلے گرم پانی میں کپڑا بھگو کر اس سے پستان
کی سینک کر دیں تو دودھ بہ آسانی نکل آتا ہے۔

مرسم خارش جدید پھنسیوں پر لگائیں۔
اگر پھنسیوں میں جلن شدید ہو تو
مرسم کانور لگائیں۔

اگر آتشک کی وجہ سے پھنسیاں ہوں تو
رات کو: قرص مصفی جدید پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

شرم گاہ کا زخم

Ulceration of Vulva

زخم کی صفائی کے لیے

برگ نیم، سہاگہ، پانی میں پکا کر اور
۲۴ گرام ۳ گرام اکلہ

چھان کر اس سے دھوئیں اور پھر
مرسم کانور یا روغن کمیدہ لگائیں

اگر اس کا سبب آتشک ہو تو

صبح کو: صافی پانی ملا کر پلائیں
۹ ملی لٹر

رات کو: قرص مصفی جدید پانی سے کھلائیں۔
۱ عدد

حمل گر جانا (استقاطِ حمل)

Abortion

اگر جسمانی کمزوری کی وجہ سے حمل گر جاتا ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے صبح کو: دو لٹے غذائی دودھ سے کھلائیں۔

۱۲ گرام

شام کو: منڈوڑا کھلائیں۔

۲ عدد

اگر حمل کرنے کا سبب آتشک و سوزاک کا تقدیر ہو تو

صبح کو: صافی پانی میں ملا کر پلائیں۔

۹ ملی لٹر

اگر رحم کی کمزوری اس کا سبب ہو، رحم سو رطوبت خارج ہوتی ہو تو

صبح کو: قرص سیلان خاص کھلائیں۔

۲ عدد

شام کو: منڈوڑا کھلائیں۔

۲ عدد

اگر حاملہ کو قبض رہتا ہو تو

رات کو: گل تند کھلائیں۔

۲۴ گرام

اگر یہ آلہ نہ ہو تو بڑے منہ کی ایک بوتل کو گرم پانی سے کئی مرتبہ دھو کر گرم بوتل کا منہ پستان پر لگا دیں۔ اس سے بھی دودھ خارج ہو جاتا ہے۔

بھٹنی کا پھٹنا

Cracked Nipple

اگر سر پستان پر خراش ہو جائے یا پھٹ جائے تو بچے کو دودھ پلاتے وقت نیل شیلڈ

Nipple Shield (غلاف) استعمال

کریں۔ بہتر یہ ہے کہ اس سے بچے کو دودھ نہ

پلائیں۔ مقام ماؤف پر

مرہم کافور لگائیں

اگر چھاتیوں میں دودھ غلیظ ہو کر گلیٹیاں اور گانٹھیں بن جائیں تو ان کو تحلیل کرنے کے لیے

ضمارِ راحت لگائیں۔ بچے کو اس پستان

سے دودھ نہ پلایا جائے۔

اگر گانٹھیں زیادہ سخت ہوں اور اس سے

تحلیل نہ ہوں تو

مرہم محل لگائیں۔

حاملہ کے امراض

دردِ سر

Headache

اگر قبض کی وجہ سے ہو یا مفہم خراب ہو تو رات کو: گل قند یا مر باہلیہ کھلائیں۔

۲۴ گرام عدد

بعد غذا: قرص گل آکھ کھلائیں۔

۲-۲ عدد

پیشانی اور کنپٹیوں پر ہلدرد بام کی ہلکی مالش کریں۔

دردِ دندان

Toothache

مسوڑھوں پر دوائے دارٹھ کی پھری لگائیں یا قلعہ دم میں پھری بھر کر لگائیں۔

اگر مسوڑھے سترم ہوں تب بھی دوائے دارٹھ ہی لگائی جائے۔ شدید درد کی حالت میں قرص مسکن پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

نوٹ: اگر حاملہ کی دارٹھ یا دانت میں درد ہو تو اس کو نکلوانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ درداؤ

ہذا بات: مریضہ کو حمل قرار پانے کے بعد یہ ہدایت کر دی جائے کہ آرام و سکون کی زندگی بسر کرے۔ حمل کے زمانے میں جماع سے پرہیز کیا جائے۔ آیام مقررہ کے دنوں میں بستر پر آرام سے لیٹی رہے۔ کوئی تیز دوا نہ کھائے۔ سیبوی کا گل قند ۱۲ گرام یا مر باہلیہ ایک عدد چاندی کے ورق میں پیسٹ کر روزانہ کھانا حمل کو اسقاط سے محفوظ رکھتا ہے۔

اگر خون آنے لگے تو مریضہ کو آرام سے بستر پر بٹائیں۔ اس کی چار پانی کی پانسی کو ادبھا رکھیں اور

صبح کو: قرص حاملہ پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

شام کو: منڈونا کھلائیں۔ اگر سفوف آملہ

۲ عدد

کھلائیں تو یہ بھی مفید ہے۔

سفوف آملہ: آملہ، لودھ پٹھانی، ملیھی ہر ایک برابر وزن لے کر کوٹ چھان کر ان کے برابر کھانڈ ملا کر رکھیں اور صبح و شام چھ چھ گرام دودھ کے ساتھ کھلائیں۔

درم کو کم کرنے کے لیے بیرونی طور پر دوائیں لگائی جائیں۔

نیند نہ آنا

Insomnia

اگر قبض یا بد ہضمی کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو تو اس کو دور کریں۔ سر پر روغن کا ہویا روغن خشکاش کی مالش کریں۔

شام کو: قرص مسکن پانی سے کھلائیں۔

تھوک کی زیادتی

Salivation

مسالے دار غذاؤں سے پرہیز کرائیں۔

الابچی کھلائیں۔ مندرجہ ذیل غرغہ کرائیں: دوائے غرغہ: ناسپال، پوست درخت کی

۲۴ گرام ۲۴ گرام

آدھ سیر پانی میں جوش دے کر چھان کر اس سے کلیاں کرائیں۔ اگر یہ دوا پسند نہ ہو تو

پھٹکری ۴ گرام پیس کر گرم پانی میں ملا کر

اس سے غرغے کرائیں۔

بعد غذا: قرص گل آکھ کھلائیں۔

۲-۲ عدد

سفوف زیرہ: زیرہ سفید، دانہ الابچی کلاں دونوں برابر وزن کوٹ چھان کر رکھیں۔ بعد غذا: ۲-۲ گرام پانی سے کھلائیں۔

پستانوں کا درد

گرم پانی اور صابن سے دھو کر

ضنا و راحت لگائیں۔

اگر کھلی ہو تو نرم کپڑے سے سہلائیں، یا روغن کمیلا لگائیں۔

کھانسی

Cough

سعالین منہ میں ڈال کر چوستے رہنے کی

ہدایت کریں۔ اگر شدید کھانسی ہو تو

سعالین گرم پانی میں گھول کر پلائیں، یا

۴ عدد

قرص بارام کھلائیں، یا

دوائے سعال: اصل السوس مقشر، سہاگ بھٹا

۱۲ گرام ۱۲ گرام

ہوا، گوئد بول سب کو باریک پیس کر

۴ گرام

اگر قبض ہو تو
مرتا ہلہ یا گل قدر کھلائیں۔
عدد ۲۴ گرام

پیٹ کا درد

Abdominal pain

اگر اس کا سبب بد ہضمی ہو تو ایک دو وقت
کوئی غذا نہ کھلائیں اور
قرص گل آکھ کھلا کر قرص الکی پانی میں
عدد ۲

گھول کر اس کے ساتھ پلا دیں۔
درد رفع ہونے کے بعد روزانہ
بعد غذا: قرص گل آکھ کھلائیں
عدد ۲-۲

یا حسب ذیل سفوف زنجبیل کھلایا کریں۔
سفوف زنجبیل: زیرہ سفید، سونٹھ،
۱۲ گرام ۶ گرام
نمک سیاہ ۳ گرام سب کو کوٹ چھان کر
رکھیں اور دونوں وقت کھانا کھانے کے
بعد تین تین گرام پانی سے کھلائیں۔ درد کے
وقت بھی اس کو کھلانے سے آرام ہو جاتا ہے۔

رکھیں اور صبح، دوپہر اور شام کو ایک ایک
گرام تھوڑے سے شہد خالص میں ملا کر چٹائیں،
یا دوائے بادام کھلائیں۔

دوائے بادام: مغز بادام اور تخم خنکاش
ہم وزن اور اس کے برابر مصری، سب کو
کوٹ چھان کر رکھیں اور دن میں کئی دفعہ تین
تین گرام کھلایا کریں۔

اگر کھانسی میں بلغم بہت آتا ہو، دورہ شدید
ہوتا ہو تو

صدوری چٹائیں۔

۹ ملی لٹر

دل کی دھڑکن

Palpitation

اگر دلیضہ کا ہضم خراب ہو تو
صبح کو: شربت منقش پانی میں ملا کر پلائیں۔
۵ ملی لٹر

بعد غذا: قرص گل آکھ کھلائیں۔
عدد ۲-۲

رات کو: سیال شیرین پانی میں ملا کر پلائیں۔
۵ قطرے

متلی متے

Nausea & Vomiting

صبح اٹھتے ہی ہلکا ناشتہ کرنا چاہئے، یا صرف ہلکی چائے یا گرم دودھ ہی پیا جائے اور ناشتے کے بعد کم از کم ایک گھنٹے تک بستر پر آرام سے لیٹے رہنے کی ہدایت کریں۔ اگر اس سے کوئی فائدہ نہ ہو اور نزلہ و زکام وغیرہ بھی نہ ہو تو

شریت ترمہندی تھوڑا تھوڑا چلائیں۔ اگر تے شدید ہو اور کوئی بھی دوا یا غذا ہضم نہ ہوتی ہو تو

حب حالبس قے پانی سے کھلائیں۔

اعدد

اس کے ایک گھنٹے بعد شریت ترمہندی

چلائیں، یا

گل قند اور سکجین ہم وزن ملا کر دن میں تین بار کھلائیں۔

بہ طور غذا اگر مکی کا دلیہ یا ستو کھلایا جائے

تو بہت مفید ہے۔

دیگر بکئی کے بچے کے بال جلا کر اس راگھ

کو شریت انار میں ملا کر ٹپا نا بھی حاملہ کی قے کو روکتا ہے۔

انائشیریں اور شرے کارس پلائیں۔
آب لیوں پانی میں ملا کر پلانا بہت مفید ہے۔

کولہ اور مٹی وغیرہ کھانے کی خواہش

بعض حاملہ عورتوں کو زمانہ حمل میں کولہ اور مٹی وغیرہ کھانے کی خواہش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حاملہ اور بچہ دونوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اس خراب عادت کو چھوڑنے کے لیے حاملہ کو بھی اپنی قوت ارادی سے کام لینا چاہیے اور علاج میں سب سے پہلے

روغن سید انجیر ہم ۲ گرام دودھ میں ملا کر پلائیں۔ اس کے بعد روزانہ صبح کو: گل قند، سکجین سادہ ہم وزن لے کر کھلائیں۔

اگر سوندھی خبیروں کے کھانے کو طبیعت چاہے تو کچا کھوپرا، طباشیر یا چنے بھرنے ہوئے کھلائیں۔

ماغیہ کی درستی کے لیے

بعد غذا: قرص گل آکھ پانی سے کھلائیں۔

۲-۲ عدد

قبض

Constipation

حاملہ کے قبض کو دور کرنے کی بہتر تدبیر یہ ہے کہ اس کو غذائیں سبز ترکاریاں، ساگ پات اور تازہ پھل مثلاً ارنڈ، خر بوزہ (پیتیا) اور دوسرے آم وغیرہ کھلائیں۔ روزانہ صبح و شام چلنے پھرنے کی ہدایت کریں۔ بہ طور دوا

رات کو: گل قند یا مر یا ہلیدہ کھلائیں۔ اگر اس ۲۲ گرام عدد

کے ساتھ دودھ میں لال شکر ملا کر ملا یا جاکے تو زیادہ فائدہ مند ہے یا روغن بادام شیریں ۶ ملی لٹر دودھ میں ملا کر پلائیں۔

اسہال (دست آنا)

Diarrhoea

شروع میں ایک دو وقت تک کوئی غذا نہ کھلائی جائے اور نہ کوئی دوا دی جائے۔ اگر دست زیادہ آجائیں اور کمزوری زیادہ ہو جائے

تو مونگ کی دال کی نرم کھچڑی اور دہی کھلائیں۔ دہی کی جگہ چھاچھ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ان تدابیر سے اسہال بند نہ ہوں تو صبح کو: قرص پیمپش پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

اگر حاملہ کو ضعفِ معدہ و امعاء کی وجہ سے اسہال کی شکایت ہو تو بعد غذا: حب رال پانی سے کھلائیں ۱-۱ عدد

سفوف آملہ بھی دست بند کرنے کے لیے مفید ہے۔

سفوف آملہ: آملہ خشک بہ قدر ضرورت کوٹ چھان کر سفوف بنائیں۔ خود رات: تین تین گرام صبح و شام پانی سے کھلائیں۔

پیمپش

Dysentery

غذائیں کھچڑی، دہی یا دلیہ کھلائیں اور کوئی غذا نہ دیں۔ اگر اس سے افاقہ نہ ہو تو صبح کو: روغن بیدانجیر ۲۲ ملی لٹر دودھ میں

صورت میں دایہ اپنی دو انگلیاں داخل کر کے
فم رحم کو اوپر کی طرف اٹھا دیتی ہے اور پیشاب
آجاتا ہے۔ اگر کوئی پیچیدہ صورت ہو تو کسی
ہوشیار لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔

پیشاب کا بار بار آنا

حمل کے ابتدائی یا آخری دنوں میں مثلاً
میں خراش ہو کر پیشاب بار بار آنے لگتا ہے۔
اگر حمل کے شروع میں یہ شکایت ہو تو
صبح و شام کو؛ آتش جو (بارے واٹر) شربت
بزدری ملا کر پلائیں۔

اگر پیشاب میں جلن ہو تو
بعد غذا: قرص الکلی پانی سے کھلائیں

۱-۱ عدد

دودھ اور سوڈا ملا کر پلائیں۔

اگر حمل کے آخری دنوں میں یہ شکایت ہو (اکثر
اس کی وجہ مجری البول پر رحم کا دباؤ پڑنے
سے ہوا کرتی ہے) تو دایہ کو ہدایت کر دیں کہ وہ
دو انگلیوں سے رحم کو اوپر اٹھا دے۔ وضع
حمل کے بعد یہ شکایت خود بخود دور ہو جاتی
ہے۔

ملا کر پلائیں۔

جب ایک دو دست آکر آنتیں اور معدہ
صاف ہو جائے تو پھر
صبح کو: قرص بحیش پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

سم پہر کو: مرتباً بیگماری ورق فقرہ پیٹ کر
۱۲ گرام ۱ عدد

کھلائیں۔ اگر موسم ہو تو

آب بیل گری پلائیں۔

رات کو: اسپنڈل مسلم دہی میں ملا کر رکھیں جب
۱۰ گرام

پھول جائے تو چمچے سے کھلائیں اور دانوں
سے نہ چبائیں۔

پیشاب کا بند ہو جانا

Retention of urine

دودھ کی لسی شربت بزدری ملا کر پلائیں۔

یا دودھ اور سوڈا ملا کر پلائیں۔ اگر اس سے پیشاب
نہ آئے تو کسی ہوشیار دایہ کو دکھلائیں، کیوں کہ
بعض اوقات زمانہ حمل میں پیشاب کی نالی پر
دباؤ پڑنے سے پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ اس

مستوں پر مرہم بواسیر جدید لگا کر اسی بھنگ کی
تکلیف باندھ دیں۔

شرم گاہ کی خارش

غذا میں نمک مرچ، گرم مسالہ اور گڑ و شکر
وغیرہ کا استعمال بہت کم کر دیں و صرف سبز
ترکاریاں، کم نمک مرچ ڈال کر کھائیں، بعداً
نیم گرم پانی سے دھوئیں، مقام ماؤن پر
مرہم خارش جدید لگائیں۔

اگر جلن شدید ہو تو

مرہم کا فوراً لگائیں۔

بعد قذا: قرص الکی پانی سے کھلائیں۔

۱-۱ عدد

رات کو: قرص مسکن پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

ضماد: رسوت، کافور، عرق گلاب میں پیس کر
لگائیں۔

سفید طوبت بہنا (سیلان الرحم)

Leucorrhoea

اندام نہانی کو دن میں کئی بار سرد پانی سے

بواسیر

Piles

حاملہ کو قبض نہ ہونے دیں۔ اس منصفیہ
رات کو: گل قند یا مرتابہ لیلہ کھلائیں، یا
۲۲۷ گرام عدد

سیس اسپیغول پانی سے کھلائیں۔

۶ گرام

شام کو: مرکب پانی سے کھلائیں۔

عدد

اگر مستوں میں ورم اور جلن ہو تو

مرہم بواسیر جدید لگائیں۔

اگر مستوں سے خون آ رہا ہو تو

صبح کو: قرص حالب پانی سے کھلائیں۔

عدد

شام کو: منڈرزا پانی سے کھلائیں۔

۲ عدد

رات کو: گل قند کھلائیں۔

۲۲۷ گرام

اگر مستوں میں تکلیف شدید ہو تو

بھپارہ: برگ بھنگ ۱۲ گرام دو دھویں

یا پانی میں پکا کر مستوں کو اس کا بھپارہ دیں۔ پھر

نوٹ: عام طور پر حاملہ عورتوں کو یہ تکلیف
بچہ پھرنے کے بعد خود بہ خود دور ہو جاتی ہے۔

خون کی کمی

Anemia

زود ہضم مقدوی غذائیں دودھ، مکھن،
نیم برشت انڈے، تازہ پھل وغیرہ کھلائیں۔
صبح کو: دوائے غذائی دودھ کے ساتھ کھلائیں۔
۱۲ گرام

سہ پہر کو: منڈوزا کھلائیں۔

۲ عدد

اگر کمی خون کی وجہ سے ہاتھ پیر ٹھنڈے رہتے
ہوں، دل دھڑکتا ہو، بے حد کمزوری ہو تو
صبح کو: دولے غریزی کھلائیں۔

۱ عدد

بعد غذا: سیال شیریں پانی میں ملا کر پلائیں۔

۵-۵ قطرے

بخار

Fever

اگر قبض ہو، نزلہ و زکام اور کھانسی بھی ساتھ

ہو تو

دھوئیں قبض نہ ہونے دیا جائے۔ اگر اس تدبیر
سے رطوبت میں کمی نہ ہو تو

پھٹکری، پانی میں ملا کر اس سے
۳۳ گرام ۱/۲ کلو

اندام نہانی کو دھوئیں۔

صبح کو: قرص سیلان خاص دودھ سے کھلائیں۔
۱ عدد

بول زلالی

Albuminuria

اس مرض میں بطور غذا دودھ، آش جو،
یاسوڈا واٹر ملا کر پلائیں۔ گوشت اور نمک قطعی
نہ کھلائیں گرم پانی سے غسل کریں۔ گردوں کی
بھی گرم پانی سے سینک کریں۔

صبح کو: منڈوزا پانی سے کھلائیں۔

۲ عدد

شام کو: زیرہ سفید، مکہ خشک پانی میں جوش

۶ گرام ۶ گرام

دے کر چھان کر پلائیں۔

رفع قبض کے لیے

رات کو: قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔

۱ عدد

صبح کو: جوشینا گرم پانی ملا کر پلائیں۔

۹ لیٹر

رات کو: سعالین گرم پانی میں گھول کر پلائیں۔

۴ عدد

اگر بخار بہت پرانا ہو گیا ہو اور ہلکا ہلکا بخار

ہر وقت رہتا ہو تو

صبح کو: ثمریت خاکسی گرم پانی ملا کر پلائیں۔

۹ لیٹر

قبض کی صورت میں

رات کو: گل قند کھلائیں۔

۲۴ گرام

زچہ کے امراض

باؤ گولہ (گھیلن کا درد)

بچہ پیدا ہونے کے چند گھنٹے بعد رحم میں

اینٹھن کے ساتھ درد ہونے لگتا ہے۔ اس درد

کا یہ فائدہ ہے کہ رحم میں جو آلائش اور رطوبت

باقی رہ جاتی ہے وہ بہ خوبی خارج ہونے لگتی

ہے اور جب رحم کی صفائی ہو جاتی ہے تو

دو تین یا ایک ہفتے تک میں یہ درد خود بخود

بند ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ درد شدید ہو تو

صبح و شام کو: دوائے ادجلع چلئے کے ساتھ

اگرام

کھلائیں، یا مندرجہ ذیل جوشاندوں میں

سے کسی ایک کے ساتھ کھلائیں۔

جوشاندہ نارجیل: پرانا کھوپرا، صغرفاسی

۱۲ گرام ۴ گرام

پانی میں جوش دے کر چھان کر پلائیں، یا

جوشاندہ خمر پزہ: پوست خمر پزہ ۱۲ گرام

پانی میں جوش دے کر چھان کر پلائیں۔ اس سے

جلدی فائدہ ہونے لگتا ہے۔

تمکمید: گل ٹیسو، پوست خشکاش، پانی

۶۰ گرام ۲۴ گرام ۲ کلو

میں جوش دے کر اس میں کپڑے کی گڈی بھگو کر

اس سے پیرو پرسینگ کریں۔ اس سے اندام نہانی

کا درم اور درد جاتا رہتا ہے۔

خون نفاس کی بندش

اگر زچہ کا خون نفاس قبل از وقت بند

ہو جائے تو پیرو اور اندام نہانی کی سینک کریں

اور اس کے بعد

کپڑے کی گدڑی بھگو کر پیرو پر رکھیں مگر می کے
موسم میں اس کو برف سے سرد کر لیں تو زیادہ
فائدہ مند ہے۔

زچہ کا بخار (پرسوت کا بخار)

Puerperal fever

یہ بخار عام طور پر خونِ نفاس بند ہوجانے
اور اندامِ نہانی میں عفونت پیدا ہونے کی وجہ
سے ہوتا ہے، اس لیے مریضہ کے سر اور چھاتیوں
کو ملائم تکیوں کے سہارے اوپچا رکھیں، تاکہ
خونِ نفاس کے اخراج میں مدد ملے
اور اندامِ نہانی کی صفائی کے لیے
زروق: برگ نیم، کلیلہ، سہاگہ، پانی میں
۶ گرام ۲ گرام ۶ گرام ۶ گرام ۶ گرام
جوش دے کر چھان کر پچکاری کے ذریعے رحم
کو دھوئیں۔

اگر پیٹ میں اچھارہ اور درد ہو تو
نمک گرم پانی میں ملا کر اس میں کپڑے کی
گدڑی بھگو کر اس سے پیٹ کی سینک کریں۔
اگر قبض ہو تو

قرص ملین نیم گرم پانی سے کھلائیں۔
۲ عدد

جوشاندہ مدر: کپاس کے ڈوٹے، پوست خربزہ
۲۴ گرام ۱۲ گرام

مکونشک، گڑ پڑانا پانی میں جوش دے کر اود
۶ گرام ۲۴ گرام

چھان کر پلائیں، یا

دیگر جوشاندہ مدر: پوست امتاس،
۲۴ گرام

پوست خربزہ، پڑانا گڑ پانی میں جوش دے کر
۱۲ گرام ۲۴ گرام
چھان کر پلائیں۔

اگر گرمی کا موسم ہو تو ان جوشاندوں میں گڑ کی
کی بجائے شربت بزوری یا چینی ملا کر پلائیں۔

خون کا زیادہ آنا

جریانِ خون بعدِ ولادت

شدت کی حالت میں زچہ کے بازو کس کر
باندھیں۔ زچہ کی چار پائی کی پانسی کو اوپچا کریں۔
صبح و شام کو: قرص حالبس پانی سے کھلائیں
۲-۲ عدد

پیرو پر عرق گلاب، سرکہ خالص ملا کر اس میں
۱۲۰ ملی لیٹر ۶۰ ملی لیٹر

سے خراش پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بچے کو دودھ نہ پلایا جائے۔

دودھ کی کمی

زچہ کو دودھ، مکھن، بالائی، کھیر اور فرنی وغیرہ غذائیں کھلائیں۔

صبح کو: دوائے غذائی دودھ سے کھلائیں۔
۱۲ گرام

دولے شیر افزا: ستاور، زیرہ سفید دونوں برابر وزن کوٹ چھان کر اس کے برابر وزن شکریہ سفید ملا کر رکھیں اور روزانہ صبح و شام بارہ بارہ گرام دودھ سے کھلائیں۔ اس سے دودھ کی پیدائش بہت ہوتی ہے۔

دودھ کی زیادتی

اس کو کم کرنے کے لیے زچہ کو دودھ بالائی اور مکھن جیسی چیزیں کھانے کو کم دی جائیں اور تیسرے چوتھے روز کوئی مسہل دیتے رہیں۔
چھاتیوں پر
ضماد عدس: مسور، زیرہ سفید سر کر میں پیس کر لپ کریں، یا

جب قبض دور ہو جائے تو صبح کو: قرص بخار پانی سے کھلائیں یا اس کے

اعداد

ساتھ حسب ذیل جوشاندہ پلائیں:

جوشاندہ حمی نفاسیم: بادیان، کو خشک، پوست بیج کپاس، تخم خربزہ نیم کوفتہ اند خار خشک خورد نیم کوفتہ ہر ایک چھ گرام پانی میں جوش دے کر چھان کر عینی سے میٹھا کر کے پلائیں۔

بھٹنی کا زخم

شروع میں جب خراش ہو تو ہمدرد مرہم لگائیں۔

اگر زخم بن جائے تو اس کو برگ نیم کے جوشاندہ سے دھو کر

مرہم کا فور لگائیں۔

احتیاط: اگر بچے کو دودھ پلانے سے پہلے اور دودھ پلانے کے بعد چھاتیوں کو پانی سے دھو لیا جائے تو یہ مرض نہیں ہوتا ہی کیونکہ دودھ پلانے کے بعد چھاتیوں کو نہ دھونے سے ان کی بھٹنیوں پر دودھ جم جائے کرتا ہے، جس

ضاد کا فور: کھریا مٹی، مازد سبز، کافور
۱۲ گرام ۶ گرام ۳ گرام

سرک میں پیس کر لپ کریں۔

ہدایات: چوں کہ وضع حمل کے وقت زچہ کو سخت صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی خبر گیری اور حفاظت کے لیے حسب ذیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔

(۱) زچہ کا مکروہ صاف ستھرا اور ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں روشنی اور ہوا کا گزرا بھی طرح ہوتا رہے (۲) زچہ کے کپڑے اور بستر روزانہ تبدیل کیے جائیں (۳) زچہ کو کم از کم ایک ہفتے تک بستر پر سے نہ اٹھنا چاہیے، کیوں کہ جلدی نقل و حرکت کرنے سے زیادہ جریان خون ہونے کا اندیشہ رہتا ہے (۴) ایک جیسے تک بدن پر سرد پانی نہ ڈالا جائے۔ اس سے نفاس بند ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ البتہ گرم پانی میں تولیہ یا کوئی موٹا کپڑا بھگو کر اس سے جسم کی صفائی کر لیا کریں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا (۵) وضع حمل کے بعد چند روز تک زچہ کو لطیف اور زود ہضم غذا، دودھ، ساگودانہ

بکری کے گوشت کا شوربا اور چائے وغیرہ دی جائے اور رفتہ رفتہ معمولی غذا پر لائیں (۶) بچہ ہونے سے چھ گھنٹے بعد زچہ کو پیشاب آجانا چاہیے۔ اگر پیشاب نہ آئے تو پیڑ و اور اندام نہانی پر سینک کریں۔ اگر چوبیس گھنٹے تک اجابت نہ ہو تو روغن بیدارنجیر (کمیسٹر آئل) ۲۵ ملی لٹر گرم دودھ میں ملا کر پلائیں تاکہ اجابت ہو کر پیٹ صاف ہو جائے (۷) بچہ کی ولادت سے سات آٹھ گھنٹے بعد بچے کو ماں کا دودھ ضرور پلایا جائے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پستان کو منہ میں لے کر کھینچتا ہے تو اس وقت رحم سکڑتا ہے۔ اس سے رحم کی آلائش خارج ہونے میں مدد ملتی ہے اور پستان کا تناؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پہلا دودھ قدرتی طور پر قبض کشا ہوتا ہے جو بچے کے لیے مہل کا کام دیتا ہے (۸) اگر پیاس کے وقت زچہ کو نیم گرم پانی پلایا جائے۔ بالخصوص سردی کے موسم میں تو بہت فائدہ مند ہے اس سے خون نفاس کے اخراج میں مدد ملتی ہے۔ اس کے برخلاف زیادہ سرد پانی پلانے سے خون نفاس کے بند ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔

بچوں کے امراض

بچوں کی مریگی (کیڑے)

Infantile Epilepsy

اگر قبض ہو تو گلیسرین کا شافنیچے

کے پاخانے کی جگہ اندر داخل کریں یا روغن بنجد
تین ٹی لٹر دودھ میں ملا کر یا شہد میں ملا کر پلائیں
اور ہاضمے کی درستی کے لیے سہاگہ بھونا ہوا ماں
کے دودھ میں گھول کر کچھ روز تک پابندی کر
کھلاتے رہیں۔

صبح کو: قرص مسکن پانی یا ماں کے دودھ میں
۱/۴ عدد

گھول کر پلائیں۔

شام کو: نوہال گراپ سیرپ پلائیں۔

۲ ٹی لٹر

اگر بچے کے پیٹ میں چڑنے (چوٹے) ہوں

تو ان کا علاج کریں۔

صبح کو: کیدہ مصفیٰ، نوہال گراپ سیرپ میں

۱۲۵ ٹی گرام ۲ ٹی لٹر

ملا کر کھلائیں۔ یا

شریت بلین اطفال پلائیں، یا

۳ ٹی لٹر

یہ سفوف کھلائیں۔

سفوف ثلاثہ: پوست ہیلہ نرد ترید سفید

پودینہ خشک ہر ایک برابر وزن کوٹ چھان کر

رکھیں۔ خوراک ایک سال کے بچے کو ایک گرا

پانی میں گھول کر پلائیں۔

ھلا یا ت: اگر بچہ ماں کا دودھ پیتا ہو تو

ماں کو اپنے ہضم کا خیال رکھنا چاہیے۔ دورے

کے وقت بچے کے گلے، سینے اور سر کی بندش کو

ٹوھیل کر دیں۔ چہرے پر سرد پانی کے چھینٹے

ماریں۔ ہاتھ پاؤں کو یکڑے رہیں اودان کو

نیچے کی طرف کھینچیں۔ دورہ دور ہونے کے

بعد روغن گل یا مکھن گرم پانی میں ملا کر بدن پر

مالش کریں تاکہ تشنج کا بقیہ اثر بھی جاتا رہے۔

بچے کا نیند میں ڈرنا

Nightmare

بچوں میں اس کا سبب عام طور پر ہضم

کی خرابی، دانت نکالنا اور پیٹ کے کیڑے

ہوا کرتا ہے۔ اس کا علاج ہضم کی اصلاح ہے۔

لیپ کریں۔

آنکھیں دکھنا (آشوب چشم)

Conjunctivitis

آنکھوں کو صاف رکھیں۔ روزانہ تر بھلا
پانی میں بھگو کر اس سے آنکھوں کو دھوئیں۔
قطرہ چشم ڈرا پر سے آنکھیں ٹالیں۔
سرمہ مطب روزانہ آنکھوں میں لگائیں۔

روہے (کمرے)

جرب الاجفان

ہاضمے کی درستی کے لیے
شربت ملین اطفال بلائیں اور
۳ ملی لٹر
شیاف اکیس چشم پانی میں گھس کر لگائیں۔

کان بہنا (سیلان الافن)

Ot orrhoea

صبح کو: نو نہال گراپ سیرپ پلائیں۔
۳ ملی لٹر
سپہر کو: منڈوزا پلہ عدد پانی میں گھول کر پلائیں۔

مقررہ اوقات پر مناسب مقدار میں دودھ پلایا

جائے۔ اگر دانت نکالنے کا زمانہ ہو تو

نو نہال گراپ سیرپ پلائیں۔

اگر پیٹ میں کیرٹے ہوں، قبض رہتا ہو تو

شربت ملین اطفال گرم پانی میں ملا کر

۳ ملی لٹر

پلائیں۔

بیاس کی زیادتی (عطاش)

Polydipsia

بچے کو ٹھنڈا پانی پلاتے رہیں، یا ایک
گلاس پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کر پلاتے رہیں
دوائے عطاش: طباشیر، تخم خرفہ،
مغز کنول گٹھ ہر ایک چھ گرام، دھان کی
کھیل ۲۵ گرام سب کو نیم کوفتہ کر کے ایک
کپڑے میں پوٹی باندھ کر پانی کی صراحی میں ڈال
دیں اور یہ پانی بچے کو تھوڑا تھوڑا پلاتے رہیں۔
اگر بیاس شدید ہو، بچے کا تالو بھی بیٹھ
گیا ہو، دست آرہے ہوں تو

ضما دتالو: پوست آملہ، پوست ہلیلہ زرد
اور صندل سفید پانی میں پیس کر سرکہ تالو پر

پلائیں

روغن کبیلہ دو قطرے کان میں ڈالیں۔

نزلہ وزکام

Cold & Catarrh

صبح کو: جوشینا گرم پانی میں ملا کر پلائیں۔
۳ ملی لٹر

اگر کھانسی زیادہ ہو تو
رات کو: سعالین گرم پانی میں گھول کر پلائیں۔
۲ عدد

اگر قبض شدید ہو تو
شربت ملین اطفال گرم پانی میں ملا کر پلائیں۔
۳ ملی لٹر

اگر کھانسی شدید ہو تو
صبح و شام: صدوری چٹائیں
۳-۳ ملی لٹر
ہلکیا ت: بچے کے سر، پیشانی، گلے اور
سینے کو سرد ہوا سے بچائیں۔ ٹھنڈی ہوا نہ دینا
پیماس کے وقت نیم گرم پانی پلائیں۔ اگر
پھاتی میں درد ہو تو ہمدرد بام کی مالش کریں۔

کان کا درد

Otalgia

قلزم روغن گل میں ملا کر دو قطرے کان
میں ڈالیں۔

اگر نزلہ وزکام کی وجہ سے ہو تو
صبح و شب کو: جوشینا گرم پانی میں گھول کر
۳-۳ ملی لٹر

پلائیں۔

منہ آنا (قلاع)

منہ میں قلاعی پھریری سے لگائیں۔
اگر ہاضمہ خراب ہو تو
صبح و شام: نو نہال گرائپ سیرپ پلائیں۔
۱۴، ۱۴ ملی لٹر

اگر دست آرہے ہوں تو
رات کو: حب نہر کچر پانی میں گھس کر پلائیں۔
۱ عدد

اگر قبض رہتا ہو تو
صبح کو: شربت ملین اطفال گرم پانی میں ملا کر
۳ ملی لٹر

کالی کھانسی (شہیقہ)

Whooping cough

صبح کو: حب شہیقہ گرم پانی میں گھول کر پلائیں۔
اعدد

رات کو: شربت ریوی گرم پانی میں ملا کر پلائیں
۳ ملی لٹر

دن میں ایک دو دفعہ صدوری چٹائیں۔ سینے
پر سہرہ دیام کی مالش کریں۔

ڈبہ اطفال (پسلی چلنا)

صبح و شب کو: جوشینا گرم پانی میں ملا کر پلائیں۔
۳-۳ ملی لٹر

سینے اور پسلیوں پر سہرہ دیام لگائیں۔
اگر درد شدید ہو تو ضما دراحت لگائیں۔

صبح و شام کو: حب ڈبہ اطفال دو دفعہ میں
۱-۱ عدد

گھول کر پلائیں۔

ضما د بارہ سنگا: بارہ سنگے کا سنگ پتھر
پر گھس لیں پھر اس میں تھوڑا سا ایلوا اور زردی
بیضہ مرغ ملا کر پسلیوں پر لپک کریں، یا

روغن سرسوں یا روغن کنجد میں روغن تارپن
۱۲ ملی لٹر ۱۲ ملی لٹر ۳ ملی لٹر

ملا کر سینہ اور پسلیوں پر مالش کریں۔

تشخیصی نکات: چوں کہ کبھی اس
مرض میں بھی تے اور دست آنے لگتے ہیں اس
لیے تشخیص میں مغالطہ ہو جاتا ہے۔ اس مرض
کی مخصوص علامات یہ ہیں کہ چہرے کی رنگت
نیلگوں ہوتی ہے اور ناک کے نتھنے بہت
پھولتے ہیں۔ سانس لیتے وقت پسلیوں کے
مقام پر گرٹھا پڑتا ہے۔ موسمی اسہال میں بچے
کی آنکھیں اندر دھنسی ہوتی ہیں اور چہرے کی
رنگت زرد ہوتی ہے۔

نوٹ: بعض عورتوں کے بچے ہمیشہ اس مرض
میں مبتلا ہو کر مرتے رہتے ہیں۔ اگر ایسی عورتوں کو
حل کے زمانے میں پانچ سات بار خرگوش کا
گوشت کھلایا جائے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد
دودھ پلانے کے زمانے میں کبھی کبھی خرگوش کا
گوشت کھلاتے رہیں اور چند بار خرگوش کے
خون کا ایک ایک قطرہ ماں کے دودھ میں حل
کر کے بچے کو پلائیں تو اکثر بچہ اس مرض سے
محفوظ رہتا ہے۔

قے

Vomiting

جب تک بچے کو قے آتی رہے بچے کو دودھ نہ پلایا جائے۔ اگر قے شدید ہو تو

حب حالب قے پانی میں گھس کر پلائیں۔
۱/۴ عدد

اگر بچہ باناری دودھ پیتا ہو تو اس میں لاکھم واک ملا کر پلائیں، یا

صبح کو: نو نہال گراپ سیرپ پلائیں۔
۱/۴ ملی لٹر

شام کو: حب نر کچور پانی میں گھس کر پلائیں، یا
۱ عدد

پودینہ خشک، الائچی خورد مسلم، نر کچور نیم کوفتہ
۳ گرام ۳ عدد ۱ گرام

پانی میں جوش دے کر چھان کر تھوڑا تھوڑا
پلائیں۔

اچھارا (نفخ شکم)

Flatulence

پیٹ کی گرم کپڑے سے سینک کریں، یا
تھوڑی سی ہینک پانی میں گھول کر اس میں

روٹی کا پھایا بھگو کر ناف پر رکھیں۔

قرص گل آکھ پانی میں گھول کر پلائیں۔
۱/۴ عدد

اگر قبض ہو تو شافہ گلیسرین مقعد میں
رکھیں اور

شریت ملین اطفال نیم گرم پانی میں
۳ ملی لٹر

ملا کر پلائیں۔

دست آنا (اسہال)

Diarrhoea

اگر مضمی کے سبب سے دست آرہے ہوں
تو دودھ پلانے میں کمی کریں۔

صبح کو: نو نہال گراپ سیرپ پلائیں۔
۳ ملی لٹر

شام کو: حب نر کچور پانی میں گھول کر پلائیں۔
۱ عدد

اگر گرمی کی وجہ سے دست آرہے ہوں تو

انڈے کی سفیدی کا پانی تیار کر کے پلائیں
اور نارجل دریائی، طباشیر زہر مفر خطائی
مفر کنول گتہ پانی میں پیس چھان کر پلائیں۔

اگر شدید دست ہوں تو

حب ساق پانی میں گھول کر پلائیں
۱/۲ عدد

اگر دانت نکل رہے ہوں، مسوڑھے پھوٹے
ہوئے ہوں تو مسوڑھوں میں شگاف دلائیں
یا سہاگہ بریاں شہد خالص میں ملا کر مسوڑھوں
پر لگائیں اور

صبح و شام: نوہال گراپ سیرپ پلائیں۔
۳ ملی لیٹر

رات کو: حب نر کچر پانی میں گھول کر پلائیں۔
اعد

پیٹ کے کیڑے (چرنے)

• Intestinal Worms

صبح و رات کو: قرص دیدان جدید پانی میں
۱/۲، ۱/۲ عدد

گھول کر پلائیں۔

چوتھے روز

صبح کو: روغن بیدانجیر دودھ میں ملا کر پلائیں۔
۳ ملی لیٹر

انڈیا آڑو کی کوئیلوں کا پانی نکال کر

پاخانے کی جگہ لگائیں، یا

دوائے خارش: کافور، ویسین ملا کر
اگر ۱۲ گرام

پاخانے کی جگہ لگائیں۔ اس سے خارش بند
ہو جاتی ہے۔

اگر پیٹ میں کدو دانے ہوں تو پہلے
روغن بیدانجیر ملا کر آنٹوں کو صاف کریں پھر
صبح کو: کیدہ مصفیٰ نوہال گراپ سیرپ میں

ملا کر پلائیں، یا

شربت ملین اطفال نیم گرم پانی میں ملا کر
۳ ملی لیٹر

پلائیں، یا اس کی بجائے جوشاندہ انار پلائیں۔
جوشاندہ انار: انار ترش کی جڑ کی چھال
۶ گرام، پانی میں جوش دے کر چھان کر پلائیں یا
دوائے تخم کدو: تخم کدو شیریں ۲ گرام کوٹ کر
شہد خالص میں ملا کر رکھیں اور صبح کو نہار منہ
بچے کو کھلائیں پھر اس کے تین چار گھنٹے بعد
روغن بیدانجیر پلا دیں۔ کدو دانوں کو خارج
کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔

بستر پر پیشاب نکل جانا

(بول فی الفراش)

Nocturnal Emission

صبح و شام کو: قرص ماسک البول جدید پانی
۱ - ۱ عدد

سے کھلائیں۔

اگر ہاضمہ خراب ہو، یا آنتوں میں کیڑے ہوں،
یا مثانہ میں پتھری ہو تو ان امراض کا علاج کیا
جائے۔

معمولی حالت میں ریوڑیاں، گزک اور
تل کے لدو وغیرہ کھلانے سے یہ شکایت
جاتی رہتی ہے۔

ھلائیات: بچے کو رات کا کھانا کم کھلائیں
اور رات کو دودھ، چائے اور کوئی سیال غذا
نہ کھلائیں۔ سونے سے پہلے پیشاب کرنے کی
تاکید کریں اور نیند سے جگا کر بھی ایک دو بار
رات کو پیشاب کرا دیں۔ اگر بچہ رات میں بستر
پر پیشاب کر دے تو اس کو سخت الفاظ نہ
کہیں، بلکہ پیشاب نہ کرنے پر اس کی تعریف
کریں چاول اور ترش اشیاء سے پرہیز کرائیں۔

کانچ نکلنا

اگر بچہ کمزور ہو تو

صبح کو: نو نہال گرائپ سیرپ پلائیں۔

۳ ملی لٹر

شام کو: منڈونا پانی میں گھول کر پلائیں۔
۱ عدد

اگر بچہ پیش ہو تو پہلے

صبح کو: روغن بیسا بنجر دودھ میں ملا کر پلائیں۔

۳ ملی لٹر

رات کو: قرص سچیش پانی میں گھول کر پلائیں۔

۱ عدد

رفع حاجت کے بعد

دولے آب دست: ناسپال (پوست انار)

پوست درخت کیکر پانی میں جوش رے کر کھیں

وقت غروب چھان کر اس سے آب دست

کرائیں اور

مازو، پھٹکری پیس کر پانی میں ملا کر اس

اگرام اگرام

میں روئی بھگو کر کانچ پر لگائیں اور اس کو

اندر کر کے لنگوٹ بندھوا دیں۔

کساح (ہڈیوں کا نرم پڑ جانا)

Rickets

اس بیماری کے علاج میں بچے کی غذا کی طرف خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ اگر بچہ ماں کا دودھ پیتا ہو اور اس کی خرابی سے یہ مرض ہو تو ماں کے دودھ کی اصلاح اور اس کی جسمانی صحت کی بحالی کے لیے اچھی غذائیں دودھ، مکھن، اندڑے اور تازہ پھل وغیرہ دیے جائیں۔ اگر بچہ ماں کا دودھ نہ پیتا ہو اور اس کی پرورش ادھر کے دودھ سے ہو رہی ہو تو اس کو تندرست جانور کا دودھ چرنے کا پانی ملا کر پلایا جائے۔ نیم برشت اندڑے کی زردی کھلائیں۔ گاجر ٹاٹا، سنہرہ اور موسمی کالہ پس پلائیں۔ ان کے علاوہ مچھلی کا تیل بھی نہایت مفید ہے۔ یہ ضرور پلائیں۔ اس کے علاوہ بچے کو صاف اور کھلی ہوا اور روشنی میں رکھا جائے اور صبح کو بچے کو ننگا کر کے دھوپ میں لٹائیں، تاکہ سورج نکلتے وقت کی شعاعیں اس کے جسم پر پڑیں، اور بطور دوا

صبح کو: دوائے غذائی ۳ گرام دودھ میں گھول کر

پلائیں۔

رات کو: نو نہال گراپ سیرپ پلائیں

۳ ملی لٹر

موتی جھرہ اور چیچک

Typhoid fever & Small Pox

صبح و رات کو: شربت خاکسی گرم پانی میں ملا کر

۳-۳ ملی لٹر

پلائیں۔

اگر اس کے ساتھ کھانسی ہو تو

سہ پہر کو: صدوری چٹائیں، یا

۳ ملی لٹر

سعالین گرم پانی میں گھول کر پلائیں۔

۴ قرص

اگر قبض ہو تو

شربت بلین اطفال گرم پانی میں گھول کر پلائیں۔

۳ ملی لٹر

گلے پڑنا (درم لوزٹین)

Tonsillitis

صبح کو: جوشینا ۳ ملی لٹر پانی میں گھول کر پلائیں۔

اگر کھانسی شدید ہو تو
 رات کو، سعالین گرم پانی میں گھول کر پلائیں۔
 ۲ عدد
 دوائے گلو پھریری سے گلے میں لگائیں۔
 اگر درد ہو، باہر کی طرف درم ہو تو
 ضنا در راحت باہر گلے پر لگائیں
 اگر قبض ہو تو
 شربت ملین اطفال گرم پانی میں گھول کر
 ۳ ٹی لٹر
 پلائیں۔

اتفاقی حادثات

Accidents

Burns & Scalds

آگ سے جلنا

جب کسی وجہ سے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو اس وقت بھاگنا دوڑنا مناسب نہیں ہے بلکہ زین پر لیٹ کر پٹیاں کھائیں۔ اس طریقے سے آگ بجھ جائے گی۔ اس کے بعد کپڑوں کو قینچی سے کاٹ کر بدن سے اتار دیں اور سوڈا تھوڑے سے پانی میں ملا کر جلے ہوئے حصے پر لگائیں۔ اگر سوڈا موجود نہ ہو تو کچا آلو پیس کر لگائیں۔ اس کے لگانے سے عموماً جلن موقوف ہو جاتی ہے اور آبلہ پڑنے کی نوبت نہیں آتی، لیکن اگر آبلے پڑ جائیں تو ایک باریک سوئی لے کر آگ میں تپائیں۔ اس کے بعد اس کی نوک سے آبلوں کو چھید کر پانی نکال دیں اور اس کے بعد چرنے کا پانی اور اسی کا تیل یا روغن ناریل برابر وزن ملا کر پھینٹیں، جب مرہم سا بن جائے تو زخموں پر لگائیں۔ زخم جلدی اچھا ہو جائے گا اور جلن بھی جلدی ختم ہو جائے گی۔ کھولتے ہوئے پانی، کڑا کراتے ہوئے تیل اور بھڑکتی ہوئی بارود سے جل جانے کی حالت میں بھی مذکورہ بالا علاج کیا جائے، لیکن اگر جسم کا بہت سا حصہ جل گیا ہو اور تکلیف شدید ہو تو فوراً کسی ہسپتال میں مرلین کو پہنچا دیا جائے۔

آنکھ میں کچھ پڑ جانا

Foreign Body in the Eye

جب آنکھ میں کوئی بھنگا یا ذرہ گر جائے تو اس کو ہاتھ سے نہ ملیں، بلکہ چت رٹا کر آنکھ کا پمپوٹ اُلٹ کر غروب سے دکھیں۔ گری ہوئی چیز نظر آجائے گی۔ اس کو صاف روئی یا رمال کے ذریعے الگ

کر دیں۔ اگر آنکھ میں گری ہوئی چیز بالکل نظر نہ آئے تو ایک بڑے برتن میں صاف پانی بھر کر اس میں چہرہ ڈبو کر آنکھیں کھول دیں اور پھر بند کریں۔ عام طور پر اس طریقے سے گری ہوئی چیز آنکھ سے نکل جاتی ہے۔

لیکن اگر آنکھ میں گری ہوئی چیز اس طریقے سے بھی نہ نکلے تو رات کو آنکھ میں دوا سا گھی لگائیں اور اوپر روئی رکھ کر پٹی باندھ دیں۔ گری ہوئی چیز صبح کو میل کچیل کے ساتھ نکل آئے گی۔ اگر پہلی بار میں نہ نکلے تو دو تین بار اسی طرح کریں۔

اگر آنکھ میں بارود کا جلتا ہوا ذرہ یا آگ کی چنگاری گر جائے تو آنکھ میں دو چار بوند روغن انڈی ڈال کر روئی رکھ کر پٹی باندھ دیں۔ اس طریقے سے ذرے آنکھ سے نکل جائیں گے اور اگر ذرہ نظر نہ آئے تو پہلے اس کو نکال دیں اور پھر تیل، گھی یا انڈے کی سفیدی آنکھ میںیں ٹپکائیں۔

اگر آنکھ میں لوہے کا ذرہ گر جائے اور اس کو نکالنے کے بعد آنکھ میں خراش ہو تو انڈی کا تیل یا روغن ناریل کے دو تین قطرے ٹپکائیں۔ لوہے کے ذرے کو سنگ مقناطیس کی مدد سے بھی نکالا جاسکتا ہے۔

اگر آنکھ میں گرم گھی یا گرم تیل کی چھینٹ گر جائے تو روغن ناریل اور چونے کا پانی ہر دو برابر وزن ملا کر اس میں روئی کا پھویا بھگو کر بار بار آنکھ پر رکھیں۔

اگر آنکھ میں چونے کی چھینٹ گر جائے تو آنکھ کو فوراً صاف پانی سے دھوئیں اور اس کے بعد روغن بیدا بنجیر یا گلیسرین دو تین بوند آنکھ میں ٹپکائیں یا انڈے کی سفیدی ڈالیں۔

آنکھ میں گری ہوئی چیز نکالنے کے بعد آنکھ میں جو خراش ہوتی ہے اس کو دودھ کرنے کے لیے عورت کا دودھ یا انڈے کی سفیدی یا خالص گھی لگانا مفید ہے۔

Syncope

بے ہوشی

کسی شخص کے بے ہوش ہو جانے کے اسباب عام طور پر حسب ذیل ہوتے ہیں :

(۱) دل و دماغ کی کمزوری (۲) دماغ کی چوڑ (۳) دماغ کے بعض امراض، مثلاً مرگی اور اختناق الرحم (ہسٹیریا) (۴) بعض دہر مثلاً افیون اور دھتورہ وغیرہ (۵) جسم سے زیادہ خون نکل جانے، یا جسم کے کسی حصے پر سخت چوڑ لگنے سے بھی بے ہوشی ہو جاتی ہے (۶) پانی میں ڈوبنے، پھانسی لگنے اور خراب وزہریلی ہوا میں سانس لینے سے بھی آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔

بے ہوشی کے عام اسباب و علامات: اگر سر پر چوڑ کا نشان ہو تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دماغی صدمے سے بے ہوشی ہوئی ہے۔ اگر آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی ہیں سانس خراب سے آ رہا ہے، چہرہ ایک طرف کو کھینچا ہوا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ دماغ پر دباؤ پڑنے سے بے ہوشی ہوئی ہے۔ اگر ناک یا کان سے خون جاری ہو تو یہ اس کو بتاتا ہے کہ دماغ کے پینڈے والی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اگر کسی رگ کے کٹ پھٹ جانے سے بہت خون خارج ہو گیا ہو تو یہ بے ہوشی خون بہ افراط خارج ہونے کی وجہ سے ہے۔

دل ابید و علاج: سب سے پہلے بے ہوش شخص کی ٹانگیں سیدھی کر کے اس کے دونوں ہاتھ اس کے پہلو میں رکھ کر آرام سے چت لٹا دیں۔ اگر گلے میں مفلر لیٹا ہوا ہو، یا گلے اور سینے پر کوڑ یا اچکن کے بٹن لگے ہوئے ہوں تو ان کو کھول دیں۔ اگر کمر پر بیٹی، پٹیکا، دھرتی وغیرہ بندھی ہوئی ہو تو اس کو ڈھیلا کر دیں۔ اب بے ہوش آدمی کے چہرے کو غور سے دیکھیں۔ اگر چہرہ سرخ ہو تو سر کے نیچے تکیہ یا اند کوئی چیز رکھ کر سر کو اوجھا کر دیں، تاکہ خون نیچے کی طرف آسانی سے آتا رہے اور اگر چہرہ پتھر مڑا اور زرد ہو تو پیرول کو اوجھا اور سر کو قدرے نیچے کی طرف کر دیں تاکہ دماغ کی طرف خون کی آمد و رفت آسانی سے ہوتی رہے۔ اگر قے آنے کے آثار ہوں تو مرین کی گردن کسی ایک طرف کو کر دیں، تاکہ قے آسانی سے آجائے اور مو کی نالی میں قے کا مواد جا کر سانس کی آمد و رفت میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ اب اسباب و علامات کے لحاظ سے علاج کیا جائے۔

اگر جسم سرد ہو، چہرے کی رنگت زرد ہو تو اس حالت میں

شربت منقش پانی میں ملا کر پلائیں
۵ ملی لٹر

یا جواہر مہرہ، حب جواہر، دوار المسک معتدل جواہر والی اور عرق عنبر وغیرہ استعمال کریں۔
اگر چہرے کی رنگت سرخ ہو، جسم میں گرمی کافی ہو تو
سیال شہیہ پانی میں ملا کر پلائیں۔
۵ قطرے

یا خمیرہ مردارید خاص، حب جواہر اور عرق عنبر وغیرہ دیا جائے۔
اگر بدن کے کسی حصے سے خون نکل جانے کی وجہ سے بے ہوشی ہوئی ہے تو اس حالت میں بھی
خمیرہ مردارید خاص، حب جواہر اور عرق عنبر مفید دوائیں ہیں۔

چوٹ لگنا Trauma or Injury

جب کسی شخص کو کسی حادثے کی وجہ سے شدید یا خفیف چوٹ لگ جائے تو اس کو
فوراً آرام سے لٹائیں۔ اگر بے ہوش ہو تو اس کو ہوش میں لانے کی تدبیر کریں۔ اگر کسی جگہ سے
خون بہتا ہو تو اس کو بند کریں اور اس کے بدن کا بغور ملاحظہ کریں کہ کہاں کہاں چوٹ لگی ہے۔
اگر چوٹ ہاتھ یا کلائی پر لگی ہو تو اس کو رومال وغیرہ سے باندھ کر گردن میں لٹکائیں۔ اگر چوٹ ٹانگ
پر لگی ہو تو اس کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر اس کو سر سے قدرے اڑچھا کریں۔

اگر چوٹ خفیف ہو، مضروب ہوش میں ہو، ظاہر اور جلد پر زخم وغیرہ کا کوئی نشان
نہ ہو، البتہ جلد کے نیچے خون کے جمع ہو جانے سے نیل پڑ گیا ہو تو ایک چھٹانک (۲۳ ملی لٹر)
اسپرٹ میتھی لیٹڈ میں دو چھٹانک (۱۲۵ ملی لٹر) پانی ملا کر اس میں کپڑے کی گدی بھگو کر چوٹ کی
جگہ پر رکھیں اور اس کو برابر تر کرتے رہیں۔ اگر اسپرٹ نہ ملے تو اسی مقدار میں سرکہ خالص اور پانی
ملا کر اس سے بھی عمل کریں۔ اگر وقت پر سرکہ بھی نہ ملے تو صرف ٹھنڈے پانی میں کپڑا بھگو کر چوٹ کی

جگہ پر رکھیں اور اس کو برابر جگوتے رہیں۔ معمولی حالات میں یہی علاج کافی ہوتا ہے۔

لیکن اگر چوٹ کی جگہ سوجن ہو، پیپ پڑنے لگے تو اس پر
مرہم محلل لگائیں۔

اس کے بعد اگر زخم ہو جائے تو

مرہم رال لگائیں۔

اگر چوٹ لگنے سے جلد پھل جائے تو اس حالت میں بھی اسپرٹ لگائیں۔ اسپرٹ نہ ہونے
کی صورت میں ہلدی کو تھوڑے سے پانی میں پیس کر اس میں روئی کا پھوہ یہ نتیجہ کر اس کو تھوڑے
گھی میں پکائیں، جب پھوہ سرخ ہونے لگے تو آگ سے اتار کر ٹھنڈا ہونے پر زخم پر باندھیں
اس سے چوٹ کا درد اور زخم دونوں اچھے ہو جائیں گے، یا ہمدرد مرہم لگائیں۔

اگر سخت چوٹ لگنے سے مضروب بے ہوش ہو تو اس کے گے اور سینے کے بٹن کھول
دیں۔ گے میں مغز وغیرہ ہو تو اس کو بھی علیحدہ کر دیں اور اس کو ہوش میں لانے کی تدابیر کریں اور
ساتھ ہی یہ بھی غور سے دیکھیں کہ چوٹ کس جگہ لگی ہے۔ سر کو اچھی طرح ملاحظہ کریں۔ دونوں طرف
کے ہاتھ بیروں کا آپس میں مقابلہ کریں۔ اس طریقے سے ہاتھ یا پاؤں کی ٹوٹی ہوئی ہڈی معلوم
ہو جاتی ہے، کیوں کہ ہڈی ٹوٹ جاتے، یا جوڑ کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ عضو
بے ڈھنگا اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔

اگر سیٹ پر چوٹ لگے تو مضروب کو چپٹ بٹا کر اس کے گھٹنوں کے نیچے تکیہ رکھیں اور
اس کی رانوں کو سیٹ کی طرف جھکائیں۔ ایسا کرنے سے پیٹ کے عضلات ڈھیلے ہو کر مریض
کو آرام ملتا ہے اور اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات، جب کہ تلی یا جگر پر چوٹ
لگتی ہے تو ان اعضا کے پھٹ جانے سے مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

اگر چوٹ لگنے سے عضو ٹیڑھا ہو گیا ہو یا اس سے خون بہتا ہو تو چوٹ کی جگہ کو ننگا کر کے
خون بند کرنے کے لیے عارضی طور پر اس پر پٹی باندھ دیں۔

مریض کو جتنی دیر غذا نہ دی جائے اچھا ہے، البتہ پیاس کی شدت میں برف چسائیں یا ٹھنڈا پانی تھوڑا تھوڑا پلائیں۔

Foreign Body
in the throat

حلق میں کسی چیز کا پھنس جانا

جب کسی شخص کے حلق میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے تو وہ گھبراتا ہے اور اس کی آنکھیں باہر کی طرف نکل آتی ہیں۔ منہ میں بھاگ آ جلتے ہیں اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ فوراً اس کا منہ کھول کر دیکھا جائے۔ اگر پھنسی ہوئی چیز قریب ہو اور نظر آئے تو موچنے یا چمچی سے پکڑ کر نکالیں۔ اگر پھنسی ہوئی چیز باہر نہ آ سکے تو اس کو آہستہ آہستہ اندر کی طرف کرتے رہیں، تاکہ وہ معدے میں پہنچ جائے۔ اب اس کا کوئی فکر نہ کریں اور نہ تے کرائیں اور نہ کوئی مسہل دوا کھلائیں، کیوں کہ عام طور پر یہ چیز خود بہ خود یا خانہ کے ساتھ خارج ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چیز نہ باہر نکلے اور نہ اندر جاسکے تو اس حالت میں کسی ہسپتال میں جانے کا مشورہ دیا جائے، تاکہ آپریشن کے ذریعے اس کو خارج کر دیا جائے۔

Haemorrhage

خون کا بہنا

بہتے خون کو بند کرنے کا عام طریقہ یہ ہے کہ جس عضو سے خون نکل رہا ہو، اس کو باقی حصہ جسم سے اونچا کریں، مثلاً اگر ہاتھ سے خون نکل رہا ہو تو اس کو اوپر کی طرف اٹھائے رکھیں اور اگر زخمی ٹانگ سے خون آ رہا ہے تو ٹانگ کے نیچے کوئی چیز رکھ کر اس کو اونچا کریں۔ اس کے بعد زخمی عضو پر ٹھنڈا پانی گرائیں، یا برف رکھیں اور زخمی جگہ پانی کی گدی رکھ کر پٹی سے کس کر باندھ دیں۔ اگر خون پچکاری کی طرح نکل رہا ہو تو اس حالت میں دباؤ ضرور ڈالا جائے، یعنی ایک یا دونوں انگوٹھوں سے زخم کو دبائیں اور کپڑے کی موٹی سی گدی بنا کر پانی میں تر کر کے کس کر باندھ دیں، یا

سیال بندش خون میں کپڑے کی گدی بھگو کر باندھ دیں۔
 اگر کھوپڑی پر چوٹ لگنے سے زخم ہو جائے اور اس سے خون نکلنے لگے تو صاف کپڑے
 کی گدی اسپرٹ میں تر کر کے زخم پر رکھیں اور اس کو اچھی طرح دبا دیں۔
 اندرونی جریان خون: بعض اوقات چوٹ لگنے سے، کسی اندرونی عضو کے کٹ پھٹ
 جانے سے کسی رگ سے خون بہنے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں مریض چکر اگر گریڑتا ہے، سانس
 تنگی سے اور جلدی جلدی آنے لگتا ہے۔ مریض جمائیاں لینے اور سسکنے لگتا ہے۔ ہونٹوں کی
 رنگت بھیکی پڑ جاتی ہے۔ ٹھنڈا پسینہ آتا ہے اور بعض اوقات بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ کبھی
 ناک سے خون آنے لگتا ہے، یا خون کی قے آنے لگتی ہے اور نبض کم زور لیکن تیز چلنے لگتی ہے۔
 ایسی حالت میں مریض کو آرام سے بٹائیں۔ اگر زخمی ہاتھ پاؤں مارنے لگے تو اس کو آہستہ سے دبائے
 رکھیں۔ اگر بدن کا کوئی حصہ کس کر بندھا ہوا ہو تو اس کو کھول دیں۔ اگر زخمی کچھ ہوش میں ہو
 اور ٹھنڈ کھل سکتا ہو تو سرد پانی تھوڑا تھوڑا پلائیں، لیکن کوئی گرم یا نشہ آور چیز ہرگز نہ دیں، بلکہ
 اس حالت میں

شریت منعش پانی میں ملا کر پلائیں۔
 ۵ لیٹر

یا خیمہ مروارید خاص، یا دوار المسک معتدل جواہر والی، عرق گاؤزیاں، عرق گزغری
 وغیرہ کے ساتھ حسب ضرورت دینا مفید ہے۔
 اگر زخمی چار پائی پر لیٹا ہو تو پاؤں کی طرف سے اس کو اونچا کر دیں۔ اگر نیچے زمین، یا
 فرش پر ہو تو اس حالت میں بھی اس کے پاؤں دوسرے اعضا سے کچھ اونچے کر دیں۔

Foreign Body in the Ear **کان میں کسی چیز کا پھنس جانا**

اگر کان میں پھنسی ہوئی چیز نزدیک ہو اور وہ گرفت میں آسکتی ہو تو اس کو موچنے سے بچو اگر

نکال لیں۔ اگر موجنا نہ ہو تو باریک سلائی وغیرہ سے اس چیز کو آہستہ آہستہ باہر کی طرف لائیں، یہاں تک کہ وہ کان سے باہر آجائے۔ اگر کان میں پھنسی ہوئی چیز موچنے کی گرفت میں نہ آ سکے تو پہلے کان میں دو بوند تیلوں کا تیل چکائیں اور پھر باریک نوک دار سلائی سے پھنسی ہوئی چیز کو باہر کی طرف کھسکائیں۔ پھر موچنے سے پکڑ کر نکال دیں۔

اگر کان میں کوئی جانور گھس جائے اور وہ آنکھوں سے نظر بھی آئے تو اس کو موچنے سے پکڑ کر نکال دیں، لیکن اگر نظر نہ آئے اور کان میں اس کے رینگنے سے سرسراہٹ معلوم ہو تو کان میں سرسوں کا تیل دو تین بوند چکائیں، یا اگر مل سکے تو ہائیڈروجن پراکسائیڈ ڈالیں۔ اس کے ڈالنے سے جانور مر جائے گا۔ اس کے بعد نیم گرم پانی کی پچکاری کر کے کان کو نیچے کی طرف جھکا دیں، پھر ہوا جانور پانی کے ساتھ باہر آجائے گا۔ اگر ایک بار پچکاری کرنے سے نہ نکلے تو دو تین بار وقفے سے پچکاری کریں۔

اگر کان میں پانی چلا جائے تو اس کو نکلانے کے لیے کان کو نیچے کی طرف کر کے چند بار کودیں۔ اس طریقے سے پانی نکل جائے گا، یا ایسا کریں کہ جاذب کاغذ (بلاٹنگ پیپر یا اسفنج کی پتی)۔ بنا کر کان میں داخل کریں۔ اس سے کان کا پانی جذب ہو جائے گا، یا خالی پچکاری کان میں داخل کر کے اس سے ہوا کو کھینچیں۔ اگر پچکاری موجود نہ ہو تو گہوڑوں یا جو کے پودے کی نالی یا اور کسی نالی دار چیز کا ایک سر کان میں داخل کر کے منہ سے چوسیں۔ اس طریقے سے بھی پانی نکل آتا ہے۔

Sprain

موج آجانا

جب کسی جوڑے کے اچانک مڑ جانے سے کھنچاؤ پیدا ہو کر اس جوڑے کے بندھن پھٹ جاتی ہیں، یا اس جوڑے کے عضلات اور نسج کھنچ جاتی ہیں تو اس کو موج آجانا کہتے ہیں۔ جب کسی عضو میں موج آجاتی ہے تو اس میں درد ہوتا ہے اور جوڑے موج جاتا ہے اور وہ ہل چل نہیں سکتا۔

علاج: اس جوڑ کو آرام سے رکھیں، چلنے پھرنے سے پرہیز کریں۔ مریض کھائے ہوئے عضو کو تیز گرم پانی میں آدھ گھنٹے تک رکھیں۔ اس کے بعد اگر درد شدید ہو تو ضمادِ راحت لگائیں۔ اگر یہ موجود نہ ہو تو ہمدرد مرہم لگائیں۔

اور اس کے اوپر گرم روئی رکھ کر کپڑے کی پٹی سے باندھ دیں۔ پٹی مریض کے نیچے سے باندھنا شروع کریں۔ اگر مریض کھائی میں ہو تو آنکلیوں سے کچھ پیچھے سے باندھیں۔ دوسرے دن پٹی اتار کر مریض والی جگہ کو پندرہ بیس منٹ تک گرم پانی میں رکھیں اور اس کو آہستہ آہستہ نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے کی طرف مالش کریں اور پھر ضمادِ راحت یا ہمدرد مرہم لگا کر حسبِ قاعدہ باندھ دیں۔

ناک میں کسی چیز کا پھنس جانا Foreign Body in the Nose

اگر ناک میں پھنسی ہوئی چیز نظر آئے تو مریض سے پکڑ کر نکالیں۔ اگر نظر نہ آئے تو مریض کو چپٹ بٹا کر اس کا منہ بند کریں اور جس نتھنے میں چیز پھنسی ہوئی ہے، اس میں کسی نیکی کے ذریعے ذور سے پھونکیں۔ اس طریقے سے یہ چیز اپنی جگہ چھوڑ دے گی۔ اب اس کو مریض سے پکڑ کر نکال دیں۔ اس کے علاوہ ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ خالی پچکاری گول برے والی، ناک کے اندر داخل کر کے اس کا دستہ باہر کی طرف کھینچا جائے۔ ہوا کے ساتھ پھنسی ہوئی چیز بھی باہر کی طرف آجائے گی۔ اب اس کو کسی مریض سے پکڑ کر نکال دیں۔

ہڈی کا ٹوٹ جانا اور جوڑ کا اکھڑ جانا

Fracture & Dislocation

ہڈی ٹوٹنے یا جوڑ کے اکھڑ جانے کی علامات: جب کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ٹوٹنے

کی جگہ پر در در ہوتا ہے اور جس عضو کی ہڈی ٹوٹتی ہے اس سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ مثلاً جب پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو مریض کھڑا نہیں ہو سکتا، جب ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ہاتھ اوپچا نہیں اٹھایا جاسکتا۔ جس عضو کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے یا ٹھٹھاتا ہے، یا چھوٹا ہو جاتا ہے اور جب دوسرے تن درست عضو سے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو دو بے ڈھنگا دکھائی دیتا ہے، اس جگہ درم ہوتا ہے اور ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ہلانے سے اس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھانے سے کڑکڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ ان علامات کے علاوہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو انگلی سے ٹپٹول کر بھی معلوم کیا جاسکتا ہے۔ جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو ایک خاص طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے، جس کو خود مریض بھی محسوس کرتا ہے۔ جب کوئی جوڑا کھڑا جاتا ہے تو اس جوڑے کے ارد گرد نہایت سخت درد ہوتا ہے جو ٹپے ڈھنگا دکھائی دیتا ہے اس کے چاروں طرف درم ہوتا ہے اور وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ جس عضو کا جوڑا کھڑا ہے، اس کی لمبائی دوسرے تن درست عضو سے ذرا زیادہ ہو جاتی ہے۔ جوڑا کھڑا جانے اور ہڈی ٹوٹ جانے کی صحیح تشخیص کے لیے ایک سرے ضرور کرنا چاہیے۔ جب کسی شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو آرام سے بٹا دیں، ہلنے بھگنے سے منع کر دیں اور ہڈی کے جوڑنے والے ماہر معالج کی طرف جلدی رجوع کریں، کیوں کہ علاج میں جتنی دیر کی جائے گی اتنی ہی تکلیف بڑھ جائے گی اور پھر یہ تکلیف اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ عمل جراحی کی ضرورت ہوتی ہے۔

فہرست سامان متعلقہ اتفاقی حادثات

(۱) ردی	(۱۷) پگڑی
(۲) رستی	(۱۸) کھٹولا
(۳) دست پناہ (چٹا)	(۱۹) کپڑے کی راکھ
(۴) دست پناہ (چٹا) (لوہے کی زنجیر لگی ہوئی)	(۲۰) بوتل
(۵) مٹی کے گھرے کا ٹکڑا	(۲۱) قینچی (خورد درکلاں)
(۶) بالٹی	(۲۲) نیزے کے قلم
(۷) لکڑی کا جالا	(۲۳) پچکاریاں
(۸) پن	(۲۴) گلاس
(۹) سوتی	(۲۵) رومال (چھوٹے بڑے)
(۱۰) سوا	(۲۶) کھیس
(۱۱) مٹلی	(۲۷) انگلیٹھی
(۱۲) لکڑی کی پٹیاں	(۲۸) بگونہ (کھلے منہ کی چھوٹی پتلی)
(۱۳) محدب شیشہ	(۲۹) اُسترے
(۱۴) اسپنج	(۳۰) موجنا
(۱۵) سینگ	(۳۱) تکیہ
(۱۶) چھتری	

فہرست ادویہ متعلقہ اتفاقی حادثات

دوام المسک مغفل جواہر والی	تیل (تلوں کا تیل، سرسوں کا تیل)
عرق گاوڑیاں	ارنڈی کا تیل، ناریل کا تیل)
عرق گزر عنبری	ہائیڈروجن پراکسائیڈ
ضما و راحت	جاذب کاغذ (بلاٹنگ پیپر)
جواہر مرہ	سنگ مقناطیس
حب جواہر	گلیسرین
عرق عنبر	اسپرٹ
ہینگ	سرکہ
شربت منقش	مرہم محفل
سیال شیریں	مرہم رال
سیال بندش خون	ہلدی
چونے کا پانی	ہمدرد مرہم
	خمیرہ مردارید خاص

زہروں کا علاج (علم السموم)

Toxicology

جب کسی زہر خوردہ کے علاج کا موقع ملے تو سب سے پہلے اس کے ارد گرد کی چیزوں کا بھی طرح ملاحظہ کیا جائے، یعنی اس کے آس پاس کوئی شیشی یا کوئی پٹری وغیرہ تو نہیں پڑی ہوئی ہے۔ اس کے پٹروں اور بدن کو اچھی طرح دیکھا جائے کہ ان پر کوئی نشان یا دھبہ تو نہیں ہے، کیونکہ تیزابی اور کھاری زہر کے کھانے سے اکثر بدن یا پٹروں پر داغ پڑ جاتے ہیں۔ زہر خوردہ کے سانس کو بھی غور سے دیکھیں، کیوں کہ افیون، شراب اور کاربانک ایسڈ کی بو سانس سے معلوم ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی پٹلیوں کو دیکھا جائے۔ افیون کے زہر سے آنکھوں کی پٹلیاں مسکڑ جاتی ہیں اور دھتورے کے زہر سے آنکھوں کی پٹلیاں پھیل جاتی ہیں۔

اگر زہر خوردہ کا دم گھٹنے لگے تو مصنوعی تنفس جاری کرنا چاہیے۔ اگر مریض کا جسم سرد ہو جائے تو گرم پانی کی بوتلیں یا گرم اینٹیں اس کے تلوؤں، رالوں اور بغلوں میں رکھیں اور کبل اڑھائیں۔

زہر خوردہ کی عام علامات

زہر کھانے کے واقعات بچوں اور کارخانوں میں کام کرنے والوں میں اتفاقی طور پر ہوا کرتے ہیں۔ اس قسم کے زہر کی حقیقت و ماہیت مریض کی ہسٹری سے معلوم ہو جاتی ہے، مگر خود کشی کے مریضوں میں زہروں کی اقسام کا معلوم کرنا مشکل ہوا کرتا ہے، کیوں کہ مریض ذہنی انتشار اور قوما کی وجہ سے اپنے پورے حالات نہیں بتا سکتا، اس لیے ایسے موقعوں پر طبیب کو اپنے مشاہدات اور تجربات سے ہی کام لینا پڑتا ہے اور چون کہ زہر کھانے والے کے لیے فوری تشخیص و علاج کی ضرورت

ہوتی ہے، اس لیے بعض زہروں کی مخصوص علامات و عوارض ذیل میں درج کیے جاتے ہیں:

عوارض علامات	نام زہر
(۱) قورلج	سیسہ، تانبہ، سنکیا
(۲) سقوط قوت	اکال ادویہ، سنکیا، انٹی مونی، بچھناک، تمباکو، انٹی پائیرین
(۳) قوما (کوما)	افیون، مارفین، کلورل ہائیڈریٹ، الکوحل، کافور، سیسہ، کاربن مانو آکسائیڈ، جوہر پرورج (اٹروپین)، ہائیوسین۔
(۴) تشنج	کچلہ اداس کے الکلائڈز، کافور، سائی نائڈ، سینٹوفین۔
(۵) اینٹھن	سنکیا، انٹی مونی، سیسہ
(۶) لڑاق (نیلہٹ)	انٹی فائیرین، افیون، نائٹرو بینزین
(۷) ہذیان	دھتورہ، بیلاڈونا، اجوائن خراسانی، بھنگ، الکوحل، کافور، کوکین
(۸) اسہال	سوزش پیدا کرنے والے زہر اور غذائی سمیت (فوڈ پائزنگ)
(۹) طبعی جھٹکوں کی غیر موجودگی	باربی چورٹ
(۱۰) ٹھنکی غشاء مخاطی کا سفید تیزاب اور لالی سول	
ہوجانا	
(۱۱) فالج	کونیم، بچھناک، جیلی میم، سنکیا، سیسہ۔
(۱۲) بستر کے کپڑوں کو چھنا	دھتورہ، الکوحل، مٹی کا تیل
(۱۳) پتلیاں سکڑی ہوئی	افیون، مارفین، فینل، کلورل ہائیڈریٹ، پائیلو کاربین
(۱۴) سانس آہستہ	بیلاڈونا، دھتورہ اور اس کے الکلائڈز، بچھناک، کوکین
تیز	افیون، کاربن، مونو آکسائیڈ دھتورہ، کوکین

(۱۵) جلد خشک

بیلٹو، دھتورہ

تر

افیون، بھنگ، الکوحل، تمباکو، انٹی مونی

(۱۶) قے

اکال اور لارغ زہر، مثلاً تیزابات، الکوحل، نیلا تھوٹھا، شکھیا

اگر آنٹوں اور معدے میں گرمی، بے چینی، درد اور مروڑ ہو، چہرے پر سرخی، پیاس کی شدت اور منہ میں خشکی بہت ہو تو اس سے یہ قیاس کیا جائے کہ زہر گرم قسم کا ہے اور اگر اعضائے جسم بے حس اور بوجھل ہوں، بدن سرد ہو اور ٹھنڈا پسینہ آ رہا ہو تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زہر سرد قسم کا ہے۔

اگر زہر کی اصلیت و حقیقت نہ معلوم ہو سکے تو علامات مذکورہ کے پیش نظر یہ طریقہ علاج اختیار کیا جائے کہ زہر پھیلنے سے پہلے ایک کلو نیم گرم پانی میں تلوں کا تیل (دوغن کنبد) ۱۲۵ ملی لیٹر (دس تولے) ملا کر پلائیں، تاکہ قے ہو جائے۔ یہ کئی مرتبہ پلایا جائے۔ اس کے بعد گائے کا دودھ اور گھی ملا کر پلایا جائے۔ اگر شروع میں ہی گھی اور دودھ پلانا شروع کر دیں تب بھی اچھا ہے۔ اس سے بھی قے ہو کر زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور بعد میں یہ تریاق کا کام بھی دیتا ہے۔ مریض کو سونے سے منع کر دیں۔

اگر اعضائے جس اور بوجھل ہوں، تمام بدن سرد ہو تو قے کرانے کے بعد دوائے غریزی، جدوار خطائی، پکھان بید، ہینگ وغیرہ کھلائیں۔ اگر غشی ہو جائے تو اس کا علاج کریں اور اعضائے رئیسہ کی تقویت کی دوائیں کھلائیں۔

چند مشہور زہروں کا علاج

افیون، دھتورہ، بھنگ اور گانجا وغیرہ : ان زہروں کا علاج اس طریقے پر کیا جائے کہ تخم مولیٰ اور تخم سویا ہر ایک ۱۲ گرام (ایک تولہ) پانی میں جوش دے کر پھان کر شہد خالص اور

نمک طعام ہر ایک ۲۰ گرام (ایک تولہ) ملا کر پلائیں، تاکہ قے ہو جائے۔ اگر وقت پر یہ نہ مل سکیں تو انڈی کی کوئیل ۲۰ گرام (ایک تولہ) پانی میں پیس کر پلائیں۔ اس سے قے بھی ہو جاتی ہے اور یہ انیون کا تریاق بھی ہے۔ قے ہونے کے بعد ہینگ ۲ گرام (۲ ماشے)، شہد خالص ۲۰ گرام (۲ تولے) ملا کر پلائیں اور قطعی نہ سونے دیں۔ منہ پر سرد پانی کا چھٹا دیتے رہیں۔ اگر بدن سرد ہو جائے تو رالوں اور نفلوں میں گرم پانی کی بوتلیں رکھیں۔ گرم تیز کافی یا چائے پلائیں۔ یہ طور غذا گھی دودھ پلائیں۔ سنکھیا، شکر ف، مردار سنگ اور پارہ وغیرہ؛ اگر ان اشیاء کے کھانے سے زہریلی علامات پیدا ہو جائیں تو پہلے دودھ ایک کلو (ایک سیر) اور گھی دلیسی ۲۵ گرام (دس تولے) ملا کر پلائیں، تاکہ قے ہو جائے۔ اگر یہ نہ مل سکے تو گرم پانی میں نمک یا رائی ملا کر پلا دیں، تاکہ قے ہو کر معدہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد کھتہ سفید یا کھریا مٹی ۳۶ گرام (۳ تولے) پانی میں گھول کر پلائیں۔ اس کے بعد دودھ، چاولوں کی آبیج، آتش جو، گھی اور کچے انڈے کی سفیدی پلائیں۔ سنکھیا کے زہر میں ترشی نہ دی جائے اور اس کی مرمن سمیت دودھ کرنے کے لیے تازہ مولی کا رس ۱۷۵ ملی لٹر (۵ تولے) اور شہد خالص ۲۵ گرام (۲ تولے) ملا کر چند روز تک پلانا بہت مفید ہے۔

پارہ کے زہر میں پہلے تین انڈوں کی سفیدی پانی یا دودھ میں بھینٹ کر پلائیں، پھر قے کرائیں، پھر کچے انڈوں کی سفیدی یا گیہوں کا آٹا پانی میں گھول کر پلائیں۔ اگر پیشاب بند ہو جائے تو گردوں کے مقام پر خشک گھاس لگائیں۔ اگر پارہ کھانے سے پٹھوں میں درد، اختلاج اور گھٹیا ہو جائے تو جوالائی کا ساگ پانی میں جوش دے کر اس سے نہا یا کریں۔ ایک ہفتے تک پارہ جوڑوں سے نکل جاتا ہے۔ کریمے کی ترکاری بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔

اگر سنکھیا یا پارے کی پڑانی سمیت سے آشک کی مانند علامات پیدا ہو جائیں تو ان کو دودھ کرنے کے لیے بکری کا دودھ اور شربت عذاب ملا کر پلانا مفید ہے۔

بھلا لٹوہ : اس کے زہریں پہلے نیم گرم پانی اور تلوں کا تیل (روغن کچن) ملا کر قے کرائیں، پھر دودھ، چھاپھ، آش بخو اور روغن بانام یا گھی دیسی وغیرہ پلائیں، تیل، مغز اخروٹ، مغز ناریل، مغز چلغوزہ اور چرونجی وغیرہ کھلائیں۔ اگر بھلا لٹوے کا تیل یا اُس کا دھواں وغیرہ بدن پر لگنے سے ورم، خارش اور پھنسیاں وغیرہ ہو جائیں تو اس جگہ کو کھٹی چھاپھ سے دھوئیں، پھر روغن ناریل لگائیں، یا اعلیٰ کے سبز پتے پیس کر لیپ کریں اور یہی پتے پانی میں پیس کر پلائیں، یا مغز ناریل، مغز چرونجی، مغز اخروٹ اور تیل سیاہ وغیرہ میں سے کوئی چیز پیس کر لیپ کریں اور چند گھنٹے بعد چھاپھ سے دھوئیں اور پھر لیپ کریں۔

جمال گوٹہ : اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے دودھ اور گھی ملا کر قے کرائیں، پھر دہی یا چھاپھ خوب پلائیں اور سرد پانی سے غسل کریں۔

تیزابی اور کھاری زہروں کا علاج

تیزاب گندک، شورہ، نمک، ایبونیا اور جواکھار وغیرہ کھاری زہروں میں قے آور دوائیں نہ کھلائیں، بلکہ تیزابی زہر کا اثر زائل کرنے کے لیے سوڈا بائی کارب یا چاک وغیرہ پانی میں گھول کر پلائیں اور پھر دودھ اور انڈے کی سفیدی ملا کر پلائیں اور کھاری زہر کا اثر دور کرنے کے لیے سنت لیموں یا ست اعلیٰ ۱/۲ اگرام (ڈیڑھ ماشہ) یا آب لیموں یا سرکہ وغیرہ ۳۰ ملی لٹر (ایک ادنس) پانی ملا کر پیادیں اور دس منٹ بعد دودھ یا انڈوں کی سفیدی پانی میں پھینٹ کر پلائیں یا روغن زیتون ۱۲۵ ملی لٹر (دس تولے) پلائیں۔

آبٹودین کا زہر : اگر اس کے مرکبات کھانے سے زہریلی علامات پیدا ہو جائیں تو قے کر کے میدہ یا اراروٹ وغیرہ لعاب دار اشیاء بہت سے پانی میں گھول کر پلائیں۔

بعض معالجاتی طریقے

جونک لگانا Lecching

مختلف قسم کے ورموں کو دوز کرنے کے لیے جونکیں لگانا بھی مفید علاج ہے۔ جونکیں اپنے قدر و قیامت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ بڑی جونکیں زیادہ خون چوستی ہیں اور چھوٹی جونکیں زیادہ تعداد میں لگانی پڑتی ہیں، اس لیے اس مقصد کے لیے درمیانی قدر و قیامت کی جونک جو آرام کی حالت میں دوا بخ کے قریب لمبی ہو، انتخاب کرنی چاہیے۔

جونک لگانے کا طریقہ: جونک لگانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے سے ایک گلاس میں جونکیں ڈالیں اور اس گلاس کا منہ ماؤٹ جگہ پر لگا دیں۔ جب جونکیں لگ جائیں تو گلاس کو ہٹا لینا چاہیے۔ اگر اس جگہ کوئی دوا یا میل لگا ہوا ہو اور اس کی وجہ سے جونکیں نہ لگیں تو پہلے اس جگہ کو صابن اور گرم پانی سے دھولیں اور صاف کر کے خشک کر لیں، پھر جونکیں لگائیں۔ اگر اس طریقے سے جونکیں نہ لگیں تو پھر حسب ذیل تدبیریں اختیار کریں۔

اول: جونک کو پانی سے نکال کر گرم و خشک کپڑے میں دس منٹ تک رکھیں اور پھر لگائیں۔

دوم: جس جگہ جونکیں لگانی ہوں، اس جگہ کو بالائی یا بیٹھا کیا ہوا دودھ تقوڑا سا لگائیں اور پھر جونک لگائیں۔

سوم: راتی کا پلاستر لگا کر اس جگہ کو سُرخ کر دیں اور پھر جونکیں لگائیں۔

چہارم: اگر ان تدبیروں سے بھی جونکیں نہ لگ سکیں تو پھر مقام ماؤٹ کی تھوڑی سی جگہ تیز یا قویا صوفی کے ساتھ کھرچ کر خون نکالیں اور اس جگہ کو مسل دیں۔

پھر جونک لگائیں۔ اس طریقے سے ضرور جونک لگ جاتی ہے۔
اگر مریض کے قریب تمباکو یا گندک یا سرکہ کی بو ہو تو اس وقت بھی جونک نہیں لگتی
ہے۔ اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔

اگر جونک کسی خاص نقطے پر لگانی ہو تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ ایک جاذب کاغذ
(بلاٹنگ پیپر) میں حسب ضرورت سوراخ کر کے اس کو جونک لگانے کی جگہ پر رکھیں اور
جونکیں چھوٹے گلاس میں ڈال کر گلاس کاغذ پر لگائیں۔ اس طریقے سے جب جونکیں کاغذ کی سطح
پر پہنچیں گی تو سوراخوں میں ان کا منہ پہنچے گا اور وہ اس جگہ لگ جائیں گی۔

جونکیں عام طور پر بندرہ بلیس منٹ میں خود بہ خود خون پی کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اگر زیادہ
دیر ہو جائے اور جونکیں نہ اتریں تو نمک پانی، سرکہ یا پیاز ان کے منہ پر لگانے سے اتر جاتی
ہیں۔ جونک اُتارنے کے بعد اگر خون زیادہ نکالنا چاہیں تو انٹی سپٹک پلٹس، یا سینک، یا
بھاپ وغیرہ استعمال کریں۔ اگر خون جلدی بند کرنا ہو تو پھٹکری یا نیلا تو تیا پانی میں گھول کر
اس پانی میں کپڑے کی گدی تر کر کے اس جگہ باندھ دینی چاہیے اور اسی پانی سے
زخموں کو دھونا چاہیے۔ اگر جونک ناک یا مقعد، یا شرم گاہ کے اندر داخل ہو جائے تو پانی میں
سرکہ یا نمک ملا کر پچکاری کریں۔

جونک لگانے کے فائدے، امراض اور مقامات

تمام مقامات ورم یعنی ذہل (پھوڑا)، رگڑ، ورم وغیرہ میں جب درد اور سوزش
زیادہ معلوم ہو تو اکثر چھ سات جونکیں لگا دینا اور بعد میں پلٹس باندھ دینا، یا سینکے رہنا بہت
فائدہ کرتا ہے اور پیپ نہیں پڑتی ہے۔

دردِ سر، جو سر میں خون جمع ہونے سے ہو، اس میں کنپٹیوں پر چھ سات جونکیں لگانا
مفید ہے شروع سرسام کی حالت میں گدی پر جونکیں لگانی چاہئیں۔

دردِ سر میں جو احتباسِ حیض کی وجہ سے ہو، اندامِ نہانی کے بیرونی لب کے قریب
جونکیں لگائیں۔

سینہ اور پیٹ کے درد میں، جو اکثر بخار کی حالت میں ہو جاتا ہے، مقامِ درد کے
مقابل لگائیں۔

صدراع اور شقیقہ میں، جو بواسیر کا خون رُک جانے کی وجہ سے ہو، کنارہٴ دُبر پر
جونک لگائیں۔

امراضِ بالا میں جونکوں کا لگانا مفید ثابت ہوتا ہے۔

سخت قے، جو کسی طریقے سے بند نہ ہوتی ہو، بعض اوقات قمرِ معدہ کے مقابل
جونکیں لگانے سے بند ہو جاتی ہیں۔

سخت آشوبِ چشم میں ہر دو کوؤں کے قریب جونکیں لگانا آنکھ کی سرخی اور درد کو
کم کر دیتی ہے۔

بیرونی بواسیر جس میں درد اور دردِ شدید ہو اور دنبل میں بعض دفعہ جونک لگانے سے
حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔

سخت سچیش اور دردِ جگر کی حالت میں دُبر کے کنارے پر جونکیں لگانا فائدہ کرتا ہے۔
احتیاط: کسی بڑی وریڈ، پلک، ایتان، حاملہ کی شرم گاہ، عضو تناسل کی جلد اور فوطوں
پر جونکیں لگانا منع ہے، کیوں کہ ایسے مقامات پر جونک لگانے سے زیادہ درد ہو جانے کا
اندیشہ ہوتا ہے۔

چھوٹے بچوں میں بھی جونک لگاتے وقت احتیاط کرنی چاہیے، کیوں کہ ان میں زیادہ
خون نکل جانے سے ہلاکت کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر بچوں کے جونک لگانے کی ضرورت پیش آئے تو
ہمیشہ کسی پدمی کے مقابل اور صبح کے وقت لگائیں، تاکہ اگر خون زیادہ نکلتا معلوم ہو تو اس کو
فورا بند کیا جاسکے شام کے وقت جونک لگانے سے یہ اندیشہ رہتا ہے کہ رات کے وقت بے خبری

میں خون زیادہ بہہ کر باعث نقصان نہ ہو۔ چھ سال کی عمر تک جس قدر عمر ہوا اتنی ہی تعداد میں جوئیں لگائیں۔ اس کے بعد جوانی تک عمر کے مطابق تعداد ہو۔

سینگی (خشک گلاس لگانا)

Dry cupping

بعض اوقات دردِ گردہ، نمونیا اور دردِ کمر وغیرہ امراض میں درد کی شدت کو دور کرنے کے لیے سینے یا کمر یا شکم پر خشک گلاس لگائے جلتے ہیں اور اس سے ان امراض کو اکثر فوری فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مختلف سائز کے گلاس بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو کپنگ گلاس کہتے ہیں۔ اگر وقت ضرورت یہ مخصوص قسم کا گلاس نہ ہو تو شیشے کے عام چھوٹے گلاس سے بھی یہ کام لیا جاسکتا ہے۔ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس گلاس کے کنارے صاف اور گول ہوں اور یہ گلاس موٹے شیشے کا بنا ہوا ہو تاکہ لگاتے وقت اس کے چھبنے یا پھٹ جانے کا خطرہ نہ رہے۔

گلاس لگانے کا طریقہ: جس جگہ گلاس لگانا ہو، اس جگہ کو گرم پانی اور صابن سے دھو کر خشک کر لیں۔ پھر کسی باریک لکڑی کے سرے پر ذرا سی روئی لپیٹ کر اس کو میٹھی لیڈر پیڑ میں پھگو کر اور جلا کر اس کو گلاس کے اندر رکھیں، یا گلاس کی اندر دنی سطح پر پیڑ لگا کر اس کو جلا دیں، تاکہ اس کی گرمی سے گلاس کی ہوا خارج ہو جائے۔ یہ احتیاط رکھیں کہ گلاس بہت زیادہ گرم نہ ہو جائے، چوں کہ زیادہ گرم گلاس لگانے سے جلد کے جل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب گلاس کو اٹا کر کے مقامِ مآوت پر رکھ کر ذرا دبا دیا جائے۔ گلاس کے ٹھنڈا ہوتے ہی اس کے اندر والی کھال اوپر کو ابھر آئے گی اور پانچ دس منٹ کے بعد گلاس کے کنارے اور جلد کے درمیان انگلی کا ناخن داخل کریں۔ اس طریقے سے گلاس ڈھبلا ہو کر جلد سے علیحدہ ہو جائے گا۔ گلاس اتارنے کے بعد چند گھنٹوں میں یہ جگہ اپنی اصلی حالت پر آجائے گی۔ اگر اس جگہ سرخی اور سوزش

زیادہ ہو تو اس جگہ پر ویزلین لگائیں۔ ضرورت کے وقت تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تین چار گلاس لگائے جاسکتے ہیں۔

اسی غرض کے لیے دیہات میں سینگیاں اور کوزے بھی لگائے جاتے ہیں۔ سینگیاں منٹھ سے ہوا کھینچ کر لگائی جاتی ہیں۔

فصد Venesection

انسانی بدن کی کسی رگ (درید) میں نشتر دے کر خون کی خاص مقدار نکالنے کو فصد کھولنا کہتے ہیں۔ اطبائے قدیم نے مواد کے استفراغ کے دیگر ذریعوں کے مقابلے میں فصد کو بہتر استفراغ بتایا ہے، کیوں کہ اس کے ذریعے استفراغ اختیاری ہے۔ یعنی فصد کھولنے کے بعد اگر خون میں کوئی خرابی معلوم نہ ہو، یا تکلیف زیادہ ہو جائے تو اس کو بند کر سکتے ہیں۔

فصد بارہ سال کی عمر سے پہلے منع ہے اور اس کے بعد تمام عمر جائز ہے، بشرطیکہ کوئی خاص وجہ فصد کی مانع نہ ہو۔ فصد اس شخص کی کھولی جائے جس کا خون طبعی مقدار سے زیادہ ہو، یا جس کے خون کی کیفیت بدل جائے۔ اگر کسی شخص کو فصد کھولنے سے غشی پیدا ہو جاتی ہو تو اس کو فصد کرنے سے پہلے شربت لیموں یا شربت انار ترش عرق گلاب میں ملا کر پلائیں اور پھر فصد کریں اور جب تھوڑا سا خون نکلے تو زخم پر انگوٹھا رکھ کر خون بند کر دیں، تاکہ کچھ دیر اس کو آرام ملے اس کے بعد زخم سے انگوٹھا علیحدہ کر کے پھر تھوڑا سا خون نکالیں۔ اسی طرح دو تین بار وقفہ دے کر خون نکالا جائے تو اس ترکیب سے غشی پیدا نہیں ہوگی۔

اگر فصد کے بعد غشی ہو جائے تو اس کو دور کرنے کی تدبیریں اختیار کریں، مثلاً قے کرائیں اور دوا المسک معتدل جواہر دالی پانی میں حل کر کے پلائیں۔

حسب ذیل حالات میں فصد کھولنی منع ہے۔

عمر بارہ سال سے کم ہو۔ سخت سردی کا موسم ہو۔ مریض بوڑھا ہو۔ کسی عضو میں شدید درد

ہو۔ آدمی بہت ڈبلا یا موٹا ہو۔ عورت حائضہ یا حاملہ ہو تو ان حالات میں فصد نہیں کھولنی چاہیے۔

دریدیں جن کی فصد کھولی جاتی ہے

(۱) قیفال (۲) اکحل (۳) باسلیق (۴) جبل الذراع (۵) اسلم (۶) ابلی

(۷) صافن (۸) عرق النسا (۹) البض (۱۰) چہار رگ۔

عام طور پر حسب ذیل دریدوں کی فصد کھولی جاتی ہے :

(۱) قیفال : اس کو سر اور بھی کہتے ہیں، یہ رگ انگوٹھے کے مقابل کہنی کے جوڑے میں

واقع ہے۔ اس کی فصد کھولنا سر اور شہ کی بیماریوں میں مفید ہے۔

(۲) اکحل : اس کو نہر البدن اور ہفت اندام بھی کہتے ہیں۔ یہ انگوٹھے کے پاس والی

انگلی کے مقابل کہنی کے جوڑے کے پنجے میں واقع ہے۔ اس کی فصد تمام بدن کی بیماریوں کے واسطے

مفید ہے۔ چونکہ اس رگ کے نیچے اور اس کے دونوں جانب عصب واقع ہے، اس لیے

اس میں گہرا نشتر نہ لگایا جائے، ورنہ پیٹے کے کٹنے کا خدشہ رہتا ہے۔

(۳) باسلیق : یہ رگ درمیان انگلی کے مقابل کہنی کے جوڑے کے سامنے واقع ہے۔ اس

کی فصد گردن سے نیچے کے حصے اور دونوں پاؤں کی بیماریوں کے واسطے مفید ہے۔

واضح ہو کہ اس کے نیچے ایک شریان ہے اور وہ انگلی رکھنے سے کودتی ہوئی معلوم ہوتی ہے

اس لیے اس کی فصد بھی یہ احتیاط کھولنی چاہیے، تاکہ نشتر شریان تک نہ چلا جائے، ورنہ خون کا

بند ہونا مشکل ہو جائے گا۔

ہاتھ کی رگوں میں زیادہ تر انہی مندرجہ بالا دریدوں کی فصد کھولی جاتی ہے۔

(۴) صافن : یہ رگ ٹخنے اور پنڈلی پہا انگوٹھے کے برابر ہے۔ اس کی فصد کھولنے

سے حیض جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ران، خصیہ، آلہ تناسل کی خارش اور زخم وغیرہ

کے واسطے بھی اس کی فصد کھولنا فائدہ مند ہے۔

فائدہ: اگر فصد کھولتے وقت نشتر شریان تک پہنچ جائے، جس کی علامت یہ ہے کہ خون سرخ اور رک رک کر نکلے اور ضعف دل بڑھ جائے تو فوراً رگ کے سر کو انگوٹھے سے دبا دیں اور اس پر کوئی چپکنے والی دوا لگا کر اس کے اوپر گدڑی رکھ کر مضبوط بانڈھ دیں اور ہاتھ کو ایک بڑے تکیے پر اونچا رکھیں اور بالکل نہ ہلائیں۔ اسی طرح اس وقت تک رکھیں، جب تک زخم اچھا نہ ہو جائے۔

علاج بالماء Hydrotherapy

پانی ہماری صحت و زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے پینے اور خارجی استعمال سے بدن کے سمی مواد خارج ہو جاتے ہیں۔ طب میں امراض کو دور کرنے کے واسطے پانی کے استعمال کے کئی طریقے ہیں، جن کو غسل، حمام، آب زن، پاشویہ، نطول اور انکیباب وغیرہ کہتے ہیں۔ ان کے مختصر اصول اور فائدے درج کیے جاتے ہیں۔

غسل Bath

صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بدن کی جلد کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے غسل کرنا چاہیے، کیوں کہ غسل سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ مسامات کے منہ کھلنے سے خواب اور زہریلے فضلات خارج ہو جاتے ہیں۔ حرارت اصلیہ کو تقویت پہنچتی ہے۔ غسل ہمیشہ پاک اور صاف پانی سے کرنا چاہیے۔ گرمی کے دنوں میں ایک یا دو مرتبہ روزانہ غسل کرنا چاہیے، ورنہ عام طور پر ہر دوسرے تیسرے روز تو ضرور ہی غسل کیا جائے۔ غسل کے وقت جسم کو خوب ملا جائے، تاکہ تمام میل کچیل دور ہو کر جلد صاف ہو جائے اور مسامات کھل جائیں۔ غسل کے بعد جسم کو کسی کھردرے کپڑے یا تولیہ سے صاف اور خشک کرنا چاہیے۔ غسل کرنے کا عمدہ وقت صبح کا ہے، یا شام کو کھانا کھانے سے پہلے غسل کیا جائے۔

غسل کی قسمیں

سرد پانی سے غسل : تن درست جوان آدمی کے لیے سرد پانی سے نہانا ہر موسم میں مفید ہے۔ سرد پانی سے غسل کرتے وقت سابن ضرور استعمال کرنا چاہیے اور بدن کو خوب لٹکا چاکیے مگر لاغراور زیادہ فرسہ اشخاص کے لیے سرد پانی سے غسل کرنا مضر ہے۔ اسی طرح کم زوروں اور بیماروں، حاملہ عورتوں، گھٹیا، اسہال، ہیچش کے مریضوں کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہیں کرنا چاہیے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو بھی سرد پانی سے غسل نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔

زیادہ سرد غسل سات منٹ میں، معمولی سرد غسل دس منٹ میں اور معتدل سرد غسل پندرہ منٹ میں کر لینا چاہیے۔

گرم پانی سے غسل : گرم پانی سے نہانے سے بدن کی جلد خوب صاف ہو جاتی ہے۔ دوران خون اور نظامِ عصبی کو تحریک پہنچ کر سانس اور نبض کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ چوں کہ گرم پانی کے غسل سے پسینہ خوب آتا ہے، اس لیے طبیعت کم زور اور سست ہو جاتی ہے۔ پس جن کا دل کم زور ہو، یا بواسیر اور نکسیر وغیرہ خونی بیماریاں ہوں، ان کو گرم پانی سے غسل نہ کرنا چاہیے، مگر ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے واسطے گرم پانی سے غسل کرنا فائدہ مند ہے۔

نیم گرم پانی سے غسل : نیم گرم پانی سے غسل کرنا ہر موسم اور ہر مزاج میں نفع بخش ہے۔ محنت کے بعد غسل و ماندگی کو دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی سے غسل کرنا چاہیے۔ اس سے عصبی مرکوزوں پر تسکین بخش اثر پڑ کر نیند آ جاتی ہے۔

نیم گرم غسل دس پندرہ منٹ میں ختم کر لینا چاہیے۔ اگر ٹب یا حوض میں غسل کیا جائے تب بھی دس منٹ سے زیادہ وقت خرچ نہ کیا جائے۔

حمام Balneum

غسل کرنے کی دوسری صورت حمام ہے۔ حمام میں غسل کرنے سے بدن کے مسامات کھل جاتے ہیں۔ جلد کے فضلات تحلیل و خارج ہو جاتے ہیں۔ حرارتِ اصلیہ کو تقویت پہنچتی ہے۔ بھوک بڑھتی ہے۔ خوراک جزو بدن بنتی ہے۔ بستی اور تھکن دور ہو جاتی ہے اور دماغی افعال درست ہو جاتے ہیں۔

حمام کی عمارت پُرانی اور مضبوط ہونی چاہیے۔ اس کی فضا وسیع اور کشادہ اور ہوا چھی ہو، اس کا پانی میٹھا ہو۔ اس کی گرمی نہانے والے کے مزاج کے موافق ہو۔ حمام کے تین درجے ہوں اور کپڑے اتارنے کے لیے ان کے علاوہ ایک اور درجہ ہو۔ ان تینوں درجوں میں گرمی بہ تدریج بڑھتی جاتی ہے۔ پہلے درجے میں سردی تری، دوسرے درجے میں گرمی تری اور تیسرے درجے میں گرمی خشکی پیدا ہوتی ہے۔ گرم درجے میں ایک دم ہی داخل نہ ہونا چاہیے اور نہ گرم درجے میں زیادہ دیر تک رہنا چاہیے۔ بعض مزاجوں میں اس درجے میں زیادہ دیر تک رہنے سے غشی رہے چینی اور خفقان وغیرہ شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ خیال بھی رکھنا ضروری ہے کہ خالی پیٹ حمام میں غسل کرنے سے بدن میں خشکی اور لاغری پیدا ہوتی ہے اور شکم سیر ہونے کی حالت میں حمام کرنے سے سترے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ حمام کرتے وقت پیٹ نہ بالکل خالی ہو اور نہ بہت بھرا ہوا ہو۔ جو لوگ محنت و ریاضت کم کرتے ہیں، ان کو زیادہ پسینہ لانے والا حمام کرنا چاہیے۔

آبِ زن : یہ بھی علاج بالمار کی ایک شکل ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے برتن (ٹب یا ناند) میں پانی ڈال کر اس میں مرین کو اس طریقے سے بٹھاتے ہیں کہ اس کا سر پانی سے باہر رہے اور تمام دھڑ پانی میں رہے۔ اس پانی میں حسب ضرورت کبھی مختلف دوائیں جوش دی جاتی ہیں اور کبھی صرف پانی ہی سرد یا گرم استعمال کیا جاتا ہے۔ دردِ گردہ، دردِ اور دمِ مثانہ اور دیگر

بیماریوں میں استعمال کرایا جاتا ہے۔

پاشویہ : یہ بھی علاج بالماہ کی ایک صورت ہے۔ اس میں صرف گرم پانی یا پانی میں دوائیں جوش دے کر بیمار کے پیروں کو گھٹنے تک اس پانی میں رکھتے ہیں اور وہی پانی ہاتھوں میں لے لے کر گھٹنے سے نیچے کی طرف کوڑھلتے رہتے ہیں۔ پاشویہ گرم بخاروں میں دردِ سراورہ سر کی طرف بخارات چڑھنے کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سر کے مواد کو جذب کرنے کے لیے پاشویہ کرنا بہت مفید ہے۔ پاشویہ کرنے کے وقت بیمار کے سر کو تکیہ لگا کر پشت کی طرف مائل رکھیں اور منہ کے سامنے پردہ چھوڑ دیں تاکہ بھاپ دماغ کو نہ پہنچے، کیوں کہ بعض وقت پانی کی گرم بھاپ دماغ کو لگنے سے خلل دماغ اور خفقان پیدا ہو جاتا ہے۔

نطول (تیرپہ) : خالص پانی یا دواؤں کو پانی میں پکا کر بدن کے کسی حصے پر اونچائی سے متواتر گرانے کو کہتے ہیں۔ اس سے بھی دردِ اوردوم کو سکون ہوتا ہے اور پسینہ آکر مسامات کے منہ کھل جاتے ہیں۔

انکباب (بھارہ) : گرم پانی یا پانی میں دوائیں جوش دے کر اس کی بھاپ کسی عضو کو دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے پسینہ آتا ہے اور درد کو سکون ہو جاتا ہے۔

رش (چھینٹا) : ٹھنڈے پانی یا پانی میں کوئی خوشبو عرق گلاب و بید مشک وغیرہ ملا کر چہرے پر چھینٹے مارنے کو کہتے ہیں اور یہ بالعموم بے ہوشی کے وقت ہوش میں لانے کی ترکیب ہے۔

تبریدِ سر : کبھی کبھی بخار والے مریض میں جب کہ بھاس کی شدت ہو، سر کی طرف بخارات چڑھنے کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان بخارات کو روکنے اور سر کے گرم درم کو دودھ کرنے کے لیے مریض کے ماتھے اور نالہ پر ٹھنڈے پانی میں کپڑا بھگو کر بار بار رکھتے ہیں اور اگر برف مل جائے تو برف کے ٹکڑے کپڑے میں رکھ کر سر پر رکھتے ہیں۔ آج کل اسی مطلب کے لیے ربڑ کی تھیلی میں برف رکھ کر سر پر رکھتے ہیں۔

خشک غسل : علاج بالماہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی کم زور مریض کو، جس کے لیے غسل کرنا مناسب نہ ہو، حسب ضرورت و موقع گرم یا سرد پانی میں نرم کپڑا بھگو کر اور اس کو بخور کر اس کو تمام بدن صاف کرتے ہیں۔

متضاد یا نقیض دویہ

Incompatibility

نسخہ ترتیب دیتے وقت اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کا کوئی جز دایسا نہ ہو جو کسی بھی لحاظ سے اس نسخے کی دوسری دوا کا نقیض ہو، کیوں کہ اس قسم کی دوائیں ملائے سے مرکب زہر بلا بن جاتا ہے، جس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ مثلاً چند دوائیں ذیل میں تحریر کی جاتی ہیں۔
صمغ عربی: الکحل، معدنی تیزاب، سہاگہ، لوہے کے نمکیات، اوکسے لک ایسڈ وغیرہ نہ ملائے جائیں۔

اسپرین: ایسڈ الکلیئر، لوہے کے نمکیات، فیفین زون اور ہیگزامن وغیرہ نہ ملائیں ہیگزامن ملائے سے لسی سی بن جاتی ہے۔

ایلم: الکلیئر، الکلائن کاربونیٹ، لوہے کے نمکیات، پارہ، سیسہ اور ٹینک ایسڈ نہ ملائے جائیں۔

بویکس: معدنی تیزاب، الکلائڈ، گوند، لعاب، کلورل ہائیڈریٹ، سیسہ، سلور اور جبت وغیرہ نہ ملائیں۔

برومائیڈز: معدنی تیزاب، تیزابی نمک، سیسہ، سلور، پارہ وغیرہ کے نمکیات، کلورل ہائیڈریٹ، الکلائڈ نہ ملائیں۔ پوٹاسیم برومائڈ اور کیلومل ملانا خطرناک ہے۔ اسی طرح برومائڈ کے ساتھ سپرٹ ایٹھرائٹرو سائل مل کر خطرناک مکسچر بن جاتا ہے۔ پیرل ڈی ہائیڈ بھی نہ ملائیں۔
کیفین: پوٹاس آیوڈائیڈ، نمکیات، پارہ اور ایسڈ ٹینک نہ ملائیں۔

کیفین سائٹر اس: برومائڈز، آیوڈائیڈز، الکلیئر، خلاصہ ملیش، پارہ کے نمکیات اور ٹینک ایسڈ نہ ملائیں۔

کافور: کاربالک ایسڈ، کلورل ہائیڈریٹ، نیف تھول، تھائی مول، سیلول اور ری سارین
نہ ملائے جائیں۔

کاربالک ایسڈ: کلورل ہائیڈریٹ، فینے زون، فناستین، کافور، نیف تھول، ری سارین،
تھائی مول، برومین، آیوڈین، الکلیز، نائٹرک ایسڈ اور آئرن سالٹ نہ ملائیں۔

کلورل ہائیڈریٹ: الکلیز، آیوڈائڈز، الکحل، کاربالک ایسڈ، سلفونل، کافور، بودکس،
فینے زون، فناستین، ہائرومیڈین، برومائڈز وغیرہ نہ ملائیں۔

ڈیجیٹلیس کے مرکبات: سٹرائک الکلیز، آیوڈائڈز، آئرن سالٹ، گولڈ، سلور، لیمتھ،
انٹی مونی، معدنی تیزاب، سیلاڈونا، اوپیم، کوفین، نائٹرو گلیسرین نہ ملائیں۔

پوکونین: تیزاب، الکحل، الکلائن آیوڈائڈز نہ ملائیں۔

گلیسرین: کلوری نے فٹ لاکم، تیز نائٹرک ایسڈ اور ڈیٹا جانے والے اجزاء نہ ملائیں۔

ہیگزامن: اسپرین نہ ملائیں۔

ہائی پو فاسفائٹ: مرکب کلورائڈ اور دیگر اڑ جانے والے اجزاء نہ ملائیں۔

آیوڈائڈز: الکلائڈز، ایسڈ اور ایسڈ کے مرکبات، اسپرین، سیسہ اور پارہ کے محلول، نکیت،
الکلیز، سٹارچ، کاربالک ایسڈ، کلورل ہائیڈریٹ، سلور نائٹریٹ نہ ملائیں۔

لاکم وائٹر: ایسڈز اور الکلائڈز نہ ملائیں۔

لیومیل: الکلائن سلیوشن نہ ملائیں۔

میگ نے شیم سلفیٹ: الکلیز، الکلائن کاربونیٹ (سودیم یا پوٹاسیم) یا کاربونیٹ
اور ایمونیم کاربونیٹ کے علاوہ) فاسفیٹ، ایسڈ ایسی ٹیٹ، ایسڈ سودیم فاسفیٹ، کیلیم
کلورائڈ نہ ملائیں۔

من تھول: کاربالک ایسڈ، کلورل ہائیڈریٹ، نیف تھول، تھائی مول، ری سارین،
سیلول نہ ملائیں۔

پیرل ڈی ہائڈ: برومانڈ اور آیوڈائڈ نہ ملائیں۔
 پیپ سین: الکحل، الکلیئر، مے ٹمک سالٹس نہ ملائیں۔
 فٹاسٹین: کلورل ہائیڈریٹ، سیلی سلک ایسڈ نہ ملائیں۔
 فینے زون: اسپرین، انٹی فیرین، فارملڈی ہائڈ، ہیگز امن، سیلی سیلٹ، سیلول، کلورل
 ہائیڈریٹ، کاربالک ایسڈ، نیف تھول، من تھول، ٹے نن، مرکری سالٹس، آیوڈین، ٹائٹریٹ
 آئرن سالٹ نہ ملائیں۔
 پوٹاسیم کلورائیڈ: سلفر ٹے نن، انٹی مونی، ہائیڈرو فاسفیٹ، معدنی تیزاب اور شوگر
 نہ ملائیں۔
 سیلول: فینے زون، کیمفر، کلورل ہائیڈریٹ، کاربالک ایسڈ، من تھول، تھانی مول
 الکلیئر نہ ملائیں۔
 سلور نائٹریٹ: کلورائڈز، سلفیٹس، ایسی ٹیٹس، ٹائٹریٹس، ہائیڈرو سیانک ایسڈ اور
 سینائڈ، آیوڈین اور آیوڈائڈز، برومانڈز، کاربونیٹ، ٹے نن، فیرک کلورائڈ اور گے نک
 اجزاء نہ ملائیں۔
 سوڈیم سیلی سیلٹ: معدنی تیزاب اور تیزابی محلول، فیرک سالٹس، فٹاسٹین، فینے زون
 الکلائڈز وغیرہ نہ ملائیں۔
 اسپرٹ ایٹھرو سائی: الکلیئر، ٹے نن، برومانڈز، آیوڈائڈز، سیلی سیلٹ نہ ملائیں۔
 ٹے نک ایسڈ: الکلائڈز، لائٹ وائٹر، آئرن سالٹس، آیوڈین، پوٹاسیم پرمیگ نیٹ، الکلیئر
 معدنی تیزاب، فینے زون نہ ملائیں۔
 وے لی رمی نیٹس: تیزاب نہ ملائیں۔
 وائن: الکلیئر نہ ملائیں۔
 زنک سلفیٹ: الکلیئر اور الکلائٹ کے مرکبات، ٹے نن، لیڈ ایسی ٹیٹ، سلور نائٹریٹ

نہ ملائیں۔

آئرن کے مرکبات کو سیلیسیک ایسڈ، کاربالیک ایسڈ، انٹی پائیرین اور الکلائڈز کے ساتھ ملانے سے مکسچر بد رنگ ہو جاتا ہے اور الکلیئر کے ساتھ ملانے سے تہ نشین ہو جاتے ہیں۔ آئیوڈائڈز کے ساتھ شامل کرنے سے خالص آئیوڈین کا ذہرا لگ ہو جاتا ہے۔ اگر ان کو ٹے نن یا نباتی ادویہ کے ایکسٹریکٹس یا انفیوزن (سوائے کواشیا، کلہا اور چرائتہ کے) یا شکچرول جن میں ٹے نک ایسڈ موجود ہو، کے ساتھ ملائیں تو سیاہ رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔

ایموتیا کے مرکبات کے ساتھ نسخے میں ایسڈز، لائکوآر آرٹیک، ہائیڈروکلورک، سیرپ آف لینن، سیرپ آف سیلا، لائکوآر فرائی پر کلورائیڈ، الکلائڈز، کیلیم کلورائیڈ، کلورل ہائیڈریٹ اور انفیوزن روزنہ ملائے جائیں۔

غذائیات

Dietetics

غذا و بیماری

صحت ہو یا بیماری، ہر دو حالتوں میں غذا کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ تن و رستی کے زمانے میں عرصے تک غیر متوازن غذا کھانے سے جسم میں مرض سے مقابلے کی قوت کم ہو جاتی ہے اور بیماری، اسکروی، پلیریا، پچیش اور سل و دیگر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر بیماری کے زمانے میں غذا کی طرف توجہ نہ کی جائے تو اس سے بیماری بڑھ جاتی ہے اور وہ پیچیدہ صورت اختیار کر جاتی ہے۔ مثلاً اکثر بیماریوں میں بھوک کم اور قوت باطنہ کم زور ہو جاتی ہے۔ اگر اس حالت میں گوشت، گھی، مٹھائی اور نشاستہ دار غذائیں کم نہ کی جائیں تو بیماری کا دفعیہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اندرونی درموں میں ثقیل غذا مرض سے اچھا ہونے میں رکاوٹ ڈالتی ہے، اس لیے چند مخصوص امراض کی غذا اور پرہیز تحریر کیا جاتا ہے۔

Diarrhoea

اسہال

غنا ۱: اسہال کے مریضوں کی غذائیں روغنیات کم اور پروٹین زیادہ ہونے چاہئیں۔ نشاستہ دار غذائیں صرف اس مقدار میں دی جائیں کہ ان سے براز میں تخمیری کیفیت نہ پیدا ہو۔ شدید دستوں کی صورت میں کم از کم بارہ گھنٹے تک ہر قسم کی غذا بند کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد کچے انڈے کی سفیدی پانی میں حل کر کے پلائیں، یا دودھ چاول، مونگ کی دال کی نرم کچھڑی، اراروٹ، ساگو دانہ اور گیہوں کا دلیہ وغیرہ کھانا مفید ہے۔

پرہیز: تمام تکی ہوئی چیزیں، میوے کی روٹی، ہر قسم کی سبزیاں، مغزیات اور خشک میوے، پیسٹری اور ہر طرح کی مٹھائی سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

Diabetes

ذیابیطس

غذا ۱: اس بیماری میں نشاستہ دار اور شکر ملی غذائیں بالکل بند کر دیں۔ ان کی بجائے بطور غذا چوزوں کا شوربہ، ٹماٹر کا شوربہ، ہر قسم کی پھلی کا گوشت، پرندوں کا گوشت، انڈے، گردے، لبلبہ، مولی، پالک، خرفہ، پیاز، کمریلہ اور بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھلائیں۔ ہر قسم کے مغزیات، بادام، اخروٹ اور مونگ پھلی وغیرہ اور ترش پھل میے جاسکتے ہیں۔ پھلوں میں جامن بالخصوص مفید ہے اور سبزیوں میں کرلیا اور خرفہ کا ساگ فائدہ مند ہے۔ چائے بغیر شکر کے پی جائے اور دودھ کی بجائے اگر دہی اور چھچھا پی جائے تو زیادہ فائدہ مند ہے۔

پڑھائیں: کلیجی، چانل، ساگودانہ، ماروٹ، جو، آلو، گاجر، شلجم، مٹر، شکر قند، گنا، کھجور اور انگور وغیرہ نہ کھائیں۔

عام رھل آیات: مریض دماغی تکان سے بچے اور ہر طرح کے فکر و تردد سے آزاد رہے۔ ہر روز غسل ضرور کرنا چاہیے تاکہ جسم کی جلد صاف رہے۔ کپڑے ہر دوسرے تیسرے روز ضرور تبدیلی کر لیا کریں تاکہ مواد فاسدہ جلد سے جمع نہ ہوں، کیوں کہ میلے رہنے سے پھوڑے پھنسیاں نکلنے لگتی ہیں اور ذیابیطس کے مریض کے پھوڑے پھنسیاں بہت مشکل سے اچھے ہوتے ہیں۔

Phthisis

سل ووق

غذا ۱: اس مرض میں روغنی اور حرارت و قوت پیدا کرنے والی غذائیں فائدہ مند ہیں۔ دودھ سب سے اچھی غذا ہے، ہضم کے مطابق روزانہ مختلف اوقات میں سیر ڈیڑھ سیر تک دودھ پلایا جاسکتا ہے۔ دودھ کو صاف ستھرے برتن میں جوش دے کر پلائیں۔ اگر حرارت زیادہ نہ ہو تو دودھ میں انڈا پھینٹ کر بھی دے سکتے ہیں اور نیم برشت انڈا بھی دودھ کے ساتھ دیا جاسکتا ہے۔

مہنتوں کی وق میں جب مریض کو دست آرہے ہوں یا دودھ ہضم نہ ہوتا ہو تو تازہ میٹھی دہی

اور اس کی تسی دی جائے۔ ملائی اور مکھن بھی مضم کے مطابق دیا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں آتش جڑا لٹا اور دلیہ بھی دے سکتے ہیں۔ اچھی قسم کے بسکٹ اور ڈبل روٹی بھی کھا سکتے ہیں۔ گوشت خور مرض کے لیے بکری، مرغ کے چونوں، تیر اور بٹر وغیرہ کے گوشت کا شوربہ اور بخنی وغیرہ اچھی غذائیں ہیں۔ سبز پوں میں لوکی (گھیا کدو)، ٹنڈے، توری، پرول، شلجم، چندر، پالک، خرفہ اور تھوے کا ساگ مناسب ہے۔ گیہوں کی پتی روٹی اور ڈبل روٹی کے تیس آگ پر سینک کر ترکاری کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ ہر قسم کے تازہ پکے ہوئے پھل، میٹھے پھل اور شہد بھی مفید ہے۔

پڑھیز: ثقیل غذا، پیسٹری، تلی ہوئی چیزیں اور اکثر مٹھائیوں سے پرہیز کیا جائے۔

شدید ورم گردہ Acute Nephritis

غذا: زیادہ شدید حالت میں صرف دودھ پلایا جائے اور اس کے علاوہ دودھ، چاول، گیہوں کا دلیہ، آلو کا شرابا، گیہوں کی روٹی، ساگو دانہ، تازہ سبز ترکاریاں، مکھن، بالائی، پیاز وغیرہ کھلائیں۔ شدید بیماری میں نمک بالکل بند کر دیں اور جب مرض میں افاقہ ہو جائے تو یہ تدریجاً تھوڑی مقدار سے نمک شروع کر دیں۔ ہلکی چائے بھی پی سکتے ہیں۔

پڑھیز: تیز مسلے اور نمک بالکل نہ کھائیں۔ مسٹر، باقلا، دال ماش، مٹھائی اور کیک وغیرہ سے پرہیز کیا جائے۔

ورم مرارہ Cholecystitis

غذا: ٹھنڈی سبز ترکاریاں، ساگ پات اور تازہ میوے کھلائیں۔

پڑھیز: اس بیماری میں گھی، چربی، مکھن، انڈے کی ند دی، گردے اور کلیجی وغیرہ نہ کھائیں۔

مٹھائی، چاول، مسلے اور چٹنیاں بھی کم دی جائیں۔

کمی خون - ضعف عامہ Anaemia

غذا ۱: اس حالت میں زود ہضم اور لطیف غذا تھوڑی تھوڑی مقدار میں کمی مرتبہ کر کے دی جائے۔ ہر قسم کا شوربہ، بخنی، مچھلی، انڈے، گیہوں کی روٹی اور ہر قسم کی سبز ترکاریاں پکے ہوئے میوے اور پھل بالخصوص سیب، ناشپاتی، موسمی اور انار شیریں وغیرہ کھائیں۔

تب محرقہ Typhoid Fever

غذا ۱: اس مرض میں چونکہ آنتوں میں ورم ہو جاتا ہے، اس لیے غذا میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی ٹھوس غذا نہ دی جائے، بلکہ اس بیماری میں رقیق غذا، مثلاً دودھ، آتش جو، پتلا سا گودانہ وغیرہ کھلائیں، پھلوں میں موسمی، سنترہ، انار شیریں، ناشپاتی، سیب شیریں وغیرہ کا رس نکال کر پلایا جائے۔ اگر دودھ ہضم نہ ہو، یا اس کے پینے سے پیٹ میں اچھارہ ہو جائے، یا دست آجائیں تو دودھ کو پھاڑ کر اس کا پانی پلائیں۔

پڑھیں: ہر قسم کے گوشت، نشاستہ دار، روغنی اور ثقیل غذاؤں سے پرہیز کریں، بعض کو بار بار زیادہ مقدار میں غذا نہ دی جائے۔

جیاتین

Vitamins

غذائیں وٹامنز (Vitamins) کی کمی یا بالکل نہ ہونے سے اکثر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے آج کل اکثر بیماریوں کا علاج بھی وٹامنز کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے۔ پس ہر معالج کو علاج کے وقت وٹامنز کی کمی و بیشی کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر علامات مرض شدید ہوں تو حسب ضرورت ان کو بطور دوا استعمال کرنا ضروری ہے، ورنہ معمولی حالات میں صرف غذا کی درستی سے ہی بعض بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔

وٹامن اے (Vitamin A) اگر جسم میں یہ وٹامن کم ہو یا یہ بالکل نہ ہو تو بصارت کی کم زدوری اور شب کوری کا عارضہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ عام جسمانی کمزوری پیدا ہو کر متعدی امراض کو قبول کرنے کی استعداد بڑھ جاتی ہے، اسی لیے اس کو انٹی انفیکٹو وٹامن (Anti Infective Vitamin) بھی کہتے ہیں۔ یہ قدرتی طور پر حیوانات کے دودھ، کھن اور جگر میں پائی جاتی ہے اور سبز ترکاریوں میں بھی ہوتی ہے۔

وٹامن بی (Vitamin B) اس کے کئی جزو ہیں۔ وٹامن بی ۱ کی کمی سے کمزوری، دل، پٹھوں کا درد، پٹھوں کا درم اور بیری بیری وغیرہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو انٹی نیورائیٹک وٹامن (Antineuritic Vitamin) بھی کہتے ہیں۔ یہ جسم میں نشاستہ اور شکر کو جلا دیتی ہے۔ اگر یہ جسم میں نہ ہو تو شکر (گلوکوز) پورے طور پر جزو بدن نہیں بنتی۔ یہ خون کے سرخ دانوں کی تعداد بڑھاتی ہے، اس لیے یہ مرض کمی خون (انیمیا) کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ وٹامن نظام عصبی کا توازن اور آنتوں کا فعل درست رکھتی ہے۔ عورتوں کو حمل کے دنوں میں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ امریکن اس کو تھامین (Thiamin) اور انگلستان کے ڈاکٹر اس کو اینی یورن (Aneurin) کہتے ہیں۔

یہ زیادہ تر لمبی غذاؤں، دودھ، حیوانی جگر اور دماغ میں پائی جاتی ہے۔ اناج، مغزیات اور سالم آٹے کی موٹی میں بھی ہوتی ہے، لیکن میدے کی روٹی میں بالکل نہیں ہوتی۔ بشینوں سے صاف کیے ہوئے چارلوں میں بھی نہیں ہوتی۔ ایسے چاول کھانے سے مرض بیری بیری ہو جاتا ہے۔

وٹامن بی ۱۲: اس کی کمی سے اکثر جلدی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ مرض پلاگرا (جس میں جلد زبان اور پٹھوں میں سوجن ہو جاتی ہے) اسی کی کمی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کو ریبوفلیوین (Riboflavin) بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک جزو نکوٹینک ایسڈ ہے۔ اس کو انٹی پلاگرا (Anti pellagra vitamin) بھی کہتے ہیں بعض اوقات اس کے استعمال سے خراب اثرات بھی ہونے لگتے ہیں، یعنی اس کے استعمال کے چند منٹ بعد ہی چہرہ اور بعض دفعہ ہاتھ سرخ ہو جاتے ہیں۔ ان میں جلن سی ہوتی ہے، مگر یہ علامات پندرہ بیس منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں۔

وٹامن سی (Vitamin C) انسانی غذا میں اس کی کمی سے مسوڑھے متورم ہو جاتے ہیں۔ ان سے خون آنے لگتا ہے۔ جوڑ سوج جاتے ہیں۔ جسم کی مختلف جھلیوں سے خون خارج ہونے لگتا ہے۔ مرض 'سکروئی' ہو جاتا ہے۔ اس کی کمی سے دانتوں کی نشوونما پورے طور پر نہیں ہوتی، اس لیے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ جسم میں متعدی امراض (مونیا کائی کھنٹی اور سل و دق) سے مقابلے کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ قدرتی طور پر یہ وٹامن رس دار پھلوں خصوصاً لیموں، باٹا، سنگترہ، ٹماٹر اور تمام سبز ترکاریوں اور پھلوں میں پائی جاتی ہے۔

وٹامن ڈی (Vitamin D) اس کی کمی سے بچوں میں ریکٹس (ہڈیوں کا ٹیڑھا ہو جانا) اور عورتوں میں آسٹو پیٹیشیا (ہڈیوں کا نرم ہونا) وغیرہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کی زیادتی سے بعض اوقات گردوں میں پتھری بھی بن جاتی ہے۔ یہ وٹامن زیادہ تر حیوانی روغنیت مثلاً مچھلی کا تیل، کھن اور دودھ میں ہوتی ہے۔ اس کا وٹامن اے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ پھنچاں چہ جن غذاؤں میں وٹامن اے ہوتی ہے، ان میں یہ بھی موجود ہوتی ہے، لیکن نباتاتی تیلوں مثلاً اسی کے تیل اور بنوے کے تیل وغیرہ میں نہیں ہوتی۔

وٹامن ای (Vitamin E) اس کی کمی سے مردوں اور عورتوں میں قوت تولید کم ہو جاتی ہے۔ مردوں میں اس کے نہ ہونے سے نامردی، خصبیہ نیچے نہ اُترنا اور عورتوں میں بانجھ پن یا عارقی اسقاط ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام فرٹی لٹی وٹامن (Fertility Vitamin) بھی رکھا گیا ہے۔ یہ وٹامن نباتات خصوصاً بیجوں اور سبز پتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ حرارت سے ضائع نہیں ہوتی۔ آج کل پھلکا اُترے ہوئے گیہوں کے تیل سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے، جس کو وریٹ جرم آئل (Wheat Germoil) کہتے ہیں

وٹامن کے (Vitamin K) اس کی کمی سے سکرووی، نفرس، پُرانے اسہال، یرقان، سُدی اور ورم قولون متفرج وغیرہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ وٹامن جگر میں پہنچ کر پروتھرومبین میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو جریان خون کو روکتا ہے، اس لیے اس کو صفرا (بائل) کے ہمراہ جریان خون والی بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب جگر کے فعل میں خرابی ہو تو اس کو استعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ وٹامن زیادہ تر پالک، گاجر، ٹماٹر اور سویا بین کے تیل میں پائی جاتی ہے۔ یہ کھاری دواؤں اور سورج کی روشنی سے ضائع ہو جاتی ہے، مگر حرارت سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔

انڈیکس نمبر ۱ فارماکوپیا

صفحہ	نام دوا	صفحہ	نام دوا	صفحہ	نام دوا
۵۹	شریت جوہر شیر	۵۳	دوائے وارثہ	۴۷	اکیر شفا (قرص)
۶۰	شریت خاکسی	۵۴	دوائے غرغره	۴۷	بنفشی گلیسرین
۶۰	شریت ربوی	۵۴	دوائے غریزی	۴۷	ٹومی گلیسرین
۶۰	شریت ملین اطفال	۵۴	دوائے غذائی	۴۸	جوشینا
۶۱	شریت منغش	۵۵	دوائے گلو	۴۸	چوبی گلیسرین
۶۱	شیاف اکیر چشم	۵۵	روغن خارش	۴۸	حب حالبس قے
۶۲	صفائی	۵۵	سرمہ جست	۴۹	حب حدید
۶۲	مددوری	۵۶	سفوف ریوند مرکب	۴۹	حب داد خاص
۶۳	حماد راحت	۵۶	سفوف شرخ	۴۹	حب ڈبہ اطفال
۶۴	عرق استسقا خام	۵۶	سفوف شورہ قلمی	۵۰	حب رال
۶۵	عرق قولاد خام	۵۷	سعالین (قرص)	۵۰	حب سحاق
۶۵	عرق کافور	۵۷	سیال اکری فلیوین	۵۱	حب شہیقہ
۶۶	عرق گھیکوار خام	۵۸	سیال بندش خون	۵۱	حب عروس
۶۷	قرص اصفر جدید	۵۸	سیال شیریں	۵۱	حب نمکچور
۶۷	قرص الکلی	۵۸	سیال مسکن	۵۲	حب نزلہ
۶۸	قرص انفلونزا	۵۹	سیال نیم	۵۲	دوائے اسہال اطفال
۶۸	قرص بادام	۵۹	شافہ گلیسرین	۵۳	دوائے اوجاع
۶۹	قرص بنجاہ	۵۹	شریت تمرندی	۵۳	دوائے خارش جدید

صفحه	نام دوا	صفحه	نام دوا	صفحه	نام دوا
۷۸	مرهم برص جدید	۷۴	قرص ماسک البول جدید	۶۹	قرص بلاور
۷۸	مرهم بواسیر جدید	۷۴	قرص مدد	۶۹	قرص بواسیر جدید
۷۹	مرهم خارش جدید	۷۴	قرص مسکن	۷۰	قرص پمپش
۷۹	مرهم زال	۷۵	قرص مصفاة جدید	۷۰	قرص تمهیر
۷۹	مرهم کافور	۷۵	قرص لیسن	۷۰	قرص حالب
۸۰	مرهم حنظل	۷۶	قرص یمانی	۷۱	قرص دیدان جدید
۸۰	مغن سفید	۷۶	قطر چشم	۷۱	قرص ذیابیطس خاص
۸۱	منذوزا	۷۶	قلای	۷۲	قرص سیاه جربیان
۸۱	نونهال گرانپ سیرپ	۷۶	قلزم	۷۲	قرص سیلان خاص
۸۱	هیدرود بام	۷۷	کشتی گلیسرین	۷۳	قرص کلونجی
۸۲	هیدرود مرهم	۷۷	مرکبی (قرص)	۷۳	قرص گز
		۷۸	مرهم امیض	۷۴	قرص گل آسکه

انڈیکس نمبر ۲

امراض (ترتیب معالجاتی)

صفحہ	سر اور ٹھنوں کے امراض	صفحہ	متعدی امراض
۹۴	۱۔ درد سر	۸۲	۱۔ پیچڑوں کی دق و سل
۹۴	۲۔ آدھاسیسی	۸۴	۲۔ آنتوں کی دق
۹۵	۳۔ دماغ کی کمزوری (ضعف دماغ)	۸۴	۳۔ گلٹیوں کی دق
۹۵	۴۔ بھول اور کند ذہنی (نسیان)	۸۵	۴۔ ٹہریوں کی دق
۹۵	۵۔ سر جھکانا	۸۶	۵۔ طیریا (موسمی) بخار
۹۶	۶۔ نیند نہ آنا (سہر)	۸۶	۶۔ چھک
۹۶	۷۔ مرگی (صرع)	۸۷	۷۔ بوقی مجرہ
۹۷	۸۔ پاگل پن (جنون)	۸۸	۸۔ خسرہ
۹۷	۹۔ فلج و لقوہ (ادھرتنگ)	۸۸	۹۔ کالی کھانسی
	استحالی امراض	۸۹	۱۰۔ ہیضہ
۹۹	۱۔ گٹھیا (وجع المفاصل)	۸۹	۱۱۔ آتشک
۹۹	۲۔ زیا بیطس	۹۰	۱۲۔ سوزاک
	اعضائے ہضم کے امراض	۹۱	۱۳۔ کن پیڑ
۱۰۰	۱۔ دانٹوں کا درد	۹۲	۱۴۔ پیچش
۱۰۱	۲۔ دانٹوں کا میل	۹۲	۱۵۔ پیچش و بانی
۱۰۱	۳۔ دانٹوں کا ہلنا	۹۲	۱۶۔ نزلہ و زکام
۱۰۱	۴۔ سٹوٹھوں سے خون بہنا	۹۳	۱۷۔ انفلوئنزا (نزلہ و بانیہ)

صفحہ	نام مرض	صفحہ	نام مرض
	جگر اور تلی کے امراض	۱۰۱	۵۔ مسوڑھوں سے پیپ آنا (پائیدیا)
۱۱۳	۱۔ جگر کی گرمی		زبان کے امراض
۱۱۴	۲۔ درم جگر	۱۰۲	۱۔ قوت ذائقہ کا زوال
۱۱۴	۳۔ صنف جگر	۱۰۳	۲۔ زبان کا تھلنا (لکنت)
۱۱۵	۴۔ کمی خون (خون کی کمی)	۱۰۳	۳۔ زبان کا پھٹنا
۱۱۶	۵۔ استسقا (جلد ہر)	۱۰۴	۴۔ منہ آنا (قلاع)
۱۱۷	۶۔ یرقان (ہیلیا)	۱۰۴	۵۔ ہونٹوں کا پھٹنا
۱۱۸	۷۔ تلی کا بڑھ جانا۔ تلی کا ورم	۱۰۴	۶۔ حلق کا درد اور ورم
۱۱۹	۸۔ آنتوں کے کیڑے		معدہ اور آنتوں کے امراض
	آنکھوں کے امراض	۱۰۵	۱۔ معدہ کا درد
۱۲۰	۱۔ آنکھیں دکھنا (آشوب چشم)	۱۰۵	۲۔ بھوک کی کمی
۱۲۰	۲۔ بینائی کی کمزوری	۱۰۶	۳۔ پیاس کی زیادتی
۱۲۱	۳۔ جالا، بھولا	۱۰۶	۴۔ اچھارہ
۱۲۲	۴۔ ناخونہ	۱۰۷	۵۔ ہچکلی
۱۲۲	۵۔ رتونا	۱۰۷	۶۔ تھ اور متلی
۱۲۲	۶۔ ڈھلکا	۱۰۸	۷۔ خونی تھ
۱۲۳	۷۔ بامعنی	۱۰۹	۸۔ دست آنا
۱۲۳	۸۔ گوبارنجی	۱۱۰	۹۔ قبض
۱۲۴	۹۔ روے (گلے)	۱۱۰	۱۰۔ سنگرہنی
	ناک اور کان کے امراض	۱۱۱	۱۱۔ بدبھمی
۱۲۴	۱۔ کان کا درد	۱۱۲	۱۲۔ قرینچ

صفحہ	نام مرض	صفحہ	نام مرض
۱۳۴	۲۔ پیشاب کی بندش	۱۲۵	۲۔ کان بہنا
۱۳۷	۳۔ پیشاب کی جلن	۱۲۶	۳۔ بہرا پن
۱۳۷	۵۔ پیشاب کی زیادتی	۱۲۶	۴۔ کان کی پھنسیاں
۱۳۸	۶۔ خونی پیشاب	۱۲۶	۵۔ کان کا ورم
۱۳۹	۷۔ پیشاب کا قطرہ قطرہ آنا	۱۲۷	۶۔ نکسیر (ناک کے امراض)
۱۳۹	۸۔ کیلوسی پیشاب	۱۲۷	۷۔ ناک کی بدبو
۱۳۹	۹۔ زلالی پیشاب	۱۲۸	۸۔ ناک کے کیڑے
۱۴۰	۱۰۔ پیشاب کا بے ارادہ نکلنا	دوران خون کے اعضا کے امراض	
۱۴۰	۱۱۔ مثانے کا درد	۱۲۸	۱۔ خون کے دباؤ کی زیادتی (فشار خون قوی)
	جلد کے امراض	۱۲۸	۲۔ خون کے دباؤ کی کمی (فشار خون ضعیف)
۱۴۱	۱۔ کھجلی (خارش)	۱۲۹	۳۔ دل کا درد
۱۴۲	۲۔ راد	۱۳۰	۴۔ دل کی دھڑکن
۱۴۲	۳۔ گھنگھ	پھیپھڑوں کے امراض	
۱۴۳	۴۔ پھلجھری	۱۳۰	۱۔ پسلی کا درد (سمونیا)
۱۴۳	۵۔ چھپ اور جھائیں	۱۳۱	۲۔ کھانسی
۱۴۴	۶۔ گرمی دانے	۱۳۲	۳۔ دمہ
۱۴۴	۷۔ مہاسے	۱۳۳	۴۔ خون متوکتا
۱۴۴	۸۔ چھاجن	گردہ اور مثانہ کے امراض	
۱۴۵	۹۔ پتی اچھلنا (چھپاکی)	۱۳۴	۱۔ درد گردہ
۱۴۶	۱۰۔ بال خورہ	۱۳۴	۲۔ گردہ اور مثانے کی پتھری

صفحہ	نام مرض	صفحہ	نام مرض
۱۵۸	۲۔ جربیان		جراحی امراض
۱۶۰	۳۔ احتلام	۱۴۶	۱۔ پھوڑے پھنسیاں
۱۶۱	۴۔ شریعت انزال	۱۴۷	۲۔ بد
	عورتوں کے خاص امراض	۱۴۸	۳۔ کچھری، لکڑی (دوم غدو دلف)
۱۶۲	۱۔ رحم کی سوجن (دوم الرحم)	۱۴۸	۴۔ سبکدرد
۱۶۲	۲۔ زخم رحم	۱۴۹	۵۔ انگل بیڑ
۱۶۳	۳۔ سیلان الرحم	۱۴۹	۶۔ ناروا
۱۶۴	۴۔ حیض کی زیادتی	۱۵۰	۷۔ زخم، گھاؤ
۱۶۵	۵۔ حیض کی بندش	۱۵۱	۸۔ بوائی پھٹنا
۱۶۵	۶۔ بانجھ پن	۱۵۱	۹۔ بواسیر
۱۶۶	۷۔ باؤ گولہ (ہسٹریا)	۱۵۲	۱۰۔ خفیوں کا درد اور دم
۱۶۸	۸۔ شرم گاہ کی خارش	۱۵۲	۱۱۔ خفیوں کی خارش اور زخم
۱۶۸	۹۔ شرم گاہ کی پھنسیاں		بعض عمومی امراض
۱۶۹	۱۰۔ شرم گاہ کا زخم	۱۵۳	۱۔ کمر کا درد
۱۶۹	۱۱۔ پستان کا دم	۱۵۴	۲۔ پرانا بخار
۱۷۰	۱۲۔ پھٹنی کا پھٹنا	۱۵۴	۳۔ انگلیوں کا پھولنا
۱۷۰	۱۳۔ حمل گر جانا	۱۵۵	۴۔ آواز بیٹھ جانا
	حاملہ کے امراض	۱۵۵	۵۔ گھسیکا
۱۷۱	۱۔ درد سر		مردوں کے خاص امراض
۱۷۱	۲۔ درد دندان	۱۵۶	۱۔ نامردی (ضعف باہ)

صفحہ	نام مرض	صفحہ	نام مرض
	زچہ کے امراض		۳۔ نیند نہ آنا
۱۷۹	۱۔ باؤ گولہ	۱۷۲	۴۔ تھوک کی زیادتی
۱۷۹	۲۔ خونِ نفاس کی بندش	۱۷۲	۵۔ پستانوں کا درد
۱۸۰	۳۔ خون کا زیادہ آنا	۱۷۲	۶۔ کھانسی
۱۸۰	۴۔ زچہ کا بخار	۱۷۳	۷۔ دل کی دھڑکن
۱۸۱	۵۔ بھٹی کا زخم	۱۷۳	۸۔ پیٹ کا درد
۱۸۱	۶۔ دودھ کی کمی	۱۷۴	۹۔ قے و متی
۱۸۱	۷۔ دودھ کی زیادتی	۱۷۴	۱۰۔ کولہ اور مٹی وغیرہ کھانے کی خواہش
	بچوں کے امراض	۱۷۵	۱۱۔ قبض
۱۸۳	۱۔ بچوں کی مرگی	۱۷۵	۱۲۔ اسہال
۱۸۳	۲۔ بچہ کانیند میں ڈرنا	۱۷۵	۱۳۔ پھپھ
۱۸۴	۳۔ پیاس کی زیادتی	۱۷۶	۱۴۔ پیشاب کا بند ہو جانا
۱۸۴	۴۔ آنکھیں دھکنا	۱۷۶	۱۵۔ پیشاب کا بار بار آنا
۱۸۴	۵۔ روپھ (گلرے)	۱۷۷	۱۶۔ بواسیر
۱۸۴	۶۔ کان بہنا	۱۷۷	۱۷۔ شرم گاہ کی خارش
۱۸۵	۷۔ کان کا درد	۱۷۷	۱۸۔ سفید رطوبت کا بہنا (سیلان الرحم)
۱۸۵	۸۔ منہ آنا	۱۷۸	۱۹۔ بول نہ لانی
۱۸۵	۹۔ نزلہ و زکام	۱۷۸	۲۰۔ خون کی کمی
۱۸۶	۱۰۔ کالی کھانسی	۱۷۸	۲۱۔ بخار

صفحہ	نام مرض	صفحہ	نام مرض
۱۸۹	۱۶۔ بستر پیشاب نکل جانا	۱۸۶	۱۱۔ ڈوب اطفال، (سپلی چلنا)
۱۸۹	۱۷۔ کانچ نکلنا	۱۸۷	۱۲۔ تے
۱۹۰	۱۸۔ کساح	۱۸۷	۱۳۔ اکھارہ
۱۹۰	۱۹۔ موتی جمرہ	۱۸۷	۱۴۔ دست آنا
۱۹۰	۲۰۔ گلے پڑنا (گلے آنا)	۱۸۸	۱۵۔ پیٹ کے کیرے

انڈیکس نمبر ۳ امراض

نام مرض	صفحہ	نام مرض	صفحہ	نام مرض	صفحہ
الف		احتلام	۱۶۰	آتشک	۸۹
آتشک	۸۹	اختلاج قلب	۱۳۰	آدھاسیسی	۹۵
آدھاسیسی	۹۵	اختناق الرحم	۱۶۶	آشوب چشم (امراض اطفال)	۱۲۰
آشوب چشم (امراض اطفال)	۱۲۰	ادھرنگ	۹۷	آگ سے جلنا	۱۹۲
آگ سے جلنا	۱۹۲	استحالی امراض	۹۹	آنسو کی وق	۸۴
آنسو کی وق	۸۴	استسقا	۱۱۶	آنسو کے کیڑے	۱۱۹
آنسو کے کیڑے	۱۱۹	استسقا حاصل	۱۷۰	آنکھوں کی بیماریاں	۱۲۰
آنکھوں کی بیماریاں	۱۲۰	اسہال (امراض حاملہ)	۱۷۵	آنکھیں دکھنا (امراض اطفال)	۱۲۰
آنکھیں دکھنا (امراض اطفال)	۱۲۰	(امراض اطفال)	۱۸۷	آنکھ میں کچھوٹ جانا	۱۹۲
آنکھ میں کچھوٹ جانا	۱۹۲	اعفائے بضم کے امراض	۱۰۰	آشیوٹین کا زہر	۲۰۸
آشیوٹین کا زہر	۲۰۸	(نفلر استرا (نزہ و بائیہ)	۹۳	آواز بیٹھ جانا	۱۵۵
آواز بیٹھ جانا	۱۵۵	انگل بیڑ	۱۴۹	ارتقائی حادثات	۱۹۲
ارتقائی حادثات	۱۹۲	انگلیوں کا پھولنا	۱۵۴	ارتقائی حادثات کی دوائیں	۲۰۳
ارتقائی حادثات کی دوائیں	۲۰۳	ب		اچھارہ (امراض اطفال)	۱۰۶
اچھارہ (امراض اطفال)	۱۰۶	بال خورہ	۱۴۶	احتباس البول	۱۳۶
احتباس البول	۱۳۶	باصمینی	۱۲۳	احتباس حیف	۱۶۵
احتباس حیف	۱۶۵	بانجھ پن	۱۶۵		
نام مرض	صفحہ	نام مرض	صفحہ	نام مرض	صفحہ
بلوغت (امراض حاملہ)	۱۶۶	بجھل کے امراض	۱۸۳	بجھل کی پرورش	۴۳
بجھل کے امراض	۱۸۳	بچے کا نیندیں ڈرنا	۱۸۳	بجھل کے امراض کی تشخیص	۴۲
بجھل کی پرورش	۴۳	بجھل کے انیمال گانا	۴۵	بجھل کی مرگی (امراض اطفال)	۱۸۳
بچے کا نیندیں ڈرنا	۱۸۳	بجھل کی مرگی (امراض اطفال)	۱۸۳	بجھل کا وزن اور قد	۴۴
بجھل کے انیمال گانا	۴۵	بجھل کا وزن اور قد	۴۴	بجھل الصوت	۱۵۵
بجھل کی مرگی (امراض اطفال)	۱۸۳	بجھل الصوت	۱۵۵	بجھل (امراض حاملہ)	۱۷۸
بجھل کا وزن اور قد	۴۴	بجھل (امراض حاملہ)	۱۷۸	بد	۱۴۷
بجھل الصوت	۱۵۵	بد	۱۴۷	بد خوابی	۱۶۰
بجھل (امراض حاملہ)	۱۷۸	بد خوابی	۱۶۰	بد صفی	۱۱۱
بد	۱۴۷	بد صفی	۱۱۱	براز کا امتحان	۱۳
بد خوابی	۱۶۰	براز کا امتحان	۱۳	برص	۱۴۳
بد صفی	۱۱۱	برص	۱۴۳	بستر پیشاب نکل جانا	
براز کا امتحان	۱۳	بستر پیشاب نکل جانا		(امراض اطفال)	۱۸۹

نام مرض	صفحہ	نام مرض	صفحہ	نام مرض	صفحہ
بعض عمومی امراض	۱۵۳	پیشی اچھلنا	۱۴۵	پیشاب کی بندش	۱۳۶
بلغم کا امتحان	۱۵	چیرا نا بخار	۱۵۴	پیشاب کا بار بار آنا	
بواسیر (امراض حاملہ)	۱۵۱	پر سوت کا بخار	۱۸۰	(امراض حاملہ) ۱۴۹	
بولی پھٹنا	۱۵۱	پستان کا خلم	۱۶۹	پیشاب کا بند ہو جانا	۱۳۶
بول بالدم	۱۳۸	پستانوں کا درد (امراض حاملہ)	۱۶۳	(امراض حاملہ) ۱۴۶	
بول زلالی (امراض حاملہ)	۱۳۹	پسلی چلنا (امراض اطفال)	۱۸۶	پیشاب کا امتحان	۱۷
بول فی الفراش	۱۸۹	پسلی کا درد	۱۸۶	پیشاب کے لیے ایلوڈہ نکلتا	۱۳۰
(امراض اطفال)		پچھلھری	۱۴۳	پیشاب کا قطرہ قطرہ آنا	۱۳۹
بول کیلوسی	۱۳۹	پھوٹے ٹھنسیاں	۱۴۶	پیشاب کی جلن	۱۳۷
بھٹنی کا پھٹنا	۱۷۰	سچولا	۱۲۱	پیشاب کی زیادتی	۱۳۷
بھٹنی کا زخم (امراض زنجیر)	۱۸۱	پیاس کی زیادتی	۱۰۶	بیلیا (یرقان)	۱۱۷
بہرین	۱۲۶	(امراض اطفال) ۱۸۴		ت	
بھگندر	۱۴۸	پھیپھڑوں کا درم	۱۳۰	تپ کہنہ	۲۲۶
بھوک کی کمی	۱۰۵	پھیپھڑوں کی سل و دق	۸۳	تقطیر البول	۱۳۹
بھول اور کند ذہنی	۹۵	پھیپھڑوں کے امراض	۱۳۰	تلی کا بڑھنا	۱۱۸
بینائی کی کمزوری	۱۲۰	پیٹ کا درد (امراض حاملہ) ۱۶۳		تلی کا درم	۱۱۸
بے ہوشی	۱۹۳	پیٹ کے کپڑے		تن درست نہجے کا طبیعی معیار	۴۵
پ		(امراض اطفال) ۱۸۸		تھوک کی زیادتی	
پارے کا زہر	۲۰۷	پیشی (امراض حاملہ) ۹۲		(امراض حاملہ) ۱۴۲	
پاگل پن	۹۷	پیشی و بانی	۹۲	تیزابی اور کھارسی زہر دہن کا علاج	۲۰۸

نام مرض	صفحہ	نام مرض	صفحہ	نام مرض	صفحہ
ث		ج		خسرہ	۸۸
ثقل سماعت	۱۲۴	چر نے	۱۸۸	خشک گلاس لگانا	۲۱۳
ج		چند مشہور زہروں کا علاج	۲۰۶	خضیوں کا بعد از زخم	۱۵۲
جالا، بھولا	۱۲۱	چوٹ لگانا	۱۹۵	خضیوں کی خارش اور زخم	۱۵۲
جراثیمی پیمپش	۹۲	چھاجن	۱۴۴	خفقان	۱۳۰
جراحی امراض	۱۴۶	چھپاکی	۱۴۵	خنازیر	۸۴
جریان	۱۵۸	چھپ اور عجائبات	۱۵۳	خون کا بہنا	۱۹۷
جریان خون بعد از ولادت		چپک (امراض اطفال)	۸۶	خون تھوکانا	۱۳۳
(امراض زچہ)	۱۸۰	ح		خون کا امتحان	۲۴
جریان منی	۱۵۸	حاملہ کے امراض	۱۷۱	خون کا زیادہ آنا (امراض حاملہ)	
جسمانی حرارت	۳۹	حلق کا درد اور زخم	۱۰۴	خون کی کمی (امراض حاملہ)	۱۱۵
جگر اور تلی کے امراض	۱۱۳	حلق میں کسی چیز کا پھنس جانا	۱۹۷	خون کے دباؤ کی زیادتی	۱۲۸
جگر کی گرمی	۱۱۳	حمل گرنا	۱۷۰	خون کے دباؤ کی کمی	۱۲۸
جلد کے امراض	۱۴۱	حمی امحرقہ بطنی	۸۷	خون نفاس کی بندش	۱۷۹
جمره	۱۵۴	حمی مزمن	۱۵۴	(امراض حاملہ)	
جنون	۹۷	حیاتیں	۲۲۷	خونی پیشاب	۱۳۸
جور کا اکھڑ جانا	۲۰۰	حیض کی بندش	۱۶۵	خونی تھے	۱۰۸
جو تک، لگانا	۲۰۹	حیض کی زیادتی	۱۶۴	د	
جہازی تھے		خ		داد	۱۴۲
ججائیاں	۱۴۳	خارش	۱۴۱	دانوں کا درد	۱۰۰

صفحہ	نام مرض	صفحہ	نام مرض	صفحہ	نام مرض
۱۶۲	زخم رحم	۱۲۲	ڈبہ اطفال (امراض اطفال)	۱۶۱	وانتوں کا ٹیل
۱۳۹	زلالی پیشاب	۱۲۲	ڈھلکا	۱۶۱	وانتوں کا ہلنا
۲۰۴	زہر خوردہ کی عام علامات	۱۲۲	ڈ	۱۶۱	ورد دندان (امراض حاملہ)
۲۰۴	زہروں کا علاج	۱۳۰	ذات الریہ	۹۴	دوسر (امراض حاملہ)
۴۰	سانس	۹۹	ذیابیطس	۱۶۱	دو گرہ
۹۵	سدر و دوار	۲۶۴	ر	۱۶۱	دست آقا (امراض اطفال)
۹۵	سر حکرانا	۱۲۲	رتوندا	۸۴	دق الاسماء
۱۶۱	سرعت انزال	۱۶۲	رحم کی سوجن	۸۴	دق خنا زیری
۱۳۱	سرفہ (کھانسی)	روچے	روحے	۸۳	دق الریہ
۱۳۱	سعال	۱۲۳	(امراض اطفال)	۸۵	دق عظام
۱۴۲	سوفہ	۱۸۴	ز	۱۲۹	دل کا درد
۷۷	سفید رطوبت کا بہنا	۱۰۲	زبان کے امراض	۱۳۰	دل کی دھڑکن (امراض حاملہ)
	(امراض حاملہ)	۱۰۳	زبان کا پھٹنا	۱۴۱	دماغ اور اعصاب کے امراض
۸۴	سل لطیف	۱۰۳	زبان کا تھلانا (کنکت)	۱۳۲	دمہ
۸۳	سل ریوی	۱۲۹	زچہ کے امراض	۱۳۲	دمہ
۱۴۰	سلس البول	۱۸۰	زچہ کا بخار (امراض حاملہ)	۱۸۱	دودھ کی زیادتی (امراض زچہ)
۲۰۷	سنگیے کا زہر	۹۲	زحیر	۱۸۱	دودھ کی کمی (امراض زچہ)
۱۱۰	سنگیہنی	۹۲	زحیر و بانی	۱۲۸	دوران خون کے اعضا کے امراض
۹۰	سوزاک	۱۵۰	زخم	۲۵۸	دھات جانا
				۲۰۶	دھتورے کا زہر

صفحہ	نام مرض	صفحہ	نام مرض	صفحہ	نام مرض
۲۰۳	فہرست سامان اتفاقی حادثات	۱۵۶	ض	۱۱۳	صوبہ مزاج کبد حار
	ق	۱۲۰	ضعف باہ	۱۱۱	سودہ ہضم (بد ہضمی)
۱۱۰	تبض (امراض حاملہ)	۱۱۴	ضعف بصر	۹۵	سہر
۱۴۵			ضعف جگر	۱۸۴	سیلان الاذن
۱۵۰	قرحہ	۹۵	ضعف دماغ		(امراض اطفال)
۱۰۴	قلاع	۱۱۴	ضعف الکبد (ضعف جگر)	۱۶۳	سیلان الرحم
۱۸۵			ضیق النفس	۱۷۷	
۱۰۲	قوت دالہ کا زوال	۱۳۲	ع	۱۵۸	سیلان منی
۱۱۲	قولنج				مش
۱۸۷	قے (امراض اطفال)	۱۴۹	عرق مدنی (ناروا)	۱۶۸	شرم گاہ کی پھنسیاں
۱۰۷	قے و متلی	۱۸۴	عطاش		شرم گاہ کی خارش
	ک		عورتوں کے خاص امراض	۱۶۸	(امراض حاملہ)
	کالی کھانسی		غ	۱۷۷	
۱۸۹	(امراض اطفال)	۲۲۳	غذا اور پرہیز	۱۶۹	شرم گاہ کا زخم
۱۲۴	کان کے امراض	۱۵۵	غوطر	۱۴۵	شری (بیتی)
	کان سینا (امراض اطفال)		ف	۱۲۳	شعیرہ
۱۴۵				۹۴	شقیقہ
۱۸۴		۹۷	فالج و لقوہ		شہیقہ (امراض اطفال)
۱۲۶	کان کی پھنسیاں	۱۲۸	فشار خون		ص
۱۲۴	کان کا درد (امراض اطفال)		فشار خون قوی	۹۴	صداع
۱۸۵		۳۷	فشار خون ضعیف	۹۶	صرع
۱۲۶	کان کا وزم	۱۲۸			
۱۹۸	کان میں کسی چیز کا پھنس جانا	۱۲۸			
۱۸۹	کچا نکلنا (امراض اطفال)	۱۰۷	فواق (پھکی)		

صفحہ	نام مرض	صفحہ	نام مرض	صفحہ	نام مرض
۹۶	مرگی	۹۱	گلسوئے	۱۴۸	کچھالی
۱۰۱	مسورٹھوں سے پیپ آنا	۱۹۰	گلے پڑنا (امراض اطفال)	۱۸۸	کریم شکم (امراض اطفال)
۱۰۱	مسورٹھوں سے خون بہنا	۱۵۵	گلہڑ	۱۹۰	کساح (امراض اطفال)
۱۰۵	معدہ اور آنتوں کے امراض	۱۴۲	گنج	۱۴۸	گلدالی
۱۰۵	معدہ کا درد	۱۲۳	گودا بخنی	۱۲۴	گلرے (امراض اطفال)
۸۶	ملیریا (موسمی بخار)	۱۵۰	گھاؤ (زخم)	۱۴۸	گھکیاری
۱۰۴	منہ آنا (امراض اطفال)	۱۴۹	گھبیلین کا درد	۱۵۳	کمر کا درد
۱۹۰	موتی جھرہ (امراض اطفال)	۱۲۳	گھیری	۲۲۶	کمی خون
۱۹۹	مویج آنا	۱۵۵	گھیکا	۱۸۳	کیڑے
۸۶	موسمی بخار		ل	۹۱	کن پھیڑ
۱۴۴	ٹہہا سے	۹۷	لقوہ		کوئلہ اور سٹی کے کھانے کی عادت
	ن	۱۰۳	لکنت	۱۳۱	کھانسی (امراض حاملہ)
۱۲۲	ناخوٹ		م	۱۴۱	کھلی (خارش)
۱۴۹	نالہ وا	۲۹	مادہ تولید کا امتحان	۱۳۹	کیوسی پیشاب
۱۲۷	ناک کے امراض	۸۳	متعدی امراض		گ
۱۲۷	ناک کی بدبو	۱۷۳	متلی و تے (امراض حاملہ)	۹۹	گھٹیا
۱۴۸	ناک کے کیڑے	۲۱۹	متفاد یا تقیض ادویہ	۱۳۴	گردہ و مثانے کی پتھری
۲۰۰	ناک میں کسی چیز کا پھنس جانا	۱۴۰	مثانہ کا درد	۱۳۴	گردہ و مثانے کے امراض
۱۵۶	نامردی	۴۱	مرد کے جسم کا اصلی وزن	۱۴۴	گریمی دلنے
۳۸	نبض	۱۵۶	مردوں کے خاص امراض	۸۴	گلیٹوں کی دق

صفحہ	نام مرض	صفحہ	نام مرض	صفحہ	نام مرض
۱۰۷	ہچکی	۱۲۹	وجع القلب	۹۳	نزہہ و باقی
۲۰۰	ہڈی کا ٹوٹ جانا	۱۳۴	وجع الکلیہ	۹۲	نزہہ و زکام (امراض اطفال)
	ہڈیوں کا نرم پڑ جانا	۹۹	وجع المفاصل	۹۵	نیان
۱۹۰	(امراض اطفال)	۱۵۳	وجع القطن	۱۲۰	نظر کی کمزوری
۸۵	ہڈیوں کی دق	۱۱۴	ورم جگر	۱۳۳	نفش الدم
۱۰۳	ہسکلاپن	۱۶۲	ورم رحم	۱۸۷	نفع شکم (امراض اطفال)
۱۰۴	ہونٹوں کا پھٹنا	۱۴۸	ورم غدود بنف	۱۷۷	نکیر
۸۹	ہیمنہ	۱۴۷	ورم غدود کچی ران	۹۶	نیمہ آتا (امراض اطفال)
	ی		ورم لوزتین (امراض اطفال)	۱۷۲	
۱۱۷	یرقان	۵		۲۲۷	وٹامنز (حیاتین)

انڈیکس نمبر
مفردات اور گھریلو دوائیں
جن کا ذکر علاج الامراض میں آیا ہے

الف

- ۱۔ آب برگ قہ سبز یرقان، عظیم طحال، گردے کی پتھری ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۳۴
- ۲۔ آب برگ شاہترہ سبز خارش ۱۴۱
- ۳۔ آب برگ کاسنی سبز آنسو کی دق، ناروا، ورم ۱۱۳ - ۱۲۹ - ۸۴
- ۴۔ آب برگ مکو سبز آنسو کی دق، ورم رحم ۱۶۲ - ۸۴
- ۵۔ آب بیدل پیمش ۱۷۵ - ۹۲
- ۶۔ آب جگر شکر پی، کمی بخون ۱۷۸ - ۱۱۵ - ۱۱۰
- ۷۔ آب کریلا سبز ذیابیطس، استسقا، عظیم طحال ۱۱۸ - ۱۱۶ - ۲۲۴ - ۹۹
- ۸۔ آب کشیز سبز ناروا ۱۴۹
- ۹۔ آب لیوں خارش، داد، قے و متی، امراض حاطہ تیزابی ۲۰۸ - ۱۷۴ - ۱۴۲ - ۱۴۱
- اور کھاری زہروں کا علاج
- ۱۰۔ آب جوشن کان کا درد، کچھالی، پرانا بخار ۱۵۴ - ۱۴۸ - ۱۸۵ - ۱۳۴
- ۱۱۔ آرابوٹ آئیوڈین ۲۰۸
- ۱۲۔ آرد سنگھاٹ ضعفِ باہ ۱۵۶
- ۱۳۔ آرنڈ کی کوپلی چند مشہور زہروں کا علاج ۲۰۶
- ۱۴۔ آرنڈ می خربونہ عظیم طحال ۱۱۸
- ۱۵۔ آرد ہمکی ۱۰۷
- ۱۶۔ اسپرٹ مسقی لینڈ خشک گلاس لگانا، جوش لگنا ۱۹۵ - ۲۱۲

زبان کا پھٹنا، بے ہوشی، بواسیر، پھٹی (امراض حاملہ) ۱۰۳-۱۵۱-۱۷۷-۹۲	۱۷- اسپیٹل مسلم
درد کمر ۱۵۳	۱۸- اسگند
پشیاں بار بار آنا، امراض حاملہ، چند شہور ۱۷۶-۲۰۶	۱۹- آتش جو
زہر دل کا علاج	
سیلان الرحم، کھانسی (امراض حاملہ) ۱۴۳-۱۷۷-۱۷۲	۲۰- اصل السوس مقشر
قے (امراض اطفال) ۱۸۷	۲۱- الایچی خورد مسلم
سینہ، دست آنا، بد ہضمی ۸۹-۱۰۹-۱۸۷-۱۱۱	۲۲- الایچی کلاں مسلم
گنج ۱۳۲	۲۳- کم کے اچار کا تیل
آنکھوں کی دق، درد ورم حلق ۸۳-۱۰۳	۲۴- امتاس
بھلا لہ ۲۰۸	۲۵- اہلی کے سبز پتے
قے و متلی، پیاس، اسہال، نکسیر، سیلان الرحم، ۱۴۳-۱۰۹-۱۷۷-۱۳۷	۲۶- آملہ
عمل گرنا، دست آنا (امراض حاملہ) ۱۴۳-۱۷۷-۱۰۹-۱۸۷	
پیٹ کے کیرے (امراض اطفال) ۱۸۸	۲۷- انار ترش
قے و متلی ۱۷۳	۲۸- انار روانہ
میرقان، قے و متلی (امراض حاملہ) ۱۱۷-۱۷۷	۲۹- انار شیریں
جالا سمجھولا ۱۲۱	۳۰- انبہ ہلدی
عظیم طحال ۱۱۸	۳۱- انجیر
دست آنا (امراض اطفال) آنکھ میں کچھ پڑ جانا ۱۰۹-۱۸۷-۱۹۲	۳۲- انڈے کی سفیدی
ناروا ۱۲۹	۳۳- ایلوا
پھل بھری ۱۳۳	ب
	۱- بابجی

۱۰۶	۱- باجره	۱- باجره
۱۱۶-۱۱۱-۱۰۹-۹۷	۳- بادیان	۳- بادیان
۱۲۰-۱۳۰-۱۲۵-۱۲۰	۲- بادیان	۲- بادیان
۱۸۰	۴- باؤ بڑنگ	۴- باؤ بڑنگ
۱۰۰	۵- بول	۵- بول
۱۵۸	۶- برادہ صندل سفید	۶- برادہ صندل سفید
۱۳۸	۷- برادہ ہاتھی دانت	۷- برادہ ہاتھی دانت
۱۶۵	۸- برگ آڑوسہ	۸- برگ آڑوسہ
۱۳۳-۸۳	۹- برگ اسکند	۹- برگ اسکند
۱۵۳	۱۰- برگ اکھ	۱۰- برگ اکھ
۹۹	۱۱- برگ باد بھویہ	۱۱- برگ باد بھویہ
۱۳۹	۱۲- برگ بالہ	۱۲- برگ بالہ
۱۳۳-۱۳۲	۱۳- برگ بکھن	۱۳- برگ بکھن
۱۶۲	۱۴- برگ بھنگ	۱۴- برگ بھنگ
۱۵۲	۱۵- برگ تمباکو	۱۵- برگ تمباکو
۱۳۳	۱۶- برگ چولائی	۱۶- برگ چولائی
۱۲۳	۱۷- برگ خرفہ	۱۷- برگ خرفہ
۱۶۲	۱۸- برگ خطی	۱۸- برگ خطی
۱۶۹	۱۹- برگ دھتورہ سبز	۱۹- برگ دھتورہ سبز
۱۶۲	۲۰- برگ سنجالو	۲۰- برگ سنجالو

۱۶۲	ورم رحم	۲۱۔ برگ سویا
۱۶۲	ورم رحم	۲۲۔ برگ سہنجہ
۱۶۲	ورم رحم	۲۳۔ برگ کاسنی
۱۱۶	استقا	۲۴۔ برگ کوندی
۱۶۲	ورم رحم	۲۵۔ برگ مکو
۱۵۲	خصیوں کی خارش	۲۶۔ برگ مہندی
۱۶۲	ورم رحم	۲۷۔ برگ نرمہ کپاس
بامعنی، کان کا درد، کان بہنا، تاک کے کیرے، ۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۸۔		۲۸۔ برگ نیم
کچھڑالی، پھوڑے پھنیاں، زخم، ورم، زخم رحم، ۱۲۸-۱۲۶-۱۵۰-۱۲۶۔		
شرم گاہ کا زخم، زچہ کا بنجارہ		
۱۶۲-۱۶۹-۱۸۰۔		
۲۰۶	چند مشہور زہروں کا علاج	۲۹۔ بکری کا دودھ
۱۱۰-۱۱۵-۱۲۲	شکرہ منی، کمٹی خون، رتوذا	۳۰۔ بکری کی کلیجی
۱۰۶-۱۰۳	زبان کا پھٹنا، پیاس کی زیادتی	۳۱۔ بہدانہ
۱۵۶	ضعف باہ	۳۲۔ بیضہ مرغ
پ		
۱۲۶	پھوڑے پھنیاں	۱۔ پان
۱۱۸	عظیم طحال	۲۔ پیپتہ
۱۷۹	گھیلن کا درد	۳۔ پیرا نا کھوپرا
۱۰۱	موڑھوں سے پیپ آنا	۴۔ پریٹگنیٹ آف پوٹاس
۲۰۴	زہر خوردہ کی علامات	۵۔ پکھان بید
بیضہ رتہ قلی، دست آنا، بدمعنی، قولنج، پٹی، ۸۹-۱۰۷-۱۰۹-۱۱۱-۱۲۵۔		۶۔ پودینہ
بچوں کی مرگی، قے، امراض اطفال		
۱۸۳-۱۸۷۔		
۲۴۹		

۱۷۹	خون نفاس کی بندش (امراض زچہ)	۷۔ پوست المتاس
۱۸۰	زچہ کا بخار (امراض زچہ)	۸۔ پوست بیج گپاس
۱۷۹ - ۱۷۹	گھیلن کا درد (امراض زچہ) خون نفاس کی بندش	۹۔ پوست خربوزہ
	(امراض زچہ)	
۱۷۹	گھیلن کا درد (امراض زچہ)	۱۰۔ پوست خشتخاش
۱۷۲	تھوک کی زیادتی (امراض حاملہ)	۱۱۔ پوست دخت کیکر
۱۷۶	بھوڑے پھنیاں	۱۲۔ پوست درخت نیم
۱۸۳	بچوں کی مرگی	۱۳۔ پوست ہلیہ زرد
۱۷۲ - ۱۷۱	دانتوں سے پیپ بہنا، تھوک کی زیادتی	۱۴۔ پشکری
۱۷۷ - ۱۷۷	(امراض حاملہ) سیلان الرحم (امراض حاملہ)	
۱۸۹ - ۲۰۹	کایج ٹکٹا (امراض اطفال) چونک لگانا	
۱۷۷ - ۱۷۷	کالی کا درد، ذیابیطس	۱۵۔ پیاز
۱۷۲	رلوترا	۱۶۔ پیپ

ت

۲۰۶	چند مشہور زہروں کا علاج	۱۔ تازہ مولی کا رس
۱۳۲	دلمہ	۲۔ تخم اسی
۱۷۲	داد	۳۔ تخم پنوار
۱۸۰	زچہ کا بخار	۴۔ تخم خربوزہ
۱۸۳ - ۱۷۷ - ۱۷۶	پیاس کی زیادتی، مہاسے، پیاس کی زیادتی (امراض اطفال)	۵۔ تخم حرفہ
۱۷۲ - ۱۷۱ - ۱۷۵	سہر، خارش، کھانسی (امراض حاملہ)	۶۔ تخم خشتخاش

۹۲	پیمش وبائی	۷۔ تخم ریحاں
۲۰۶	چند مشہور زہروں کا علاج	۸۔ تخم سویا
۱۶۵	بانجھ پن	۹۔ تخم شوفلی
۱۸۸	پیٹ کے کیرے (امراض اطفال)	۱۰۔ تخم کدو شیریں
۱۶۵	بندش حیض	۱۱۔ تخم گاجر
۲۰۶	چند مشہور زہروں کا علاج	۱۲۔ تخم مولی
۱۸۳	بچوں کی مرگی	۱۳۔ تربد
۱۱۷	یرقان	۱۴۔ تربوز
۱۸۴ - ۱۲۳	بامعنی، آنکھیں دکھنا (امراض اطفال)	۱۵۔ ترسیلا
۲۰۸	بھلا لوفہ	۱۶۔ تیل
۱۲۷	ناک کی بدبو	۱۷۔ تلسی
۲۰۴ - ۱۵۰ - ۱۴۹ - ۱۲۴	کان کا درد، ناروا، زخم، زہر خوردہ کی علامات	۱۸۔ تلوں کا تیل
۱۹۸	کان میں کسی چیز کا پھنس جانا	
۱۵۵	آواز بے سہر جانا	۱۹۔ تمباکو
		ث
۱۵۶	ضعف باہ	۱۔ ثعلب مہری
		ج
۱۳۷	پیشاب کی زیادتی	۱۔ جامن کی گٹھلی
۲۰۴	زہر خوردہ کی علامات	۲۔ جدوار خطائی
۱۴۴ - ۱۲۴	روہے، گمی دانے	۳۔ جست
۱۳۴	گردہ و مثانہ کی پتھری	۴۔ جواکھار

ج

- ۱۔ چاک ۲۰۸ تیزابی اور کھاری زہروں کا علاج
- ۲۔ چاولوں کی پیچ ۲۰۶ چند مشہور زہروں کا علاج
- ۳۔ چروغی ۲۰۸ سبلا نوحہ
- ۴۔ چھاپھ ۱۱۷-۱۱۹-۲۰۸-۲۰۸ یرقان، دیدان امعاء، سبلا نوحہ، جمال گوٹہ
- ۵۔ چھند ۱۵۴ انگلیوں کا پھوٹنا
- ۶۔ چیلی کاتیل ۱۶۸-۱۶۶ شرم گاہ کی خارش
- ۷۔ چنے بھنے ہوئے ۱۶۳-۱۶۴ سیان الرحم، کوئلہ مٹی کھانے کی عادت (امراض حاملہ)
- ۸۔ چولائی کا ساگ ۲۰۶ چند مشہور زہروں کا علاج
- ۹۔ چونا ۱۶۶ باؤ گولہ
- ۱۰۔ چونے کا پانی ۱۹۲-۱۹۲ آنکھ میں کچھ پڑ جانا، آگ سے جل جانا

خ

- ۱۔ خارخک خورد ۱۸۰ زچہ کا بنجار
- ۲۔ خاکسی ۸۳-۱۵۴ دق الریہ، پیرانا بنجار
- ۳۔ خرگوش کا گوشت ۱۸۶ ڈبہ اطفال
- ۴۔ خولجان ۱۳۷ پیشاب کی زیادتی

ذ

- ۱۔ دارچینی ۱۵۶ ضعفِ باہ
- ۲۔ داربلد ۱۵۵ کلہمڑ
- ۳۔ دانہ الائچی کلاں ۱۶۲ شہوک کی زیادتی

۱۸۴	پیاس کی زیادتی (امراض اطفال)	۴۔ دھان کی کھل
۱۶۰	احتلام	۵۔ دھنیا
۲۰۸-۱۴۲-۱۱۹	دیدان امعاء، داد، جمال گوشت	۶۔ دہی
		۱۔ رائی
۲۰۶-۱۰۴-۱۰۲	قوت ذائقہ کا زوال، بچہ، چند مشہور زہریوں	۲۔ رتن جوت
۲۰۹	کاملج، چونک لگانا	۳۔ رسوت
۱۲۶	بہرین	۴۔ روغن انڈی
۱۷۷-۱۷۶	سجورے پھنسیاں، شرم گاہ کی خارش (امراض حاملہ)	۵۔ روغن اسی
۱۱۲-۱۰۶	اچھارہ، قولنج	۶۔ روغن بادام تلخ
۱۹۲	آگ سے جلنا	۷۔ روغن بلو ام شیریں
۱۲۶	بہرین	۸۔ روغن بیدانجیر
۲۰۸-۱۷۵	قبض (امراض حاملہ) سبب النہ	۹۔ روغن تارپین
۱۴۰-۱۳۹-۱۳۶-۱۰۹	دست آنا، بندش بول، تقطیر البولی، درد شامہ	۱۰۔ روغن چیلی
۱۸۳-۱۷۵-۹۲	پیمپش (امراض حاملہ) (امراض زچہ) بچوں کی مرگی	۱۱۔ روغن سرسوں
۱۹۲	(امراض اطفال) آنکھ میں کچھ پڑ جانا	۱۲۔ روغن کنجد
۱۲۸-۱۱۲-۸۷	موتی عجزہ، قولنج، اچھارہ، ناک کے کپڑے	۱۳۔ روغن گل
۱۸۶	پسلی کا درد (ڈبہ اطفال)	
۱۴۱	خارش	
۱۸۶	ڈبہ اطفال (امراض اطفال)	
۱۸۶-۱۲۵	کان کا بہنا، پسلی کا درد (امراض اطفال)	
۱۴۵-۱۴۴-۱۲۷-۱۲۶	کان کا درد، ناک کی بدبو، گرمی دانے، پتی، بچوں	
۱۸۳	کی مرگی (امراض اطفال)	
۲۵۳		

۱۴۔ روغن نایل کالی کھانسی، سہلانہ، آنکھیں کچھ پڑ جاتا ۸۸-۲۰۸-۱۹۲

۱۔ زرشک

۱۰۷۔ قے دلی

۱۱۲-۱۴۰۔ قویج، درد مشانہ

۲۔ زنجبیل

۱۸۷۔ دست آنا (امراض اطفال)

۳۔ زہر مہرہ خطائی

۱۱۱-۱۳۹-۱۷۲۔ بدہضمی، بول زلالی، شہوک کی زیادتی ۴۔ زیرہ سفید

۱۷۳۔ (امراض حاملہ) پیٹ کا درد (امراض حاملہ)

۱۷۸-۱۸۱۔ بول زلالی (امراض حاملہ) دودھ کی کمی (امراض زچہ)

۱۸۱۔ دودھ کی زیادتی (امراض زچہ)

س

۱۔ سپوس اسپنول

۹۲۔ پیمش

۱۵۵-۱۴۰-۱۳۳۔ گدرد و مشانہ کی پیمش، درد مشانہ، آواز بیٹھ جانا ۲۔ سپوس گندم

۲۰۸۔ تیزابی اور کھاری زہر دل کا علاج ۳۔ ست اعلیٰ

۲۰۸۔ تیزابی اور کھاری زہر دل کا علاج ۴۔ ست لیموں

۱۵۸-۱۸۱۔ جریان، دودھ کی کمی (امراض زچہ) ۵۔ ستارہ

۱۳۴۔ درد گردہ ۶۔ شرخ مریح

۱۴۴۔ چھا سے ۷۔ سرس کی چھال

۱۹۸-۱۶۸-۱۲۲-۱۲۶۔ بہر اپن، گنج، شرم گاہ کی خارش، کان میں کسی ۸۔ سرسوں کا تیل

چیز کا پھنس جاتا

۱۱۶-۱۳۴-۱۴۵-۱۸۰۔ استسقا، درد گردہ، پتی، خون کا زیادہ آنا ۹۔ سرکہ خالص

۲۰۸۔ (امراض زچہ) تیزابی اور کھاری زہر دل کا علاج

۱۹۵-۲۰۹۔ چونک لگانا، چوٹ لگنا

۲۵۴

۱۰۔ سرمہ سیاہ	بال خوردہ	۱۴۶
۱۱۔ سفید دوب گھاس	خونی پیشاب	۱۳۸
۱۲۔ سکجبین	قے دمتلی (امراض حاملہ) کوئلہ مٹی کھانے کی عادت ۱۴۴-۱۴۴	
	(امراض حاملہ)	
۱۳۔ سن کے بیج	گلہڑ	۱۵۵
۱۴۔ سوڈا خوردنی	قلعہ، دردِ مثانہ، تیزابی اور کھاری زہروں ۱۱۲-۱۴۰-۲۰۸	
(سوڈا بائیکارپ)	کا علاج	
۱۵۔ سونٹھ	ضعفِ باہ، پیٹ کا درد (امراض حاملہ) ۱۵۶-۱۴۳	
۱۶۔ سپاگہ	منہ آنا، کان بہنا، ناک کے کیرے، داد، ۱۲۵-۱۴۸-۱۴۲- کچھالی، گلہڑ، دودھ، زخمِ رحم، زخمِ فرج، زچہ ۱۴۸-۱۵۵-۱۶۴-۱۶۲- کا بخار۔ (امراض زچہ) کھانسی (امراض اطفال) ۱۸۰-۱۸۶- بچوں کی مرگی، دست آنا (امراض اطفال) ۱۸۳-۱۸۴- خون تھوکنا، جریان، سیلانِ الرحم، کثرتِ حیض ۱۳۳-۱۵۸-۱۶۳-۱۶۴-	
۱۷۔ سیل کھڑی	بہری، زخم	۱۵۰
۱۸۔ سیندور	حمل گرنا	۱۴۰
۱۹۔ سیوتی کا گل قند		
نش		
۱۔ شکر سرخ	پتی اچھلنا	۱۴۵
۲۔ شلجم کے پتے	انگلیوں کا پھولنا	۱۵۴
۳۔ شورہ قلمی	جالا پھولا	۱۲۱
۴۔ شہد خالص	فالج و لقوہ، استسقا، کان کا درد، کان کا بہنا، ۹۶-۱۱۶-۱۲۴-۱۲۵- دل کا درد، خون تھوکنے، خارش، پتی، چنڈ مشہور ۱۲۹-۱۳۳-۱۵۱-۱۴۵- زہروں کا علاج ۲۰۶	۲۵۵

ص

- ۱۔ صابن دیلی قورلج، ناروا ۱۱۲ - ۱۴۹
- ۲۔ معتز فارسی گھیلین کا درد (امراض زچہ) ۱۴۹
- ۳۔ مندل سفید گرمی دانی ۱۴۴

ط

- طباشر کوئٹہ مٹی کھانے کی عادت (امراض حاملہ) پیاسا ۱۸۴ - ۱۸۴
- کی زیادتی (امراض اطفال) دست آنا ۱۸۴
- (امراض اطفال)

ع

- ۱۔ عرق کیوڑہ باؤ گولہ ۱۶۶
- ۲۔ عرق کلاب گرمی دانی، پتی، باؤ گولہ، خون کا زیادہ آنا ۱۴۴ - ۱۳۵ - ۱۶۶ - ۱۸۰
- (امراض زچہ)

ف

- ۱۔ فلفل دراز لہو نندا ۱۲۲
- ۲۔ فلفل سیاہ استسقا ۱۱۶

ق

- قزفل سیفہ، دست آنا ۱۰۹ - ۸۹

ک

- کافور ناک کی بدبو، خصلوں کی خارش، درد گردہ ۱۲۴ - ۱۵۲ - ۱۳۴
- شرم گاہ کی خارش (امراض حاملہ) درد کی زیادتی ۱۴۴ - ۱۸۱
- (امراض زچہ) پیٹ کے کیرے (امراض اطفال) ۱۸۸

۱۔ مازو

سلان الرحم، دودھ کی زیادتی (امراض زچہ) ۱۶۳-۱۸۱۔

۱۸۹ لایخ نکلتا (امراض اطفال)

۹۷ فالج و لقوہ

۱۷۰ حمل گرنا

۱۷۵ پیمش (امراض حاملہ)

کھانسی (امراض حاملہ) قبض (امراض حاملہ) ۱۷۲-۱۷۵۔

۱۷۷ بواسیر (امراض حاملہ)

۸۹ سہینہ

۱۳۸ خونی پیشاب

لکنت، ضعف بصر، راد، آواز بیٹھ جانا ۱۰۳-۱۲۰-۱۳۲-۱۵۵

۱۸۱ دودھ کی زیادتی (امراض زچہ)

۲۰۸ بھلا لوزہ

سہر، لکنت، ضعف بصر، آواز بیٹھ جانا، ۹۵-۱۰۳-۱۲۰-۱۵۵

۱۷۲ کھانسی (امراض حاملہ)

۹۹ ذیابیطس

۱۵۶ ضعف باہ

۹۹ ذیابیطس

۲۰۸ بھلا لوزہ

پیاس کی زیادتی (امراض اطفال) دست کٹنا ۱۸۴-۱۸۳

(امراض اطفال)

۲۔ مارا العسل

۳۔ مرتبے آملہ

۴۔ مرتبے سلگری

۵۔ مرتبے ہلید

۶۔ مرتج سبز کا گودا

۷۔ مرتج سفید

۸۔ مرتج سیاہ

۹۔ مسور

۱۰۔ مغز اخروٹ

۱۱۔ مغز بادام شیریں

۱۲۔ مغز ہنولہ

۱۳۔ مغز پنبہ دانہ

۱۴۔ مغز جامبی

۱۵۔ مغز چلوڑہ

۱۶۔ مغز کنول گٹ

۲۰۸	کھلا لوفہ	۱۷۔ منقر نازیل
۱۳۹ - ۱۷۸	بول زلالی، بول زلالی (امراض حاملہ)	۱۸۔ مکو خشک
۱۸۰ - ۱۷۹	خون نفاس کی بندش (امراض زچہ) زچہ کا بخار	
	(امراض زچہ)	
۱۴۶	پھوڑے پھنسیاں	۱۹۔ مکو بسر
۱۳۶ - ۱۳۴ - ۱۷۴	درد گردہ، بندش بول، قے و متلی (امراض حاملہ)	۲۰۔ مکتی کے ٹھٹھے کے بال
۱۶۴	کثرت حیفض	۲۱۔ ملانی مٹی
۱۷۰	حمل گرنا	۲۲۔ بیٹھی
۱۱۸	عظیم طحال	۲۳۔ موی
۱۲۹	دل کا درد	۲۴۔ مویر منق
		ن
۱۸۷	دست آنا (امراض اطفال)	۱۔ نازیل
۱۷۲	سھوک کی زیادتی (امراض زچہ)	۲۔ ناسپال
۱۴۵	پتی اچھلنا	۳۔ ناگ کیر
۱۸۷	قے (امراض اطفال)	۴۔ زکچور
۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۶	کھلی، داد، پھوڑے پھنسیاں	۵۔ گند بامبری
۱۳۴ - ۱۰۶ - ۱۰۱ - ۱۰۵	سورسوں سے پیپ آنا، اسپارہ، گردہ	۶۔ نمک
۱۸۰ - ۱۴۰	مٹانہ کی پھری، درو مٹانہ، زچہ کا بخار	
۲۰۹ - ۲۰۶	چند مشہور زہروں کا علاج، چونک لگانا	
۱۷۳	پیٹ کا درد (امراض حاملہ)	۷۔ نمک سیاہ
۱۵۵ - ۱۴۲	ناخنہ، آواز بیٹھ جانا	۸۔ نمک لاسوری

۹۔ نوشادر	لکنت، عظیم طحال، ناک کی بدبو، خسیوں کا درم، ۱۰۳-۱۱۸-۱۲۴-۱۵۲
	باؤ گولہ ۱۶۶
۱۰۔ نیلا حقو کھا	مسور ٹھوں سے پیپ آنا، زخم، چونک لگانا ۱۰۱-۱۲۵-۱۵۰-۲۰۹
۱۱۔ نیم کاتیل	دیدان امعا ۱۱۹
۱۲۔ ولسلین	پیٹ کے کبڑے (امراض اطفال) ۱۸۸
۱۳۔ ہلدی	بچکی، مہاسے، کچھری، گھٹھڑ، ۱۰۷-۱۲۸-۱۵۵
	تھنیا، چوٹ لگنا ۱۶۹-۱۹۵
۱۴۔ ہلیہ سیاہ	ڈھلکا ۱۲۲
۱۵۔ ہیرا ہینگ	دل کا درد ۱۲۹
۱۶۔ ہینگ	باؤ گولہ، اچھارہ (امراض اطفال) زیر خوردہ ۱۶۶-۱۸۷-۲۰۳
	کی علامات، چند مشہور زہریلے کا علاج ۲۰۶

اندریکس نمبر

تشخیصی و معالجاتی روز و نکات

الف	ع	ع
استیاط	سوزاک، چھاجن، بھٹی کارنم	علامات فارقہ احتناق الرحم ۱۶۷
اسباب فقر	۹۱ ۱۳۵ ۱۸۱	غ
انتباہ	۱۶۶ بانجھین	غذا
ت	۱۱۷ استسقا	پیش، اسہال، سنگرمی ۹۲ ۲۲۳ ۱۱۱ سورمراج کبد حار و لوزہ ۱۱۳ ۱۲۲ نمونیا ۱۳۱
تذیر	۱۶۱ احتلام	غذا و پریر
تشخیصی اشارہ	کن پھیر، سرعت انزال	سوزاک، فالج و لقوہ ۹۰ ۹۸
تشخیصی علامات	۹۱ ۱۶۱	درمعدہ، قے الدم، ۱۰۵ ۱۰۹ بدھمی ۱۱۲
تشخیصی نکات	۸۷	م
تشخیصی نکتہ	چھاجن، پتی اچھلنا، جریان ۱۳۵ ۱۳۷ ۱۵۹ سیلان الرحم، دوبہ اطفال ۱۸۶ ۱۲۴ خونی پیشاب، برص ۱۳۸ ۱۴۳	مقوی غذائیں
ج	ضعف باہ	ن
جالینوس کا قول	۱۵۶	نکات
ط	ضعف باہ	نکتہ
طریقہ علاج	۱۵۸	نوٹ
		درم کبد (جگر) ۱۱۴ ضعف باہ ۱۵۷ تھوڑا لٹکا، عظیم طحال استسقا ۱۱۶ ۱۱۹